



АНИМАЛОТЕРАПИЯ

домашние животные
и наше здоровье



Ю. Хорчук


Annotation

Среди множества методов лечения один из самых эффективных и в тоже время загадочных - анималотерапия, т.е. лечение при помощи животных, как домашние животные влияют на наше физическое и психическое здоровье. Все о кошкотерапии, собакотерапии, рыбках-дерматологах и пушистых, живых грелках.

- [Ю. Харчук](#)
 - [Введение](#)
 -
 - [Иппотерапия](#)
 -
 - [Шиншилла](#)
 -
 - [Североамериканский опоссум](#)
 -
 - [Ёж](#)
 -
 - [Броненосцы](#)
 -
 - [Кролики](#)
 -
 - [Дикобразы](#)
 -
 - [Белки, бурундуки, хомяки](#)
 - [Обыкновенная белка](#)
 -
 - [Бурундук](#)
 -
 - [Хомяки](#)
 -
 - [Домашние крысы, песчанки, морские свинки](#)
 - [Крысы](#)
 -
 - [Песчанки](#)
 -

- [Морские свинки](#)
 -
- [Сони](#)
 -
- [Домашние любимцы – собаки](#)
 -
- [Еноты, норки, хорьки](#)
 - [Американский енот-полоскун](#)
 -
 - [Американская норка](#)
 -
 - [Хорьки](#)
 -
- [Семейство кошачьих](#)
 - [Лесная \(дикая\) кошка](#)
 -
 - [Рысь](#)
 -
 - [Лев](#)
 -
 - [Породы домашних кошек](#)
 -
- [Совы](#)
 -
- [Вьюрковые](#)
 -
- [Дроздовые](#)
 -
- [Скворцовые](#)
 -
- [Канарейки](#)
 - [История канареек](#)
 -
 - [Породы канареек](#)
 -
 - [Выбор канарейки](#)
 -
 - [Содержание канареек](#)
 -

- [Как научить кенара петь](#)
 -
- [Попугаи](#)
 - [Волнистые попугайчики](#)
 -
 - [Неразлучники](#)
 -



Ю. Харчук

**Анималотерапия: домашние животные и
наше здоровье**

Введение

Среди множества методов лечения один из самых эффективных и в то же время самых загадочных – анималотерапия, то есть лечение при помощи животных.

Домашние любимцы помогают своим хозяевам поддерживать нормальный уровень кровяного давления и содержания холестерина в организме.

В распоряжении анималотерапии сегодня два основных метода. Направленное лечение – это физический контакт, совместные прогулки, игры и «разговоры по душам». Более того, в нашей стране уже появились центры иппотерапии и дельфинотерапии, где с успехом лечатся такие тяжелые заболевания, как ДЦП, эпилепсия и нарушения речи.

Другой метод называется естественным и состоит в том, что человек получает жизненную энергию и положительные эмоции от наблюдения за животными, а также от их изображений и рисунков. Именно поэтому анималотерапия стала столь популярной: ее могут применять даже те, кто по каким-то причинам не в состоянии завести четвероногого питомца.

Даже самые заядлые кошатники могут не знать, что целебной силой обладают именно кошки, а не коты. Пушистые подружки, оказывается, универсальные лекари: они нормализуют наш энергообмен. Если вы истощены, выдохлись (примите к сведению, что хронический недостаток энергии приводит к таким заболеваниям, как инсульт, инфаркт, гипертония, остеохондроз, гастрит и язвенная болезнь), кошка вас «подпитает», вернет утраченные силы. Все, что от вас требуется, – почаще брать на руки только что проснувшуюся, хорошо отдохнувшую хвостатую любимицу. Только следите, чтобы хвост зверька оказался с вашей правой стороны: это сделает процедуру более эффективной.

Если же вы никак не можете успокоиться, энергия бьет через край (ее избыток приводит к неврастении, почечной и сердечной недостаточности, артриту и гипотонии), поможет сонная, засыпающая кошка: прижмите ее к себе, побаюкайте – но в этом случае ее хвостик должен оказаться слева.

При гипертонии и остеохондрозе шейного отдела прекрасно зарекомендовал себя «кошачий воротник». Пусть три раза в день ваша кошка на 3–4 минуты побудет пушистой горжеткой.

Имеют значение и цвет, и порода. Черные гладкошерстные и сиамские кошки хорошо снимают хроническую усталость.

Белые полудлинношерстные и длинношерстные (ангора и перс) исцеляют заболевания, связанные с нарушениями обмена веществ.

А рыжие и серые – универсалы, они помогают при любых недомоганиях.

Если хотите быть здоровы – присматривайтесь к поведению кошки. Ваша питомица настойчиво льнет к вам? Скорее всего, она чувствует, что вам грозит обострение хронического заболевания (кстати, именно из-за этой особенности животных в старину обвиняли в пособничестве силам зла). Когда кошка вылизывает или теребит ваше ухо, она лечит вас: на ушной раковине, как известно, расположено множество акупунктурных точек. Воздействуя на них, животное способно предотвратить сердечный приступ или нервный срыв. Лучший способ пополнить запасы жизненных сил – завести собаку. Это живой антидепрессант и истинный психотерапевт! А для достижения оздоровительного эффекта достаточно просто находиться рядом с ней – ласкать, гладить, гулять!

Собака не только прекрасно поддерживает в норме эмоциональное состояние хозяина, но может оказать и первую медицинскую помощь: ее слюна содержит антибиотик лизоцим, который способствует заживлению ран.

Расчесывая своего питомца, не выбрасывайте шерсть. Аккуратно собирайте ее в холщовый мешочек – и вы получите прекрасное средство от радикулита, люмбаго, воспалений в суставах. Почувствовав недомогание, прогрейте мешочек утюгом и приложите к больному месту.

Удивительно, но контакт с собакой способствует снятию спазмов. Американские исследователи доказали, что трехминутное поглаживание четвероногого друга по голове приравнивается к приему одной таблетки ношпы.

Недаром считается, что самые счастливые, благополучные дети растут в семьях, где есть собака. Подвижный, гиперактивный ребенок с пользой потратит избыток своей энергии на общение с четвероногим другом. Нерешительным и замкнутым малышам животное поможет установить контакт со сверстниками, стать более раскованными.

Феномен зоопарка

Если завести животное в доме не позволяют обстоятельства, существует масса иных способов приобщиться к анималотерапии.

Во-первых, вы можете отправиться на выставку животных или в

зоопарк. Оздоровительный эффект от подобного мероприятия достаточно высок. Например, последние данные английских ученых показали, что каждый седьмой посетитель зоопарка пришел туда... из-за приступа головной боли и уже через 40 минут испытывает значительное облегчение. Исследователи полагают, что отсутствие непосредственного контакта с животными компенсируется разнообразием представленных видов: в этом и кроется разгадка феномена обезболивания.

Во-вторых, не забывайте о целебной силе фотографий, скульптур, рисунков и прочих изображений животных. Правда, для здоровья полезнее не любоваться картинками и фигурками, а делать их самим: рисовать, лепить, фотографировать. Это особенно полезно тем, кто подвержен частым стрессам, склонен к истерии и депрессиям, жалуется на плохую память и дрожание рук.

Сегодня в Египте существует питомник «Коты-целители». Его владелец разводит особых кошек с выдающимися экстрасенсорными способностями, каждая из которых продается не менее чем за 10 тысяч долларов. И они того стоят: многие его «выпускницы» излечили своих хозяев от тяжелых болезней – последствий разного рода травм, послеоперационных осложнений, заболеваний сердца, печени, желудка и суставов. Эти уникальные голубоглазые кошки ориентальной породы с первых дней воспитываются по определенной методике, развивающей заложенные в них целительные силы. Единственный помощник владельца, покинувший его после нескольких лет службы, рассказывает, что котята с самых первых дней проходят жесткий отбор – коты и слабые кошки ликвидируются быстро и безболезненно. Зато все остальные в течение нескольких месяцев подвергаются настоящим пыткам: их держат впроголодь в полной темноте и время от времени стимулируют разрядами электрического тока. В результате подобного воспитания кошки вырастают чрезвычайно субтильными и нервными, зато, по отзывам очевидцев, их глаза излучают «неземное» сияние. Покинув питомник, они бывают так благодарны новому хозяину, забравшему их из «камеры пыток», что очень быстро избавляют его от всех болячек!

Поистине фантастическими целебными способностями обладают маленькие рыбки, обитающие в богатых серой термальных водах Кангала (восточная Турция). Их так и называют – докторами. Более того, им можно смело присвоить точную медицинскую квалификацию врача-дерматолога. Эти плотоядные рыбки избавляют человека от чешуйчатого лишая (псориаз), который никакими другими средствами полностью не излечивается. Официальная медицина недоуменно разводит руками. А

пациенты после трехнедельного курса купаний в ваннах с резвящимися рыбками начисто избавляются от недуга!

Поразительный факт обнаружили греческие геронтологи, ведущие статистический учет продолжительности жизни людей различных специальностей. Второе место по продолжительности жизни после пчеловодов занимают пастухи! А ведь в повседневной жизни именно они больше всего общаются с животными: овцами, крупным рогатым скотом, козами.

Ученые сначала предположили, что все дело в здоровом образе жизни и экологии данной местности. Но вскоре убедились, что прочие коренные обитатели тех же сел, занятые иными видами деятельности, также проводят целые дни на свежем воздухе и питаются теми же продуктами, но долголетием не отличаются. Поэтому высокую продолжительность жизни пастухов отнесли на счет анималотерапии. Круглосуточно пребывая в кругу животных, они получают мощные оздоровительные сеансы.

Эти неприхотливые домашние животные (крыски, хомяки, миниатюрные кролики и морские свинки) все больше входят в моду. И не случайно – они очень привязчивы, умны и нетребовательны. Общение с ними положительно действует на гипертоников, язвенников, людей, страдающих тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП и вегетососудистой дистонией.

Общение с попугаями и певчими птицами типа канареек, щеглов и корольков особенно полезно легочникам и сердечникам, людям с повышенным кровяным давлением, а также тем, кто страдает от последствий тяжелых травм и заболеваний. Легкая энергия забавных пташек поднимает настроение, отвлекает от болезненных ощущений и дает силы сопротивляться недугам.

Как известно, вся наша жизнь подчинена внутренним биоритмам. Согласуясь с ними, поступают в кровь гормоны, выделяется желудочный сок, ткани обогащаются кислородом. Биоритмы также в ответе за то, с какой частотой бьется наше сердце, с какой скоростью происходят обменные процессы. Учтя все биоритмические особенности человеческого организма, ученые составили график сеансов анималотерапии (принимал во внимание как непосредственный контакт с животными, так и наблюдение за ними и даже рассматривание картинок и фотографий).

С 3 до 5 утра – самое благоприятное время для облегчения состояний при бронхо-легочных заболеваниях.

С 5 до 7 утра лучше всего поддается лечению желудочно-кишечная система.

С 11 до 13 часов – благоприятное время для тех, кто подвержен сердечно-сосудистым недомоганиям.

Вечер (после 18 часов) подходит тем, кто решил избавиться от хронической усталости и стресса.

Уникальными экстрасенсорными свойствами обладают голые китайские хохлатые собачки. Температура тела у них – 40–42 градуса. Эти четвероногие лекари своим теплом и энергией помогают снять боли при почечных коликах, ревматизме, подагре и радикулите. Обитатели другой части света – мексиканские голые собаки, тоже умеющие целить своим теплом, – считались у ацтеков даром богов и содержались в храмах!

Несколько лет назад у нас в стране появились свои бесшерстные животные-лекари. Это голые кошки, выведенные в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

В Германии говорят: «Кота обидеть – семь лет счастья не видеть!». В Англии – «Кот в дом – счастье в нем».

Всем известная примета о перебегающей дорогу кошке имеет, оказывается, важное уточнение. Неприятности сулит не только черная кошка, но и любая другая – серая, белая или пятнистая. Важен вовсе не цвет: для мужчины плохо, если кошка перебежала ему дорогу справа налево, а для женщины – если слева направо. Зато когда вам перебегут путь в противоположном направлении, радуйтесь: кошка «уведет» все ваши беды!

Иппотерапия

В настоящее время врачи-терапевты стали интенсивно внедрять в практику лечения болезней методы анималотерапии. Уже достаточно широко известны «терапевтические» способности различных животных. Одной из разновидностей анималотерапии является иппотерапия. Во все времена люди инстинктивно тянулись к лошадям.

Многие знают: стоит подойти к вороному, погладить, почистить его – и уходит усталость, проходит головная боль. Оказывается, у лошади очень сильное биополе. Известно, что только два существа способны подпитывать человека позитивной энергией – кони и дельфины.

Исследования Техасского колледжа ветеринарии показывают: пожилые люди – владельцы собак – посещают врачей в четыре раза реже, чем их сверстники, не имеющие дома четвероногих питомцев. Несмотря на это, анималотерапию сложно назвать досконально изученной. И тем более она не претендует, в отличие от практически всех нетрадиционных терапий, на то, чтобы лечить человечество от всех известных и неизвестных недугов. В основном ее практикуют в центрах реабилитации для инвалидов – на Западе почти в каждом, у нас в нескольких. Психологи рассказывают, что общение с животными помогает обрести состояние душевного комфорта, что всегда особенно сложно дается инвалидам.

Иппотерапия – лечение с помощью лошадей (от греческого «hippos» – лошадь). Это форма реабилитации, при которой используются гимнастические упражнения на лошади (вольтижировка).

Об иппотерапии известно еще со времен Гиппократ. Он утверждал, что раненые и больные поправляются быстрее, если ездят верхом, а меланхолики расстаются с темными мыслями.

А еще в I тысячелетии от Рождества Христова лошадью в буквальном смысле этого слова лечили многие затяжные болезни. Конина, например, называемая не иначе как «великое мясо», относилась к первым средствам лечения гнойной инфекции. Для лечения использовались и копыта, и мозолистый нарост на коленях лошади, и лошадиное молоко (кумыс). В настоящее время на основе кобыльего молока готовят полноценный натуральный продукт для питания детей, который хорошо усваивается малышами. В Тибете даже сны о лошадях имеют благоприятное значение. Приснившаяся лошадь с жеребятками – признак быстрого излечения больного. Ехать во сне верхом на лошади – к долгой жизни.

Иппотерапия представляет собой комплексный многофункциональный метод реабилитации.

Иппотерапия есть не что иное, как форма лечебной физкультуры (ЛФК), где в качестве инструмента реабилитации выступают лошадь, процесс верховой езды и физические упражнения, выполняемые человеком во время верховой езды.

В процессе верховой езды в работу включаются все основные группы мышц тела. Это происходит на рефлекторном уровне, поскольку, сидя на лошади, двигаясь вместе с ней, клиент инстинктивно старается сохранить равновесие, чтобы не упасть с лошади, и тем самым побуждает к активной работе как здоровые, так и пораженные мышцы, не замечая этого. Механизм воздействия иппотерапии на организм человека тот же, что и у любой другой формы ЛФК. Под влиянием физических упражнений отмечается усиление функции вегетативных систем.

Иппотерапия воздействует на организм человека через два фактора: психогенный и биомеханический. Так, при лечении неврозов, детских церебральных параличей, умственной отсталости, раннего детского аутизма основным воздействующим фактором является психогенный.

При лечении же постинфарктных больных, больных с нарушениями осанки, страдающих сколиозами, остеохондрозами позвоночника ведущим фактором воздействия оказывается биомеханический.

При аутизме у детей лечение осуществляется с использованием лошади в качестве посредника и с применением несловесного диалога «язык жестов», с соблюдением тишины, дистанции.

Лошадь требует постоянного к себе внимания, и за счет этого возрастают способности человека адаптироваться к реальности. Для человека, страдающего психическими расстройствами, положение верхом на лошади оказывается «выигрышным» по сравнению с положением терапевтов: «Я наверху, они внизу». Верховая езда требует концентрации внимания, осознаваемых действий, умения ориентироваться в пространстве. Кроме того, ни один из видов реабилитации не вызывает у занимающегося такой разнонаправленной мотивации к самостоятельной активности, которая сопутствует занятиям иппотерапией: ребенок испытывает огромное желание сесть на лошадь, почувствовать себя всадником, преодолеть страх, обрести уверенность в своих силах. Такая сильная мотивация способствует максимальной мобилизации волевой деятельности, благодаря которой достигается не только подавление чувства страха, но и одновременное уменьшение количества и объема гиперкинеза «при детском церебральном параличе», что дает возможность обучать

клиента правильному построению основного поведенческого фона.

На занятиях иппотерапией соблюдаются основные принципы психотерапевтического воздействия: единство места и действующих лиц; единство времени; единство действий. Использование метода иппотерапии в реабилитации лиц, страдающих различными видами нарушений умственного развития, дает положительные результаты:

1. Облегчает снятие заторможенности.
2. Снижает чувство тревоги.
3. Улучшает адаптацию к реальному пространству и времени.
4. Способствует достижению самостоятельности.

Показано, что иппотерапия (райттерапия) оказывает положительное влияние на детей с диспластическим сколиозом, что обусловлено биомеханическими свойствами верховой езды.

Во время движения лошади туловище всадника выполняет те же движения, как и при ходьбе. Функцию нижних конечностей выполняют конечности лошади, так как при сидении верхом, ноги всадника выключены из антигравитационной системы и позвоночник находится в непосредственном контакте со спиной лошади (через седло), нагрузка на мышцы туловища акцентирована, эффект высокий и общая затрата энергии небольшая. Достижение синхронности движения ребенка и лошади, то есть создание единой биологической системы, и есть основа самокоррекции искривленного позвоночника.» Основой положительного воздействия при диспластическом сколиозе является создание вокруг позвоночника сильного мышечного корсета, вследствие чего происходит коррекция искривления в сторону уменьшения градусов искривления.

Принципиальным отличием иппотерапии от других методов ЛФК является то, что она располагает физиотерапевтическими возможностями, так как температура лошади на 1–1,5 градуса выше тела человека. Можно отметить также одновременное оказание тренировочного и ослабляющего воздействия на мышцы занимающегося через трехмерные колебания спины лошади.

Когда человек приходит на занятия иппотерапией, он видит перед собой не людей в белых халатах, а манеж, лошадь и инструктора. Процесс реабилитации воспринимается всадником как процесс обучения навыкам верховой езды. Во время этого процесса всадники преодолевают свои психические и физические трудности благодаря большой мотивации, которая формируется при обучении верховой езде. Иппотерапия вызывает у детей очень сильную мотивацию. С одной стороны, ребенок боится

большого строптивного животного, он не уверен в себе, а с другой – испытывает желание проехать верхом, научиться управлять лошадью. Это желание помогает ему преодолеть страх и повысить свою самооценку. В проведении уроков участвуют коновод, инструктор и один-два страхующих, если тяжесть заболевания требует особых мер предосторожности. Все же управлять животным всадник должен самостоятельно, чтобы шел процесс преодоления собственных комплексов и страхов. Инструктор задает различные упражнения, в которых должны применяться физическая сила, смекалка, и фантазия.

Влияние иппотерапии на организм человека можно разделить на несколько критериев.

К медицинским критериям относятся:

а) укрепление и тренировка мышц тела пациента, причем особенностью воздействия является то, что происходят одновременно тренировка слабых мышц и расслабление спастичных;

б) укрепление равновесия. Этот эффект достигается из-за того, что во время лечебной верховой езды (ЛВЕ) всадник стремится сохранить равновесие на протяжении всего занятия;

в) улучшение координации движений и пространственной ориентации. Лечебная езда дает полноценное ощущение движения тела в пространстве, дает возможность ощутить работу своих мышц;

г) улучшение психоэмоционального состояния занимающихся, повышается уровень самооценки личности. Человек начинает ощущать себя не больным и слабым, каким он чувствует себя в обычной жизни, а всадником, управляющим большим, сильным и грациозным животным, которое слушается и выполняет его команды;

д) в процессе верховой езды не используют никаких приспособлений, связывающих человека с инвалидностью. Это повышает самооценку личности и придает больным людям уверенность в своих силах, веру в себя. А родители видят своего искалеченного болезнью ребенка по-иному – на красивом грациозном животном, вызывает у них ассоциации с прекрасными кентаврами. Они с удовольствием фотографируют и с гордостью показывают фотографии своих детей.

Доказано, что лошадь может выступать в качестве посредника между больным аутизмом и окружающей действительностью. Это происходит за счет того, что взаимодействие с лошадью происходит на невербальном уровне, что позволяет больному как бы оставаться внутри своего комфортного мира и одновременно выходить из состояния изоляции от

окружающей действительности, адаптироваться в ней.

К социальным критериям относятся:

а) улучшение коммуникативных функций занимающихся. Этот результат достигается за счет того, что во время занятий всадники общаются и действуют совместно с иппотерапевтами и коноводами и друг с другом;

б) проведение соревнований по конному спорту среди лиц с особенностями развития способствует повышению уровня оценки клиентами самих себя, своих возможностей и своего потенциала. Проведение соревнований также способствует изменению отношения общества к людям с ограниченными возможностями. Видя всадника на лошади, люди видят в нем именно всадника, а не человека с проблемами. Видя, что люди с ограниченными возможностями могут заниматься таким сложным видом спорта, как конный, нормальные люди начинают понимать, что инвалиды – такие же люди, как они, могут то же, что и все, и даже больше, потому что не всякий здоровый человек умеет ездить верхом;

в) посредством улучшения физического, психологического и эмоционального состояния иппотерапия способствует улучшению эффективности и качества процесса социализации личности реабилитируемого;

г) за счет совместной деятельности иппотерапия способствует интеграции инвалидов в общество, расширяет горизонты их возможностей, помогая преодолевать барьеры инвалидности;

д) посредством занятий иппотерапией происходит развитие трудовых навыков по уходу за животными. Для некоторых людей с ограниченными возможностями, особенно с умственной отсталостью, это связано с тем, что люди с умственной отсталостью могут под контролем успешно выполнять работу конюха и эта работа может стать для них профессией, которая станет для них опорой в будущей самостоятельной жизни и послужит средством их интеграции в жизнь общества, что является основной задачей реабилитации.

Противопоказаний к иппотерапии немного. Это гемофилия, ломкость костей и заболевания почек.

Иппотерапия – это один из методов лечения остеохондроза, сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с нарушением кинетики, последствий полиомиелита и детского церебрального паралича, ишемической болезни сердца, ожирения, простатита, неврастении. Специалисты утверждают, что иппотерапия эффективна и при лечении

таких малоизученных заболеваний, как ранний детский аутизм (нарушение контакта с внешним миром). Как собаки-поводыри досконально знают свое дело, так и лошади-врачи очень чутко реагируют на все движения маленького седока. В связку инструктор-ребенок-лошадь врачи включают и маму, которая ведет лошадь. Лошадь в этом случае является как бы проводником между матерью и ребенком.

Лошади помогают и детям с другими неизлечимыми и врожденными болезнями, такими, как синдром Дауна. Ну и, понятное дело, полезен конный спорт здоровым ребятам.

Лечебный эффект достигается за счет естественных циклических вибраций, возникающих в процессе верховой езды, а также благодаря колебаниям, передающимся со спины лошади при ее движении на позвоночник, суставы и окружающие их ткани наездника. В настоящее время создана даже специальная шкала колебаний спины лошади, зависящая от темперамента и характера животного, что позволяет подобрать лошадь для лечения конкретного больного с учетом особенностей его заболеваний. При оптимальной нагрузке вокруг позвоночника создается сильный мышечный корсет, улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ в межпозвонковых дисках.

Исходя из позиций китайской медицины, на копчике и промежности находятся важные энергетические центры. Обычно восточные эскулапы воздействовали на эти центры путем иглоукалывания. При езде верхом вместо иглы мышечное и механическое раздражение этой области достигается за счет особого ритма движения.

Подмечено, что особенно сильный оздоравливающий эффект верховая езда оказывает на детей в возрасте от 5 до 12 лет. Верховая езда всесторонне развивает ребенка, делает его смелым, ловким, выносливым, решительным и находчивым. Не зря говорят, что лошадь, прежде всего, лечит душу. Это главное. На этом базируется все остальное.

В Европе иппотерапия стала развиваться интенсивно в последние 30–40 лет: сначала в Скандинавии, затем в Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, Грузии, Великобритании, Польше. Данный метод лечения был признан Немецкой физиотерапевтической ассоциацией (Deutscher Verband für Physiotherapie – Zentriverein der Krankengymnasten).

Научным обоснованием воздействия иппотерапии на организм в конце XIX столетия занимался французский доктор Перрон, утверждавший, что благоприятное влияние верховой езды на организм заключается, в частности, в активизации двигательной и дыхательной функций, а также кровообращения. В Норвегии Элизабет Бодикер, применявшая в течение 9

лет иппотерапию в занятиях с бывшей спортсменкой-конницей Лиз Харел, не только добилась почти полного излечения, но и сделала возможным ее участие в Олимпийских играх в Хельсинках. Э. Бодикер стала в порядке эксперимента сажать на лошадь других молодых инвалидов. Успешные результаты вызвали в Норвегии сенсацию. Норвежские власти согласились на открытие в 1953 году специального центра лечебной верховой езды (ЛВЕ) для детей-инвалидов.

Центры по иппотерапии стали открываться во многих странах мира. В США сегодня работает более 1000, а в Великобритании – около 700 групп, в которых оздоравливаются более 26 тыс. человек. Во Франции занимаются подготовкой специалистов по иппотерапии: открыт факультет иппотерапии в Парижском университете спорта и здоровья. В Тбилиси в Грузинской медицинской академии открыта кафедра ЛФК и райттерапии. Вопросам иппотерапии был посвящен специальный конгресс в Гамбурге в 1982 году.

В России использование иппотерапии началось с открытия в 1991 г. в Москве детского экологического центра «Живая нить». Позднее иппотерапия вошла в комплекс реабилитационных средств, применяемых для детей-инвалидов на базе отдыха «Зеленый огонек» под городом Луга. Известно об использовании этого метода реабилитации в Петергофе, в институте для детей с интеллектуальными отклонениями, а также в детском доме в Коломне, в интернате г. Йошкар-Ола. В конноспортивной школе «Озерки» занимаются с группой детей, страдающих ДЦП. Иппотерапией занимаются также в Нижнем Новгороде, в Саяногорске. В Сергиев-Посаде организованы занятия иппотерапией на базе общественной организации «Старая школа» с детьми, у которых ампутированы конечности, страдающими ДЦП и различными психическими патологиями.

Шиншилла

По опыту в станице Ленинградской мы убеждены: выращивание шиншиллы под силу как пенсионеру, так и школьнику. Шиншилле можно с успехом выращивать на больших фермах и в приусадебных хозяйствах, и даже на балконах квартир многоэтажек.

Сам процесс их выращивания настолько прост и доступен, что этому удивляются многие опытные звероводы.

Этот зверек удивительно неприхотлив к условиям выращивания. Он выживает при температуре от минус 42 °С до плюс 32 °С, круглый год питается сухими кормами. Технология выращивания больше напоминает непрерывный фабричный процесс.

На зверька даже просто так смотреть – одно удовольствие, настолько он симпатичный.



Разводят шиншил и в Австралии, и в Японии, и во Франции, и в ЮАР – во всем мире. Это факт, а не выдумка!

Во всем мире известно, что натуральный мех во все времена развития человеческого общества пользовался повышенным спросом и имел высокую оценку. Пушнину недаром называют «мягким золотом»! Издавна на Руси шкурки пушных зверей служили в качестве денег. Известно, что даже дань платили ценными мехами: шкурками соболя, куницы, чернобурки, горностая.

Оказывается, и на другом конце света, в горной системе Анд, люди делали то же самое. Индейцы племени Хинха, жившего около 600 лет до н. э., платили дань своим завоевателям, могущественному народу инков, шкурками пушных зверьков шиншил.

Из новейшей истории нам также известно, что меха всегда пользовались спросом и имели высокую цену.

Боярин и фабрикант, купец и заводчик, известная актриса и адвокат, врач, спортсмен – что объединяет всех этих очень разных людей? Объединяет их то, что они богаты и могут приобретать меха.

Качественный натуральный мех производить всегда выгодно, потому что он всегда пользовался и будет пользоваться спросом, и цена на него будет высокой.

Мех шиншиллы в настоящее время является самым дорогим в мире. Об этом красноречиво говорят цены на шубы из этого изумительно красивого, нежнейшего меха. В 2002 году цены на шубы составляли от 40 до 250 тысяч евро, в зависимости от фасона, – качества меха и в немалой степени от натурального окраса шкурки. А в настоящее время выведены шиншиллы с различными, даже неординарными цветами меха. Такого меха пока производится небольшое количество, и он, естественно, очень дорогой.

Шубы из меха шиншиллы во все времена определяли социальный статус ее владельца. После знакомства инков с этим чудом природы, шубы из меха шиншиллы были возведены в ранг королевских атрибутов. Простые люди не имели право их носить. Во многих западных телесериалах российские телезрители могли видеть шубы из этого меха, но редко кто из них мог отметить про себя, что им знаком этот мех. Да и где бы мы увидели его раньше? Такие кадры про очень богатых женщин в шубах из шиншиллы служили подтверждением исключительно высокой цены этого меха.

Не так давно в центральных газетах была помещена статья о мехах со снимком скандально известного боксера М. Тайсона с довольно интересной надписью; «Майк Тайсон в шубе из шиншиллы». Если учесть, что Тайсон в 1997 году заработал порядка 68 миллионов долларов, то можно представить, сколько стоит та «шубейка». Мы вправе сделать вывод: мех шиншиллы – очень дорогой мех.

Почему мех шиншиллы такой дорогой? Причин тому несколько. Первая из них объясняется уникальным строением меха зверька. Дело в том, что шиншиллы обитают в высокогорьях Анд (Чили, Перу) на высоте до пяти тысяч метров над уровнем моря. Это обуславливает суровые условия обитания. Там всегда очень сухо, и редко влажность в воздухе превышает 30 %. Резко континентальный климат означает перепады температуры как по сезонам года, так и в течение суток.

Осенью и зимой там всегда холодно, часты сильные ветры. Весной и коротким горным летом положительная дневная температура зачастую сменяется на отрицательную ночную. Скудная растительность не создает богатой кормовой базы. Поэтому, чтобы выжить в этих суровых условиях,

зверек должен экономить энергию, получаемую от каждой сухой травинки и прутика, которые ему удалось найти и съесть.

Шиншилла имеет уникальное строение меха. Если у всех пушных зверей из одной волосяной луковицы вырастает лишь один волосок, то у шиншиллы – 60–80 паутинок толщиной 12–14 микрон. На одном квадратном сантиметре их насчитывается 25 и более тысяч, при высоте ворса 2,5–3 сантиметра. Одним словом, это сплошной слой упругого, шелковистого пуха. Этот слой – прекрасный изолятор. Он-то и спасает зверька в самую лютую стужу, именно он позволяет всю энергию, которую получил зверек с кормом, использовать на жизненно важные потребности: на рост, движение, пищеварение, размножение и так далее.

Сам волосок имеет разную окраску по высоте, но равномерную на спинке, боках и животе.

Этот факт только добавляет прелести ценнейшему меху!

Так вот, эти-то особенности меха шиншиллы – его красота и исключительная нежность, другими словами, его высочайшее качество и обуславливает его постоянно высокую цену.

С другой стороны, эту высокую цену поддерживает неумолимый закон рынка, закон «спроса и предложения». Ранее довольно большие популяции зверька в Андах мирно и естественно уживалась с индейцами Хинха, проживавшими в гористой и неприветливой для человека местности. Пушистых зверьков вылавливалось столько, что это не могло не сказаться на численности самой популяции и ее возможностях к воспроизводству.

С выходом шкурки шиншиллы на рынок огромной империи инков, давление на популяцию зверька со стороны человека сдерживалось тем, что только ограниченное количество великосветской знати имело право носить одежду из этого меха. Но тем не менее давление со стороны человека значительно возросло.

Положение катастрофически изменилось с появлением испанских завоевателей в Южной Америке. Именно испанцы познакомили Старый и Новый Свет с этим изумительным мехом.

Первые шубы из шиншиллы появились во дворцах Испании, а потом быстро и прочно вошли в моду как в Европе, так и в Америке. В конце восемнадцатого – начале девятнадцатого веков был настоящий бум. Огромный спрос на мех шиншиллы так надавил на популяцию зверьков, что его численность в местах естественного обитания стала резко снижаться. Об этом ярко свидетельствуют объемы продаж шкурки в Германии в начале двадцатого века. Если в 1912 году было продано около 350 тысяч шкурки, то в 1913 году – только 16 тысяч, а в 1922 году шкурки шиншиллы

практически совсем исчезли как предмет торговли с международных рынков пушнины. На пушном мировом рынке образовался вакуум! При огромном спросе было нулевое предложение!

В настоящее время на рынках Франции ежегодно продается не более 30 тысяч штук шиншиллы. Спрос по-прежнему превышает предложение в несколько раз.

Так что мы можем сделать вывод: цена на мех шиншиллы держится высокой, поскольку ее формирует большой спрос.

С каждым годом спрос на мех шиншиллы будет только расти как на международном, так и на отечественном рынках.

Анализируя рост экономической интеграции в странах Европы, Северной Америки, Азии и в недалеком будущем стран бывшего СССР, можно утверждать, что это тенденция мирового экономического развития.

Образование региональных зон с общим рынком товаров, рабочей силы и денег создает прекрасные условия для реализации потенциальных возможностей как отдельных личностей, так и предприятий.

Это, в свою очередь, позволит сотням миллионов человек значительно улучшить свое материальное положение. Вот вам и новые миллионы потенциальных покупателей пушных изделий, в том числе и из меха шиншиллы.

По данным департамента статистики Америки в 1999 году в США американцы истратили на покупку одежды 4 миллиарда долларов, из них 1 миллиард долларов – на меха. Это довольно серьезная сумма, а ведь есть еще Европа, Арабские Эмираты, Япония, где меха ценятся не меньше.

Производство изделий из меха шиншиллы будет расти, но темпы этого роста не могут быть большими. Ждать резкого взлета производства меха не стоит, потому что он ограничен генетическими свойствами шиншиллы медленно увеличивать свое поголовье. Шиншиллы медленно размножаются по сравнению, скажем, с кроликами. Считается, что одна среднестатистическая самочка приносит 4–6 шиншиллят в год. Надо заметить, что это хороший результат при оптимальных условиях содержания. Требуется учесть, что в помете приблизительно по 50 % самочек и самцов. Возможности, увеличения общего поголовья будут определяться количеством зрелых самочек. С учетом выбраковки, естественной убыли, а также вывода из производства самочек старше 10 лет коэффициент ежегодного прироста количества самочек не превышает 2–3, а это очень мало. Для достижения уровня продажи шкурок начала двадцатого века потребуется, по крайней мере, около 40 лет, а может быть, и больше. Поэтому перепроизводства этого товара в мире не будет еще

около 50 лет. То есть его производство все это время будет в ранге сверхдоходного. Производите – спрос обеспечен и очень надолго!

Составляющие себестоимости производства практически неизменны. Корма, содержание помещения, рабочая сила – цены основных статей затрат определены очень конкретно и нельзя прогнозировать какой-то неожиданный их резкий скачок. А это значит, что рентабельность будет зависеть только от продажной цены при стабильных затратах производства.

Очень интересный и привлекательный для производителя вывод: высокая рентабельность на длительное время, так как размножаются шиншиллы довольно медленно. Существует два основных направления реализации нашей продукции: первый и самый простой для зверовода – продажа двухмесячного молодняка на развод. Получается сверхприбыльно, рентабельность до 400 %; второй – продажа шкурок шиншил, рентабельность 100 %.

Реализация любого другого сырья наименее выгодна в экономическом плане.

Тем не менее, сдача шкурок неизбежна, особенно для мелких хозяйств с годовым объемом менее 50-100 шкурок, так как для изготовления одной шубы нужно иметь выбор хотя бы 300–350 шкурок. Пока зверовод не имеет возможности быстро создать такое количество шкурок, он неизбежно будет продавать их как сырье.

Реализация шкурок на первом этапе позволяла уверенно развивать наше хозяйство. Оценивая направление, мы делаем вывод, что продажа шкурок экономически выгодное и рентабельное производство! Но существуют более привлекательные пути. Дело в том, что на шкурки идут, как правило, лишние самцы. Шиншиллы – полигамные животные, поэтому используется технология выращивания, которая предусматривает содержание одного самца на четырех самок. А в помете самок и самцов, в среднем поровну.

От столицы российских кладоискателей, станицы Ленинградской, и до Владивостока – на этой огромной территории, одной шестой части суши, разведением шиншил пока занимаются только десятки хозяйств. Всею виной пресловутый «железный занавес». В то время, как мир начал интенсивно заниматься разведением шиншил, мы с вами «сидели» в границах нашей страны, как за колючей проволокой. Один из московских чиновников от сельского хозяйства решал за всю страну, сколько выделить валюты на покупку шиншил для проведения эксперимента, но не для интенсивного производства. Поэтому в этом бизнесе наша страна отстает. Сравните: еще в 1996 году в Европе было зарегистрировано более 8 тысяч

хозяйств, занимающихся разведением шиншилл. В третьем тысячелетии выращиванием шиншилл занимаются уже тысячи как крупных, так и небольших фирм на всех континентах, и это не преувеличение, а факт.

Продажа живых зверей на племя – основной бизнес для звероводов России на ближайшие 30–40, а продажа шкурок – сопутствующий.

«Шерше ля фам» – ищите женщину. Вы, конечно, догадались, причем тут шубы. Прекрасные шубки из великолепного меха для очаровательных дам! Весь этот сыр-бор, конечно же, из-за них.

К примеру, взять Россию 2001 года. Население в 150 миллионов человек, и только в Москве и Санкт-Петербурге было продано 10 шуб из меха шиншиллы.

По всей территории России ни в одном магазине не была предложена на продажу ни одна шуба, даже в магазинах Тюмени, Сочи, Екатеринбурга и других «богатых» городов. Мы, шиншилловоды из столицы кладоискателей России станицы Ленинградской, уверены, что шубы из меха шиншиллы должны носить женщины всего мира. И уверены, что когда-то так и будет.

Читатели могут подумать, что им предлагают самим шить эти шубы. Конечно же, нет! И выделку, и моделирование, и само изготовление нужно организовывать на солидной фирме. Мы можем предложить модельное агентство в городе Краснодаре.

По нашему глубокому убеждению, любой зверовод может ставить перед собой такую достойную цель, зная, что дорогу осилит идущий.

Оба направления реализаций уже освоены тысячами шиншилловодов из разных стран, и дело теперь за Россией, в частности, за Краснодарским краем и Ростовской областью. Шиншилла – грызун, травоядное животное!!! О чем говорят эти восклицательные знаки? Их смысл нам понятен. Начнем с перечисления: соболь, норка, горностай, куница, чернобурка, песец – животные с прекрасным и, естественно, дорогим мехом. Но их всех объединяет еще и то, что кормить их нужно мясом, рыбой, да и в неволе разводить их – дело довольно хлопотное и малоприятное, хотя бы из-за сопутствующего запаха, характерного для животных, питающихся мясом.

Мех шиншиллы не дешевле меха соболя, а ест зверек траву! Если посмотреть на шиншиллу в ее естественной среде обитания, то можно понять, что она действительно неприхотлива в разведении. Представьте себе горные пустыни Анд. Ландшафт из крупных и мелких камней, без деревьев и только редкий кустарник, да трава там, где скопилась пыль, и есть за что корням зацепиться. Вот родные места шиншиллы. Большую

часть года зверек вынужден питаться сухой травой да тонкими прутиками высохшего кустарника. Только во время недолгого горного лета у него появляется возможность отведать зеленую травку, молодые побеги и свежие корешки. Это же находка для зверовода! Сено и немного зерна найти можно всегда, а в сравнении с мясом – дешево. Кормовая база такая же, как для кролика, но мех ни в какое сравнение не идет. К примеру, шкурка шиншиллы дороже шкурки кролика в 250 раз.

При взгляде на шиншиллу, грызущую стебелек, напрашивается вывод: «кормишь, как кролика, продаешь, как соболя».

Этот зверек ценен еще и тем, что его мех всегда остается в превосходной форме, то есть сезонной линьки у него нет. Популяция шиншилл миллионы лет живет в суровых климатических условиях, и умение приспосабливаться к переменам у него в крови. А для зверовода необыкновенно важно, чтобы шкурка шиншиллы в любое время года была в прекрасном состоянии, чтобы ее ценность не снижалась, и забой на шкурки может производиться на фермах в любое время года по мере созревания меха и даже в то время, когда шкурки других пушных зверей обесцениваются. Ферма, где выращивают шиншилл – это действующее производство очень дорогой продукции круглый год.

Североамериканский опоссум

Перед вами один из самых примитивных представителей сумчатых. Североамериканские опоссумы имеют архаичную зубную формулу и относятся к подотряду многорезцовых. В каждой половине верхней челюсти у них по пять резцов, а в каждой половине нижней челюсти – по четыре. Всего опоссумы имеют пятьдесят зубов. Конечности также несут примитивные черты – на них по пять одинаково развитых пальцев. Относясь к отряду сумчатых, эти животные не являются исключением и имеют хорошо развитую сумку, но открывается она назад, что является одной из архаичных черт.

Североамериканский опоссум – довольно милое животное, хотя и несколько похож на крысу: острой мордочкой и длинным, почти голым хвостом. Длина его тела может достигать 53 см, а масса – 5,7 кг. Но этот вес животные набирают перед зимовкой. В целом опоссумы имеют размеры домашней кошки. Общий тон окраски серый, мордочка светлая, встречаются темные особи.

Этот вид широко распространен от Южной Канады до Северного Перу и Парагвая. В США был завезен в начале XX века. В настоящее время североамериканский опоссум все больше расширяет свой ареал на север, и единственным сдерживающим фактором является холод. В остальном – это очень неприхотливый зверек. Его можно встретить в самых разнообразных ландшафтах: от гористой местности до болотистых низменностей. Но все же предпочитает жить рядом с источниками воды и нуждается в наличии деревьев. Часто поселяется рядом с жильем человека, самки устраивают логова под постройками. Могут делать гнезда в дуплах деревьев, нишах среди камней, кучах мусора, норах и так далее.

Североамериканские опоссумы ведут преимущественно ночной образ жизни. Они обладают очень ловкими, цепкими лапками и хвостом и поэтому великолепно лазают по деревьям. С наступлением ночи выходят кормиться. Пробираясь по ветвям деревьев и наткнувшись на гнездо, животные обязательно полакомятся его содержимым. При этом часто пользуются своим цепким хвостом, повисая на нем и свободными лапами воруют яйца. Опоссумы едят практически все: разнообразные фрукты и ягоды, культурные растения, насекомых, птенцов, яйца, мышей, рептилий, падаль и так далее. Они весьма прожорливы и поедают все съедобное, что попадает у них на пути. С одной стороны, они наносят некоторый ущерб

хозяйству, поедая фрукты, а при случае и цыпят. С другой, – уничтожают большое количество вредных насекомых, их личинок и грызунов. Так что однозначно отнести опоссумов к вредным животным нельзя, хотя многие и пытаются это делать. Как уже отмечалось, при подготовке к зиме опоссумы сильно жиреют. Это помогает им пережить холодное время. Животные заходят в надежные убежища и спят, иногда довольно долго. Но это не настоящая зимняя спячка. Если зимой попадаетесь теплый день, опоссумы выходят на прогулку, пытаются найти что-нибудь съедобное.

Есть у них еще одна оригинальная черта – они обладают способностью впадать в каталепсию. Эта способность выработалась у них как защитная реакция против врагов. Животное притворяется, что оно мертво и делает это так правдоподобно, что даже знающему человеку заподозрить обман довольно трудно. Ни одно движение, даже дрожание усов и век, не выдадут его. Опоссума можно трогать, терзать, схватить за хвост и бросить в соседний куст, но он и не шелохнется. Конечно, какой уважающий себя хищник будет есть мертвечину, да еще так отвратительно воняющую! Дело в том, что опоссум может источать в моменты опасности или возбуждения очень неприятный, сильный запах, бьющий по острому обонянию любого нападающего.

Опоссумы – одиночные животные. Они не нуждаются в обществе себе подобных и все свободное время проводят в поисках еды. Но для продления рода им все же приходится искать себе подходящего партнера. Именно в это время можно встретить вместе самца и самку. Но этот период длится недолго, и они расстаются. Самка подыскивает удобное место для гнезда и устраивает в нем мягкую подстилку из сухих растений. Интересно, что, передвигаясь, часть собранного материала она несет во рту, а остальное захватывает своим гибким, цепким хвостом.

Беременность длится почти две недели, двенадцать с половиной дней. На свет появляется от восьми до двадцати детенышей. Но самка не в состоянии прокормить такую ораву, так как сосков у нее всего двенадцать – тринадцать, и природа придумала довольно жесткий метод отбора. Только что рожденные детеныши, цепляясь коготками за шерсть матери, устремляются к сумке. Цель ясна: те из них, кто успеет первыми присосаться и занять сосок, выживут, остальные погибнут. Новорожденные малыши весят всего два грамма. Присосавшись, они уже не отрываются от материнского соска ни на секунду, а мать впрыскивает молоко в рот детенышам за счет сокращения мускулатуры млечного поля. Малыши держатся за сосок очень крепко, и их практически невозможно от него оторвать не повредив рот. Более крепкому закреплению способствует и

изменение формы соска. Сначала он имеет продолговатую форму, но после того как на нем повисает детеныш, на конце соска развивается утолщение, помогающее малышу за него держаться.

К концу второго месяца детеныши начинают покрываться шерстью и у них открываются глаза. К этому времени они достигают размеров крысы. Через шестьдесят пять – семьдесят дней малыши наконец-то приобретают некоторую самостоятельность, бросают соски и начинают вылезать из сумки. Но при малейшем испуге или подозрительном шорохе тут же возвращаются в надежное убежище. Молоко они уже не сосут, а делят с матерью ее добычу. Спустя некоторое время они переселяются на спину матери, где сидят, крепко прицепившись своими хвостиками к ее хвосту. Половой зрелости достигают в возрасте одного года.

В природе редко живут больше двух лет – слишком много у них врагов. Но главным является человек, добывающий их ради мяса и красивого меха.

Ёж



Перед вами животное, внешний вид которого известен каждому. Герой многочисленных рассказов и сказок, ёж многим людям кажется простодушным простаком, не представляющим интереса. Кажется, что про ёжиков написано столько, что ничего нового узнать о них невозможно. Но это глубокое заблуждение. Ёж до сих пор загадывает ученым загадки, и даже из того, что о нем известно, многое оказывается неверным.

Обыкновенный ёж населяет лесостепные зоны Евразии, любит разреженные лиственные и смешанные леса, густые кустарниковые заросли, заросшие овраги. Довольно часто поселяется вблизи человеческого жилья, в садах и огородах, в местах, где есть дневное убежище и достаточно пищи. Но сырости ежи не любят, поэтому их редко можно увидеть в заболоченной местности.

Все ежи – сумеречные и ночные животные. На день они забираются в норы, ниши под корнями, в густой кустарник и там спят, свернувшись клубком. В летнее время ежи не заботятся об устройстве уютного жилья. С наступлением же вечера отправляются на охоту. Заметьте, что именно на охоту, а не на сбор растительной пищи. Все ежи относятся к отряду насекомоядных и по своей сути являются природными хищниками. В их меню входят разнообразные насекомые, в том числе немало вредителей. Они поедают майских хрущей, жуужелиц, хрущей, навозников, личинок комаров, дождевых червей, гусениц и др. Также в естественное питание

ежей входят змеи, лягушки, мелкие млекопитающие, яйца, птенцы и взрослые особи наземногнездящихся птиц, иногда ягоды. Так что распространенное мнение о ёжике-вегетарианце оказывается неверным.

«А зачем же тогда ежи накалывают на колючки яблоки?» – спросите вы. На этот вопрос в настоящее время никто не даст вам вразумительного ответа. Есть только разнообразные предположения. Наиболее правдоподобным из них является мнение о защите животного от вредителей. Ежи являются переносчиками пастбищных клещей, и не просто переносчиками, но и одними из важнейших хозяев этих паразитов. Проходя по траве и между кустами, ежики собирают на себя большое количество клещей, в том числе и энцефалитных. Попадая между иголок, насекомые тут же присасываются, а еж не в состоянии от них избавиться. В результате на одном животном может скопиться до нескольких десятков тысяч этих вредных насекомых. Исследователи, занимающиеся изучением клещей, даже ввели такой термин, как «еже-час», обозначающий, сколько клещей соберет ёж в течение одного часа на определенном участке территории. Из этого подсчета делают вывод о степени зараженности данной территории паразитами.

Была замечена странная привязанность ежей к резко пахнущим и едким предметам. Они подбирают окурки, кусочки мыла, газеты и др. Животные их лижут или жуют, а потом лижут иголки, покрывая их едкой слюной, помогающей им справиться с паразитами. С этой же целью они, наверное, и накалывают яблоки, – чтобы кислый сок плодов, стекая по иголкам, прогонял надоедливых нахлебников.

Другая особенность этих удивительных животных заключается в их способности довольно легко переносить действие разнообразных ядов. Даже змеиные укусы не всегда для них смертельны. Хотя после укуса гадюки ежики болеют, но умирают редко, вероятно тогда, когда их организм ослаблен. Ежи могут поедать и ядовитых насекомых, даже таких, которых не ест больше никто. Например, без вреда для своего здоровья ежи съедают жуков-нарывников.

Вообще, несмотря на некоторый ущерб, наносимый ежами наземногнездящимся птицам, их польза как охотников за разнообразными насекомыми-вредителями неоспорима. Они в большом количестве поедают слизней, личинок и взрослых особей майского хруща, волосатых жужелиц, гусениц. А вот мнение о том, что ежи являются страшными врагами грызунов, неверно. Они не настолько ловкие и шустрые, чтобы ловить этих проворных животных. Но с удовольствием разоряют мышьиные гнезда и застав в них хозяев, непременно съедают. Более часто к ним на стол

попадают менее шустрые полевки, но также в небольшом количестве.

Ежи – очень прожорливые животные, как и другие насекомоядные. Все свободное время не занятое сном они ищут пропитание. Именно поэтому они и уничтожают с таким усердием многочисленных насекомых.

На зиму ежи впадают в спячку. Для них это серьезное испытание, и они готовятся к нему практически все лето. Главная цель животных – набрать перед спячкой необходимый запас питательных веществ в виде жира. Если ёж ложится в спячку голодным, то вряд ли он проснется весной. Чаще всего такая беда случается с молодыми ежами. Иногда люди отпускают ежей на волю после того, как все лето продержат их на скудном питании где-нибудь в сарае. Тем самым они обрекают животных на верную смерть. Ежи не смогут быстро набрать необходимый жировой запас и погибнут от истощения во время спячки.

Перед спячкой ежи подыскивают себе подходящее для зимовки место. Найдя нору, дупло в пне, нишу между корнями, они натаскивают в них листья и сухие растения. Затем закапываются в них, сворачиваются в шарик и засыпают. Иногда ежи устраиваются в больших кучах листвы, которые оставляют садоводы на своих участках. Во время весеннего сжигания мусора эти ежи часто гибнут в огне.

Просыпаются ежики ранней весной. Из зимних спален выходят худыми (даже видно, как бока подтянулись) и, конечно, первым делом бросаются на поиски корма. В это время они активны и днем. В голом весеннем лесу хорошо слышно шуршание ежей в старой засохшей листве. В апреле – мае у ежей начинается гон. Он может продолжаться все лето, так как некоторые ежихи оказываются готовы к спариванию в более позднее время, а другие способны принести два выводка за лето. Но поздние ежата скорее всего обречены на гибель. Они не успеют вырасти и набрать необходимый жировой запас. Период беременности ежихи – сорок девять дней. В помете от двух до восьми ежат. Они рождаются совершенно беспомощными, слепыми и глухими. Через несколько часов после рождения у них появляются иголки, сначала мягкие, а затем затвердевающие. Глаза открываются на шестнадцатый день. Мать кормит детенышей молоком около одного месяца. Примерно через два месяца выводок распадается.

Ежи хорошо привыкают к неволе, а некоторые даже становятся ручными. Но любят самостоятельность.

Броненосцы

Броненосцев трудно отнести к животным, так странный их вид. Они напоминают скорее маленьких, ползающих доисторических ящеров и становятся еще более таинственными, когда узнаешь об их родстве с двумя совершенно непохожими на них семействами: ленивцами и муравьедами. Все они относятся к одному отряду – неполнозубые.

В доисторические времена между ленивцами и броненосцами была очень интересная промежуточная форма: милодон. Эти животные были похожи на гигантских ленивцев, величиной с быка, имели очень толстую, не менее двух сантиметров, шкуру с костяными бляшками. Между ними и древними людьми сложились довольно тесные отношения. Люди не только охотились на них, но и держали как домашних животных. Один из видов ископаемых тихоходов был даже назван милодоном домашним.

Наши предки, видимо, содержали их в специально отгороженных частях своих жилых пещер. Они строили очень массивные валы, перегораживающие часть пещеры и лишенные проемов (так что перелезть на другую сторону приходилось, по-видимому, через верх), и в этих загонах содержали милодонов, которых кормили сеном. Как же людям удавалось помещать животных за эти валы? Скорее всего, они добывали детенышей и выращивали их до взрослого состояния.

В настоящее время таких гигантов на Земле нет. Они вымерли десять – двенадцать миллионов лет назад. Тем не менее их потомки не перестают поражать нас своим видом и мощью. Гигантский броненосец достигает вместе с хвостом полутора метров в длину и весит до 55 кг. Своими сильными лапами с огромными когтями он способен рушить даже крепчайшие термитники.

Название отряда указывает на одну из характерных черт броненосцев: все они имеют произвольное количество зубов. Зубы имеют цилиндрическую форму и постоянно растут.

Данные животные великолепно приспособлены для выживания и добывания пищи. Иногда их называют армадиллами, или «несущими доспехи». И действительно, их кожно-костяные панцири чрезвычайно прочны; мало какой зверь может причинить им вред, разломав броню. Зато живот у броненосца мягкий и беззащитный. Стоит до него добраться, и он обречен. Роговые пластинки образуют головной, плечевой и тазовый щиты. Между ними расположен ряд поясов, количество которых является

видовым признаком. Хвост также покрыт роговыми пластинками.

Поражает сила лап броненосцев, снабженных большими и мощными когтями, и великолепно развитая мускулатура. Их мышцы пронизаны густой сетью кровеносных сосудов, обеспечивающих интенсивную подачу кислорода во время напряженной работы, а вся опорно-двигательная система идеально приспособлена для максимально мощного и быстрого рытья. Некоторые виды броненосцев, уловив угрозу, очень быстро закапываются в землю. От этого зависит их жизнь.

От других животных они отличаются сниженным обменом веществ. С этой особенностью связана их область распространения. Все они живут в Южной Америке, и только девятипоясный броненосец обитает на юге Северной Америки. Эти животные не могут выдерживать низкую температуру. Уже при 18 °С температура тела начинает снижаться, и они становятся малоактивными.

Еще одна интересная особенность организации броненосцев связана со строением их дыхательных путей. Они очень вместительные, и животные способны задерживать дыхание на несколько минут. Это защищает их от вдыхания пыли, поднимающейся из-под роющих лап при быстром закапывании в землю. С помощью этой системы броненосцы, кроме того, способны плавать, так как их лучше держит вода и им не страшны захлесты волной, ведь они практически не дышат.

Любимыми местами обитания для одних броненосцев (например, для твердопанцирных) являются леса и кустарники, для других (например, для шаровых) – саванны и травянистые равнины. Но практически все виды – большие любители муравьев и термитов. Выделяется только группа щетинистых броненосцев, которые с удовольствием поедают падаль, червей, улиток, разнообразных насекомых, подземные части растений. Язык броненосцев прекрасно приспособлен к добыванию насекомых: он длинный, тонкий, покрыт липкой слюной. Засовывая его в пролом стены термитника, животное извлекает такое количество насекомых, что способно за короткое время уничтожить большую часть колонии.

Вдобавок ко всему у броненосцев прекрасное обоняние и слух. Они чувствуют насекомое на глубине 20 см, а запах падали улавливают за несколько километров.

Многие животные ведут ночной и сумеречный образ жизни. Поэтому некоторые редкие виды очень плохо изучены. Днем они прячутся в норы, вырытые самостоятельно или другими броненосцами, а с наступлением сумерек выходят на поиски пропитания и не торопясь бредут по равнине, тщательно обнюхивая землю и часто останавливаясь, чтобы вырыть

насекомое.

Своей ночной деятельностью животные сильно досаждают фермерам, перекапывая большие территории или выкапывая ямы в самых неподходящих местах. Поэтому многие виды подверглись массовому уничтожению и теперь находятся на грани исчезновения. Но среди них есть один вид, представителей которого люди специально селят на своих сельскохозяйственных участках. Это девятипоясный броненосец, уничтожающий большое количество вредных насекомых. Конечно, в процессе кормежки он давит какое-то количество посевов, но приносимая им польза во много раз превышает наносимый вред.

Одна из особенностей броненосцев – необычное внутриутробное развитие. Спаривание чаще всего происходит в июле, но яйцо, пройдя первые фазы развития, входит в фазу покоя и может оставаться в ней несколько месяцев. Затем оно опять начинает развиваться, и через некоторое время появляются детеныши. Самое интересное, что все появляющиеся близнецы оказываются только самцами или только самками. Никогда не бывает смешанного помета.

Малыши рождаются зрячими, вполне развитыми и покрытыми мягким панцирем. Он твердеет через несколько недель. Мать кормит детенышей в течение одного – двух месяцев, а через полгода они становятся самостоятельными.

Наиболее распространенным и изученным является девятипоясный броненосец. Как уже отмечалось, он обитает на юге Северной Америки и продолжает свое расселение с помощью человека. Длина его тела может достигать 50 см, а вес – 6 кг. Хотя из названия видно, что на его спине должно быть девять поясов, иногда их количество меняется от восьми до одиннадцати.

Поселяясь в лесной или кустарниковой местности, животное всегда роет нору около корней дерева на склоне ручья или реки. Нора большая и вместительная, может достигать в длину 7 метров. Коридор заканчивается гнездовой камерой, которая устелена подстилкой из листьев и травы. Броненосец часто меняет ее на новую и сухую.

Броненосцы могут выходить на поиски пропитания и днем, но только в прохладную погоду. В сильную жару они сидят дома. Извлечь из норы хозяина трудно, даже если его бронированный зад остался снаружи, так как совершенно не за что ухватиться. Этим и пользуются животные спасаясь от погони. Главное для них – добежать до какой-то норы и спрятать переднюю часть тела.

Поедает девятипоясный броненосец разнообразных насекомых,

червей, улиток, земноводных и другую мелкую живность – все, что унюхает его чувствительный нос и сможет раскопать мощные лапы.

Спаривание происходит чаще всего в июле. Фаза покоя яйца длится около трех с половиной месяцев, после чего оно продолжает развиваться в течение четырех месяцев, и в феврале – марте малыши появляются на свет.

Другой вид – трехпоясный шаровой броненосец, распространен в Южной Америке. Он способен сворачиваться в шар. Отсюда его название. Его панцирь имеет довольно яркую желтую окраску. Тем не менее в траве разглядеть трехпоясного броненосца практически невозможно, так как при малейшей опасности он сворачивается в шар, совершенно незаметный в густых зарослях. Зато эти животные великолепно видны после сжигания старой растительности. В отличие от других сородичей, самка шарового броненосца приносит только одного детеныша; это происходит через пять – шесть месяцев после спаривания.

Щетинистые броненосцы, их еще называют пелюдос (волосатые), также довольно широко распространены в Южной Америке. Свое второе название получили за покрытый щетинистыми волосами панцирь. Длина их тела может достигать 50 см, вес – 4,5 кг. Эти животные до сих пор подвергаются массовому преследованию, поскольку наносят вред сельскому хозяйству. В поисках корма они вырывают много больших и маленьких ямок, чем портят посевы. Лошади, часто попадая в эти ловушки, ломают ноги.

Пелюдос не боится солнца и выходит на поиски корма днем. Для укрытия выкапывает яму, глубиной до двух метров, с гнездовой камерой. В пище наименее притязателен. Именно он с удовольствием питается падалью. Может размножаться два раза в год, принося по два детеныша. Беременность длится примерно три месяца.

Практически все виды броненосцев можно содержать в неволе, но не в комнатных условиях. Наиболее пригодны для этого девятипоясный и трехпоясный шаровой броненосцы. Первый из них отличается большой медлительностью и флегматичностью. Он малообщителен, и доставляет удовольствие лишь его созерцание. Второй вид активнее и хорошо привыкает к неволе и хозяину. Оба вида не проявляют ни малейшей агрессии к человеку и, адаптировавшись к новой обстановке, спокойно относятся к приручившим их людям. С ними можно играть, но в этом отношении шаровой броненосец гораздо живее и интереснее, чем девятипоясный. Он становится полностью ручным, откликается на кличку и бежит за своим хозяином по пятам. Конечно, особой сообразительности от броненосцев ждать не следует, для этого они слишком большие

тугодумы.

Кролики



Несмотря на свою широкую известность, эти милые животные по-прежнему популярны. Особое внимание уделяют им селекционеры, так как кролики являются великолепным материалом для экспериментов. Каждый год появляются новые породы самой необычной раскраски. Но и животные обыкновенной, естественной окраски очень милы и красивы. Среди них есть малоизвестный водяной кролик; он умеет плавать, и ему нельзя отказать в экзотичности.

Европейский дикий кролик, давший начало домашнему кролиководству, благодаря человеку широко распространен. Но предпочитает страны с теплым, мягким климатом. Именно акклиматизация европейского кролика в некоторых странах привела к экологической катастрофе. Особенно пострадала Австралия. Новые поселенцы завезли на ее территорию всего шестнадцать кроликов. Животные, попав в благоприятные условия, стали бурно размножаться. Вскоре люди почувствовали опасность, которая возникла по их вине. Плодящиеся с большой скоростью кролики начали уничтожать культурные насаждения и траву, которой обычно питались овцы. Их норы портили посевные площади. Они вытеснили местных представителей фауны, лишая их пищи. Люди применяли все известные им средства борьбы, но ничего не помогало. Не остановили прирост кроликов ни разнообразные заболевания, которыми их заражали, ни специально завезенные хищники (кстати, они в свою очередь также внесли лепту в уничтожение эндемичных животных Австралии), ни многочисленные заграждения. Приспосабливаясь ко всему, они адаптируются

все лучше. Насколько же гибким и пластичным организмом наградила их матушка-природа!

Естественная окраска европейского кролика прекрасно маскирует его в траве. Общий тон ее буровато-серый, с мелким штриховым рисунком. Живот белый или сероватый. Длина тела достигает 45 см.

При выборе места обитания кролики не привередничают и заселяют кустарниковые заросли, пустоши, сады; могут поселиться и в лесу, любят песчаные почвы и изрезанную оврагами местность.

Кроликов часто называют зайцами, что совершенно неверно. Это разные виды, относящиеся к одному семейству, но имеющие различную биологию и между собой не скрещивающиеся. Между ними есть сходство, но если присмотреться, можно увидеть большие различия. Кролики мельче, компактнее, у них плотное тело и короткие задние ноги. Они не способны совершать огромные прыжки и с помощью быстрого бега спастись от погони. Их тактика совершенно другая. Выходя на кормежку, кролики не уходят далеко от норы и при появлении опасности со всех ног бросаются к ней. На бегу делают частые резкие повороты и броски в сторону, очень юрко уходя от хищника.

Другая яркая особенность выявляется при сопоставлении сроков беременности и степени развития детенышей. Беременность самки кроликов длится двадцать восемь – тридцать дней, в то время как зайчихи – до пятидесяти дней. Зайчата рождаются зрячими, покрытыми шерстью и способными довольно быстро бегать. Крольчонок же появляется на свет совершенно беспомощным, слепым и голым.

Интересная особенность питания кроликов – капрофагия, то есть поедание собственных фекалий. Впрочем, кролики поедают не любые свои экскременты, а только ночные или утренние, названные цекотрофами. Цекотрофы имеют вид мелких мягких темных шариков, покрытых тонкой оболочкой. Они, как пилюли, содержащие большое количество бактерий, витаминов и клетчатки. В результате происходит более полное усвоение питательных веществ и обогащение организма жизненно важными веществами. Но это благо имеет и одну отрицательную сторону: во время массовых заболеваний из-за быстрого распространения инфекции погибает огромное количество животных. Поэтому трудно лечить домашних кроликов от гельминтозов, так как постоянно происходит повторное заражение.

В естественной среде кролики питаются в основном только травой. С наступлением более сурового сезона они поедают ветки кустарников, семена, корни, делают набеги на огороды.

Европейские кролики самостоятельно роют норы, в которых живут постоянно, ежегодно улучшая их и увеличивая в размерах. Норы уютные, и для малышей в них предусмотрены гнездовые камеры, которые самки выстилают травой и своим пухом.

Как уже отмечалось, размножаются кролики очень быстро, практически все теплое время. За один сезон могут принести пять пометов, в которых будет до двадцати детенышей. Беременность длится двадцать восемь – тридцать дней. Мать кормит малышей около месяца, а половозрелыми они становятся к восьми – девяти месяцам.

Водяной, или болотный, кролик, спасаясь от врагов, использует воду, так как прекрасно плавает и ныряет. Но своей норы не имеет и обитает в зарослях прибрежной растительности и в болотистых местностях, поближе к воде. Для выведения потомства самка находит ямку в земле, которую выстилает травой и пухом, и два раза в год, в сентябре и апреле, приносит потомство, за один раз от двух до шести детенышей.

Дикобразы

Перед вами гроза тигров и леопардов – дикобраз. Ему действительно уступают дорогу самые страшные хищники. Кто же он, этот бесстрашный зверь?

Вообще-то, несмотря на свое название, дикобразы – очень симпатичные животные. Они – всего лишь грызуны и относятся к их отряду. Но нужно отдать им должное – это самые большие грызуны Европы и Африки. Длина тела дикобраза достигает 90 см, а вес – 27 кг. Верх спины, бока и хвост покрыты иглами, а на голове и шее растут длинные щетинки, образующие гребень. Все тело покрыто черными плотными волосками и щетинками. На спине длинные, мягкие полосатые (черно-белые иглы, способные подниматься большим веером вокруг корпуса; при этом животное сразу увеличивается в размерах раза в два и приобретает внушительный вид. Но у дикобразов есть и более осязаемое оружие. Хвост и поясница несут на себе короткие, твердые и очень острые иглы. Вот они-то и наводят страх на королей джунглей.

У дикобраза есть определенная тактика действий при возникновении опасности. Некоторое время он бежит неторопливой рысцой. Чувствуя, что враг настигает, дикобраз резко останавливается и делает рывок назад, втыкая острейшие иглы в лапы и морду хищника. Затем отскакивает и убегает. Все иглы легко отрываются от шкуры животного и остаются в ранах врага. Конечно, после такого нападения, желание продолжать преследование пропадает. Обломки игл в мышцах не дают льву бесшумно подкрадываться, делать прыжки, успешно добывать себе пищу, и он становится инвалидом. Именно такие хищники-инвалиды часто встают на стезю людоедства. Человек оказывается единственно доступной жертвой для этих страдалцев. Здесь же они и находят свой конец.

Широко распространено мнение, что дикобразы умеют метать иглы, как дротики. В этом есть доля истины. Иногда животное предупреждает своих врагов громким трещанием хвостовых игл. Их так и называют – «гремящие иглы». Если противник не внял этому предупреждению, дикобраз резко дергает хвостом и иглы вылетают навстречу преследователю. Сила рывка такая, что иглы могут впиваться даже в деревья. Если и это не остановило врага, то дикобраз делает свой любимый маневр: резкое торможение. Таким образом он легко может проткнуть кирзовые сапоги. Поэтому при встрече с дикобразом ведите себя очень

осторожно. Хвост животного всегда обращен навстречу опасности, а значит – к вам.

Распространены дикобразы в северном и восточном Средиземноморье, а также в Южной Азии и от Малой Азии до Южного Китая. Их можно встретить в самой разнообразной местности: от предгорий до лесов. Везде они находят для себя подходящие условия обитания.

Дикобразы ведут сумеречный и ночной образ жизни. Днем они дремлют в своих пещерах или самостоятельно вырытых норах, зачастую имеющих длину 10 м, а в глубину уходящих на 4 м. Поэтому выкопать животное из убежища не так-то просто. В норе дикобразы устраивают гнездовую камеру, в которой делают растительную подстилку, но могут сделать и несколько ложных камер.

Выспавшись в своем безопасном укрытии, с наступлением вечера дикобраз выходит на поиски корма. В своем неторопливом походе он ищет разнообразные аппетитные клубни, семена, ягоды и плоды. Грызет зеленые части растений, корни, ветки. Не прочь съесть насекомое. Иногда забредает на огороды и бахчи, нанося незначительный урон. Таким образом за ночь животное проходит несколько километров.

Часто возле нор дикобразов находят обглоданные большие кости, оленьи рога. Глядя на эти останки, невольно приходит мысль: где-то поблизости обитает страшный хищник. На самом деле животные приносят остатки чужих трапез, чтобы пополнить запасы кальция в своем организме, и периодически грызут «добычу».

Дикобразы приносят в год один – три помета. Все зависит от района обитания. Чем южнее, тем чаще размножаются. В помете от двух до пяти детенышей. Они рождаются с открытыми глазами и мягкими иглами (которые через неделю отвердевают). В это время они похожи на обыкновенных ежей с короткими иглами.

Белки, бурундуки, хомяки

Обыкновенная белка

Благодаря многочисленным сказкам, в которых участвуют белки, у людей сложился определенный портрет этих милых животных. К сожалению, он не всегда соответствует их истинному характеру, однако многие начинающие любители, очарованные сказочным нравом зверьков, готовы во что бы то ни стало приобрести белку для домашнего содержания. Действительно, по рассказам это симпатичное, жизнерадостное, дружелюбное существо, не способное никого обидеть. Любому человеку захочется иметь рядом с собой такого друга. Но дело в том, что первые два качества соответствуют реальности, а вот о двух последних можно поспорить. Впрочем, не будем строить догадки по поводу настоящего характера белки, а постараемся оценить на основании реальных фактов.

Распространена обыкновенная белка практически на всей территории Евразии, имеющей лесные массивы. Не любит поселяться в маленьких лесочках среди большого открытого пространства. Ведет древесный образ жизни, но довольно часто спускается на землю. Великолепно бегают и прыгают по деревьям, находя на них приют, еду, убежище от хищников. Может совершать прыжки с самого верха дерева на землю без вреда для себя. Этим маневром белка спасается от своих самых страшных врагов – кунниц и других кунных. Заметив хищника, она стремительно бежит к верхушке дерева, заманивая врага как можно выше, а затем прыгает вниз, оставляя преследователя в полной растерянности. От хищных птиц белка убегает другим путем: перемещаясь по стволу дерева кругами. Птицы не могут совершать таких резких поворотов среди ветвей и бросают охоту.

Все в теле этого животного приспособлено к жизни на дереве. Ловкие, цепкие лапки с коготками превосходно удерживают белку на коре. Длинный пушистый хвост помогает балансировать и планировать во время прыжков. Зубы способны разгрызать твердые орехи, растущие на любимых деревьях. Передними лапками белка может просто совершать чудеса: их разнообразная деятельность почти равнозначна деятельности рук приматов. Она удерживает ими еду, плетет искусно гнезда, копает ямки, уминает землю, собирает и нанизывает на веточки грибы и так далее.

Белки линяют два раза в год. Весной происходит смена зимней серой шубы на летнюю рыжую шкурку. Осенью наоборот. Брюшко всегда остается светлым, почти белым. Летний мех животного имеет разнообразные цветовые вариации – от пепельного до черного.

Активна белка практически весь день, но больше всего – по утрам и вечерам. Все лето она занята приготовлением запасов на зиму. Она собирает орехи, закапывает их в ямки или прячет в другие потайные места, собирает и сушит грибы. Данная особенность поведения животного играет большую роль в распространении семян деревьев, ведь белка их не только собирает, она их закапывает, то есть практически сажит. Запасенные белкой корма спасают зимой многих животных от голодной смерти. Так что, действительно, белка, собирая орехи и грибы в количествах, гораздо больших, чем ей требуется, как бы старается для всего лесного зверья. Орехи и грибы, однако, являются лишь частью меню этого зверька, хотя и немаловажной. Кроме них в ее естественный рацион входят разнообразные семена, плоды, ягоды, желуди, молодые побеги и почки. Но белка далеко не так безобидна, как ее представляют многие. Это грызун со склонностью к всеядности. Она с большим удовольствием поедает насекомых и их личинки, яйца и самих пернатых, лягушек, ящериц, улиток, разрывает муравейники. Вот вам и вегетарианец!

В ненастные и морозные дни белка предпочитает оставаться дома. А укрытий, где она может переждать непогоду, у нее несколько. Каждое укромное местечко, выбранное белкой, имеет свое предназначение. В одном она спит, в другом выводит потомство, в третьем отдыхает и прячется от непогоды. Для потомства она ищет дупло, одно из самых надежных и теплых укрытий. При отсутствии дупла может сплести гнездо сама. Беличье гнездо – гайно – имеет шарообразную форму, плетется из ветвей; кроме бокового входа иногда есть и еще один, тайный, в сторону ствола дерева. Но если белка найдет удобное сорочье или другое птичье гнездо, то занимает его даже при наличии живых хозяев. В своем доме устраивает мягкую подстилку из сена, мха, лыка, шерсти. Этим же материалом утепляет стены. Получается очень уютное жилище. Любит занимать скворечники и домики других птиц.

Несмотря на хорошую приспособленность белки к условиям существования, бывают времена, когда и ей приходится туго. Это периоды неурожая в лесах. Зверек не сможет пережить зимы без запасов, ведь он не впадает в спячку. И тогда начинает миграцию в поисках более богатых мест. Во время переходов гибнет очень много животных. Иногда им приходится переплывать водные пространства, и они с этим справляются. Именно во время миграций происходит расширение ареала обыкновенной белки. Так были заняты леса Крыма, Камчатки, Кавказа. Во многих местах животные нашли благоприятные условия существования и прекрасно акклиматизировались.

В год самка приносит два помета: один весной, второй летом или осенью. Беременность длится тридцать восемь – сорок пять дней. В выводке от трех до десяти детенышей. Малыши рождаются слепыми, голыми и совершенно беспомощными. Если самка уходит на кормежку, она обязательно закрывает малышей теплой подстилкой. Только через месяц у них открываются глаза и они начинают делать попытки вылезти из гнезда. Мать кормит их молоком полтора месяца, а к двум месяцам детеныши становятся самостоятельными. Через год молодые животные способны размножаться.

Бурундук



Бурундуки имеют замечательный характер и прекрасно подходят для содержания в домашних условиях. Это очень симпатичные жизнерадостные зверьки со светло-серой или рыжевато-окрашенной пятнадцатью темными полосами на спине. У них небольшие черные ушки, веселые глаза и длинный пушистый хвостик. Бурундука практически невозможно спутать с другими грызунами. Конечно, он похож на белку хвостом и некоторыми чертами поведения, но отличается более мелкими размерами и больше времени проводит на земле. Поэтому его иногда называют земляной белкой.

Бурундуки, в отличие от многих представителей своего отряда, активны в светлый период суток, особенно утром и вечером. Они проводят это время в поисках корма. Зверьки прекрасно лазают по деревьям, что позволяет им питаться семенами хвойных пород. Но убежище предпочитают устраивать на земле: в нишах между корнями, под камнями или поваленным деревом. Очень любят поселяться там, где много бурьяна и валежника. Здесь они находят большое разнообразие мест для укрытий и устройства своих кладовых. Иногда поселяются и в дуплах, как белки, но чаще – роют норы. В норах обязательно есть несколько кладовых, отхожая комната и гнездовая камера. Бурундуки запасают большое количество кормов. Если год выдался урожайный, то можно встретить кладовые, вмещающие до восьми килограммов орехов. Запасаемые орехи они носят в защечных мешках. Принесут в кладовку и бегут за новой порцией. Чаще всего их наблюдают именно такими: огромные щеки на шустрых ножках с

пушистым хвостиком. Бурундуки – неутомимые труженики. У них нет ни минуты покоя. Ведь кроме кедровых орешков нужно собрать запасы желудей, ягод, семян. В пищу сгодятся и разнообразные растения, лесные орехи, насекомые и их личинки, улитки.

Запасы бурундуков важны не только для самого хозяина, но и для многих других животных. В случае зимней бескормицы эти корма могут спасти их от голодной смерти. Четыре – пять килограммов отборных кедровых орехов – большое подспорье для белки. А если все восемь килограммов? Тут и медведь не прочь полакомиться.

На зиму бурундуки впадают в спячку. Ложатся осенью и спят до марта. Но зимой периодически просыпаются. Поедят и опять на боковую. Спят звери чаще всего поодиночке, но бывает, что и парами. Проснувшись весной, приступают к спариванию. За сезон приносят всего один помёт, в котором бывает до десяти детёнышей. Беременность самки длится около тридцати дней. Малыши появляются на свет совершенно беспомощными, слепыми и голыми. Шерстка появляется только через три – четыре недели после рождения. Развиваются медленно. Самостоятельными становятся к полутора-двум месяцам. В это время выводок распадается. Самец участия в воспитании малышей не принимает.

Бурундук прекрасно подходит для домашнего содержания. Он быстро привыкает к новому хозяину. Хорошо переносит неволю. Будучи очень ласковым и доверчивым существом, доставляет огромное удовольствие в общении.

Есть у него ещё два хороших качества. Во-первых, он очень чистоплотен. В естественных условиях устраивает себе специальную уборную комнату, а в условиях неволи выбирает для этой цели какой-нибудь удалённый уголок. Поэтому можно придумать специальный туалетик, наподобие кошачьих поддонов с решёткой, установить его в удобном углу и укрепить, чтобы животное не смогло сдвинуть. Теперь остаётся только ежедневно споласкивать этот туалет, и чистота в доме обеспечена. Кроме того, бурундуки не имеют резкого, специфического запаха, характерного для многих грызунов.

Хомяки

Сирийские хомяки

Сирийские хомяки – наиболее популярная разновидность домашних хомяков, первые упоминания о которых появились в XVIII веке. Они происходят из пустынь Сирии.

Эти зверьки любознательные, но уединенные животные. Могут быть очень жестокими друг к другу, поэтому должны жить в отдельных клетках.



Самцы имеют пахучие железы, и метят территорию, поэтому многие любители предпочитают держать самок. Хомяки распознают друг друга по запаху, имеют слабое зрение и хороший слух. Ночью ведут активный образ жизни, а почти весь день спят в своей норе. Вечером, ночью и на рассвете они преимущественно заняты поисками пищи. Едой хомяки наполняют мешки щек и несут ее в нору, которая является также и кладовкой, поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы там не было гниющих продуктов.

Они содержатся в клетках или в стеклянных «аквариумах». Можно воспользоваться также скворечником или картонной коробкой. В клетку можно поместить жердочки, сучки, камушки, беговое колесо, веревку. Хомяки предпочитают норы в защищенном темном теплом месте.

В качестве подстилки не желательно применять опилки (особенно хвойных пород деревьев) и газеты, которые особенно вредны для малышей.

Хомяков следует кормить готовым кормом, небольшим количеством семечек, арахиса, свежими овощами и фруктами. Питьевую воду необходимо менять каждый день. Эти зверьки – чистоплотные животные, их не надо мыть. Слишком длинные когти нужно подрезать. Сирийские хомяки способны к воспроизводству с 4–5 недель, но самки способны

выкормить потомство только после четырех месяцев. Они способны к спариванию раз в четыре дня. Период вынашивания длится около 16 дней.

Живут 2–3 года.

Сирийский хомяк может быть с цветными маркировками (золотой, золотой с белым животом, желтый, жемчужно-дымчатый, ярко-серый, темно-серый, корица, сирень, ржавчина); однотонный (альбинос, белый с красными глазами, белый с черными глазами, древесный уголь, серебристо-серый, черный, шоколад, шампанское, медь, серо-голубой, комбинированный, черепаховый).

Короткошерстные сирийские хомяки

Короткошерстные сирийские хомяки – родоначальники всех других разновидностей. Атласные, длинношерстные и волнистые сирийские хомяки были выведены на их основе.



Короткошерстные хомяки имеют широкую короткую голову, относительно большие глаза, вертикально стоящие уши. Для данной разновидности сирийских хомяков характерны очень большие мешки щек, в которых они носят пищу. Туловище короткое и широкое. Передние лапы имеют только четыре пальца, тогда как задние – пять.

Длина короткошерстного сирийского хомяка без хвоста 120–160 мм, длина хвоста 10–20 мм. Вес 120–180 г. Самки обычно больше и тяжелее самцов.

Шерсть у короткошерстных сирийских хомяков гладкая, короткая и густая, мягкая на ощупь. Данная разновидность разводится в полном диапазоне характерных для сирийских хомяков цветов. Но их гладкая

шерсть особенно хорошо подходит для того, чтобы хвастаться различными маркировками.

Длинношерстные сирийские хомяки

Первый длинношерстный хомяк был рожден в США в 1972 году. Длинная шерсть – рецессивный признак.


За исключением длинной шерсти, стандарт этих сирийских хомяков идентичен короткошерстной разновидности.



Шерсть у данной разновидности очень мягкая, ее идеальная длина 20–30 мм. У самцов она длиннее. Известны редкие экземпляры, у которых длина шерсти достигала 80 мм. У большинства же особей длинная шерсть только вокруг головы, тогда как остальная часть тела – короткошерстная. Длинный волосяной покров может сбиваться и выглядеть неопрятным, но это легко исправить с помощью обыкновенной зубной щетки. Таких зверьков не стоит держать на подстилке из опилок. Длинношерстные сирийские хомяки разводятся в полном диапазоне цветов и маркировок характерных для сирийских хомяков. Длинная шерсть лучше выглядит когда она однородного цвета, т. к. маркировки и пятна растушевываются.

Атласные сирийские хомяки

Первые сообщения об атласных сирийских хомяках появились в 1969 году. Эта разновидность быстро приобрела популярность. Генетический фактор для атласной шерсти доминирующий, поэтому если короткошерстный хомяк будет скрещен с атласным, то существует очень большая вероятность того, что атласная шерсть проявится в первом поколении.



Атласные сирийские хомяки имеют такую же форму тела, как и обычные короткошерстные.

Шерсть у данной разновидности короткая, густая, очень гладкая. Но главное ее достоинство – красивый блеск.

Разводятся они в полном диапазоне цветов и маркировок. Любой цвет кажется более интенсивным в результате блеска. Но красные и черные цвета выглядят наиболее эффектно, придают шерсти потрясающий блеск.

Спаривание двух атласных хомяков приводит к появлению потомства с редкой шерстью. Поэтому атласных хомяков всегда скрещивают с короткошерстными.

Волнистые сирийские хомяки

Неизвестно, когда появился первый представитель волнистых сирийских хомяков. Известно только, что впервые эти особи появились на выставке в 1970 году, после чего разновидность приобрела большую популярность.



Форма тела у волнистого сирийского хомяка такая же, как у обычного короткошерстного. Волосняной покров у данной разновидности короткий, густой, лохматый. Но главная отличительная черта – вьющаяся шерсть, которая не лежит гладко вдоль тела, а торчит почти перпендикулярно ему. Бакенбарды у зверьков также вьющиеся. Волнистые особи разводятся в

полном диапазоне цветов, которые характерны для всех сирийских хомяков. Они могут иметь также некоторые маркировки.

При скрещивании длинношерстных и волнистых сирийских хомяков получается потомство с характерными признаками, которые присущи обоим разновидностям. Такие животные чрезвычайно популярны у любителей.

Сибирские хомяки

Сибирский хомяк – это один из наиболее популярных карликовых хомяков. Впервые он был описан в 1770 году. Происходит из Северного Казахстана и Сибири. Сибирский хомяк относится к группе короткохвостых.

Эти зверьки – спокойные животные, активны ночью. Они имеют пахучие железы на животе, с помощью которых помечают территорию, распознают друг друга по запаху, а не по внешнему виду или с помощью слуха. Зверьки легко приручаются, но все равно часто кусаются.

Сибирские хомяки не любят компанию, живут парами или маленькими группами (лучше, если это один самец и несколько самок). Если регулярное потомство нежелательно, то лучше держать несколько самцов. Сформировавшаяся группа плохо воспринимает вновь прибывших, поэтому невозможно соединить взрослых особей. Сибирские хомяки – плохие альпинисты, не подпрыгивают, поэтому могут жить в стеклянных клетках без крышки. Клетка может быть небольшой, т. к. эти животные не любят активный образ жизни. Они склонны к ожирению. Спальным местом может быть либо специальный домик для хомяков, купленный в магазине, либо скворечник и т. п.



В качестве подстилки для сибирских хомяков можно использовать

опилки, если у хомяков нет на них аллергической реакции. Солома для этих целей не подходит. Чистить клетку следует раз в неделю.

Сибирские хомяки едят главным образом семена и мелких насекомых. Овощи и фрукты – в ограниченных количествах.

Самки способны к размножению с 3–4 недель, но лучше подождать до трех месяцев. Если самка и самец живут в разных клетках, то их лучше скрещивать на нейтральной территории. Срок беременности – примерно 19 дней.

Живут 2–3 года.

Тело сибирского хомяка напоминает шар диаметром около 70 мм. Голова маленькая и широкая, с круглыми глазами. Лапы короткие, с пятью пальцами, на подошве растет шерсть. Хвост короткий, покрыт редкими волосами. Они имеют плотный короткий волосяной покров.

Сибирские хомяки очень маленькие. В дикой природе они весят 20–25 г, в неволе могут быть в 2 раза тяжелее. Сибирские хомяки обычно черно-серого цвета с черно-коричневой полосой на спине. Живот светло-серый, уши и глаза – темные. Это обычная раскраска сибирских хомяков. Выведены также особи сапфирового и жемчужного цветов.

Когда день сокращается, шерсть начинает медленно белеть, может стать полностью белой. Но домашние животные редко становятся белыми. Самцы в этот период не плодовиты.

Хомяки Роборовского

Хомяк Роборовского – карликовый хомяк, обитает в южной и западной Монголии (зона пустынь). Он относится к группе короткохвостых хомяков. Домашним животным стал совсем недавно.

Они живут преимущественно парами или небольшими группами, но можно держать одного самца с несколькими самками. Зверьки общительны между собой, дружелюбны с людьми, редко кусаются.

Хомяки Роборовского наиболее активны вечером, ночью и ранним утром. Они плохие альпинисты, плохо умеют лазить и совсем не подпрыгивают, поэтому их можно держать в стеклянной клетке-аквариуме без крышки. Это подвижные животные, которые любят много бегать, для чего в клетку неплохо бы поместить беговое колесо. Обязательно должен быть и уютный домик для отдыха.

Несмотря на свою высокую подвижность, при обильной еде хомячки могут стать очень тучными, что значительно сократит продолжительность их жизни. Поэтому высококалорийными овощами и фруктами их можно кормить только в ограниченном количестве.



В рацион хомяков Роборовского обязательно должен входить животный белок (земляные или мучные черви, личинки), сухой корм для кошек и собак. Как и всем хомякам, им нельзя есть очень много жирного.

Клетку следует чистить раз в неделю, не забывая регулярно удалять из «кладовки» несвежие продукты.

Хомяки Роборовского очень плохо размножаются, т. к. они избирательны к своим партнерам. Большинство самок не рожают до конца зимы. Малыши обычно остаются с матерью в течение 5 недель, что на 2 недели больше, чем у других карликовых хомяков.

Живут 1,5–2 года.

Хомяки Роборовского – самые маленькие хомяки, длина их тела всего 70–90 мм. Они имеют короткую широкую голову, большие круглые глаза. Короткий хвост скудно покрыт шерстью. Большие, вертикально стоящие уши. Подошва лап покрыта волосками. Весят около 35 г.

Шерсть у хомяков Роборовского красивая, очень мягкая, длиннее, чем у других карликовых хомяков. Она не гладкая, а слегка взъерошенная.

Естественный и единственный цвет зверьков – золотисто-коричневый со скрытым серым. На спине нет никакой полосы или арочной маркировки. Живот белый. Зимой хомяк более серый, чем летом.

Хомяки Кемпбела

Хомяки Кемпбела происходят из Центральной Азии, северной части России и Северного Китая. Обнаружил его Томас Кемпбел в 1905 году.

Хомяки активны в сумерках, днем спят. Плохие альпинисты. Не любят компанию из особей собственного вида. Самку и самца лучше держать как пару. Зверьки могут жить в домике для хомяков или в «аквариуме». Необходим домик для отдыха.



Едят мало. Их нельзя перекармливать. Можно кормить специальным кормом для хомяков. Иногда в рацион можно добавлять немного овощей и фруктов, животный белок. В кормушке всегда должно быть сено.

Живут 2–3 года.

Две разновидности хомяков могут жить вместе, хотя большая часть их потомства не будет способна к размножению.

Натуральный цвет хомяка – коричнево-серый с темно-серой полосой на спине. Бывают также опалового и серебристого цвета. Встречаются альбиносы и пятнистые особи.

Обыкновенные хомяки Кемпбела

Обыкновенная короткая шерсть – первоначальная форма хомяков Кемпбела. В дикой природе можно встретить хомяков только с таким волосиным покровом. Все другие разновидности были искусственно выведены.

Обыкновенный хомяк Кемпбела – представитель короткохвостой группы хомяков. Длина его тела около 70–90 мм. Весит примерно 40 г. Длина хвоста всего 10 мм. Он покрыт небольшими волосками. Самцы, как правило, больше и тяжелее, чем самки.

Шерсть у этих зверьков короткая и густая, она не лежит гладко вдоль тела, а слегка взъерошена.

Данная разновидность разводится во всем диапазоне цветов, которые характерны для хомяков Кемпбела, – коричнево-серые, опаловые, серебристые. Нередко встречаются альбиносы и особи, у которых волосиный покров окрашен в два или три цвета, характерных для хомяков Кемпбела, в самых различных соотношениях, – пятнистые хомяки.

Атласные хомяки Кемпбела

Атласный хомяк Кемпбела был впервые выведен в Англии. Он был случайно обнаружен в 1981 году среди выводка хомяков с обыкновенным волосяным покровом.



К внешним характеристикам атласной разновидности хомяков Кемпбела предъявляются такие же требования, как и к обыкновенной разновидности. Зверьки имеют такое же строение тела и такой же короткий, слегка покрытый короткой шерстью хвост.

Главной отличительной чертой атласных хомяков Кемпбела является очень красивая, блестящая шерсть. Они разводятся в полном диапазоне цветов хомяков Кемпбела. Но эти зверьки не имеют большого разнообразия сочетаний характерных им окрасок, т. к. ген, который отвечает за появление пятен, делает шерсть атласных хомяков очень неопрятной. По этой причине многие селекционеры предпочитают разводить атласных хомяков Кемпбела только однородного цвета.

Китайские хомяки

Китайские хомяки принадлежат к длиннохвостой группе. Длина хвоста – внешнее различие, но имеется различие и в географическом положении.

Эти домашние зверьки происходят в основном из Северного Китая, где обитают как на обширных бесплодных равнинах, так и в густом лесу. Первое сообщение о китайском хомяке появилось в 1900 году.

Зверьки активны только ночью и в сумерках. Днем обычно спят. Они превосходные альпинисты, очень подвижны. Должны жить обязательно в отдельных клетках, т. к. могут агрессивно относиться к себе подобным. Кусаются редко, только если чувствуют угрозу. Легко приручаются.

Китайские хомяки могут жить в обычной металлической клетке со множеством перекладин или в стеклянном «аквариуме», закрытом специальной крышкой, которая позволяет проникать внутрь воздуху. Для

подстилки лучше применять толстый слой опилок (избегать сосновых). Неплохо поместить в клетку беговое колесо. Зверьки нуждаются в удобном месте для отдыха. Хомяку требуется много сена (для корма и для устройства гнезда).

Китайские хомяки едят и пьют очень мало, не имеют тенденции к избыточному весу. К обычной еде хомяка неплохо добавлять немного свежих овощей и фруктов, животный белок, который очень необходим для их жизнедеятельности.



Отличительной особенностью этих хомяков является то, что они практически не имеют запаха. Благодаря этому они стали довольно популярными домашними животными. Зверьки сами заботятся о своей чистоте.

Клетку следует чистить раз в неделю, дезинфицировать хотя бы раз в месяц, постоянно проверять «кладовки» хомяков, чтобы в них не появились гниющие продукты.

Половая зрелость у китайских хомяков наступает в 4 недели (у самки – в 2 месяца). Для оплодотворения самку необходимо помещать в клетку к самцу либо на нейтральную территорию. После спаривания самка должна быть возвращена в собственную клетку. Период вынашивания примерно 21 день, в каждом выводке 6 и более малышей.

Живут 2–4 года.

Китайские хомяки имеют хрупкое стройное тело, длиной 100 мм. Весят 40 г. Их отличительная особенность – длинный хвост, который имеет длину около 20 мм.

Шерсть у зверьков короткая, блестящая, шелковистая, гладкая, довольно плотно лежит вдоль тела.

Естественный цвет китайских хомяков – коричневый или серый с черной отметиной на спине. Нередко встречаются также белые особи.

Домашние крысы, песчанки, морские свинки

Крысы

Ручные крысы

Предшественником ручной крысы была рыжая крыса, или пасюк, которая происходит из Азии. В Европу, Англию и США крысы прибыли на торговых морских судах.

Первая рыжая крыса была описана в Европе в 1728 году. Рыжая крыса лучше приспосабливается к окружающей среде, чем «родная» европейская черная крыса, поэтому быстро стала ее вытеснять.

На протяжении всего своего существования черные и рыжие крысы массой уничтожались. В 1901 году крысы впервые появились на выставках в Англии. Ведущую роль в превращении крыс в домашних животных сыграла госпожа Дуглас. Затем интерес к ручным крысам спал, и только в 1970 году начали появляться новые породы. Крысы стали популярными домашними животными.

Ручные крысы сохранили все достоинства своих диких сородичей – сообразительность, умение различать врага, но потеряли такие отрицательные качества, как дикость, кровожадность и т. п. Крысы – высокоинтеллектуальные существа, прекрасные приятели для детей.

Редко кусаются, но нуждаются во внимании. Им необходимо уделять не менее 1 часа в день. Если такой возможности нет, то лучше держать двух и более крыс.

Попадают некоторые особи, которые ищут тесного общения с человеком и при заботливом уходе становятся очаровательными домашними животными.

Крысы – чистоплотные животные, поэтому нет необходимости в частом купании их. Когти следует иногда подрезать.

Они не испускают в такой степени запах, как домашние мыши, поэтому требуют меньшего ухода.

Клетку необходимо чистить раз в неделю. Если возникает необходимость – можно чаще. Желательно хотя бы раз в месяц ее дезинфицировать.

Взрослые самцы крупнее и спокойнее самок.

Крысы способны к проживанию в больших колониях – молодые и старые, самцы и самки.

Ручные крысы – способные ученики, если их обучению посвящать достаточно много времени. Их можно носить на плече или в сумке на

бедре. Нельзя держать крысу за кончик или за середину хвоста – это может его повредить.

Содержат их в (стеклянных или из металлической сетки) просторных клетках, которые должны хорошо закрываться, так как крысы могут быстро сообразить, как открывается дверь. Но нет необходимости закрывать на несколько запоров.

Дно клетки должно быть покрыто опилками (нельзя применять хвойные породы деревьев), бумагой или ветошью. В углу можно устроить спальню из дерева, кирпича или камня. Неплохо поместить толстые ветки, по которым крысы будут охотно лазить. В клетку необходимо постоянно помещать разные новые предметы для обследования и игры с ними – это удовлетворит любознательные инстинкты крыс. Без таких «игрушек» у крыс могут возникнуть поведенческие проблемы. Крысы – всеядные животные, не остаются равнодушными ни к чему, что находится перед ними. Следует избегать высококалорийных, жирных продуктов, сладостей и т. п. В рацион обязательно должны входить овощи и фрукты. Всегда должна быть чистая вода в автопоилке.

Половая зрелость наступает в 6–7 недель, но самку можно покрывать не ранее 4 месяцев, а лучше в 7. Самца и самку необходимо разместить на нейтральной территории. После спаривания, во время беременности и выращивания малышей их можно оставить вместе. Но все же самца лучше отсадить, чтобы он снова не покрыв самку сразу после рождения крысят. Период беременности около 22 дней.

Самки могут обитать вместе. Они будут помогать друг другу в кормлении малышей, не делая никакого различия между собственным потомством и потомством соседки.

Крысы имеют большие выводки – от 6 до 12 малышей в каждом. Были случаи, когда рождалось по 20 крысят.

Живут 2–3 года, хотя некоторые особи достигают 6 и более лет. Большинство крыс умирают молодыми от рака.

Крысы бывают самых различных цветов: дикой окраски (золотая, серебристая, корица), одноцветные (альбинос, белая с черными глазами, молочная, черная, рыжая, шампанское), с цветными маркировками. Регулярно появляются все новые и новые цвета.

Коротковолосые крысы

Короткий волосяной покров – первоначальная форма. Все другие разновидности – ее производные.

Хотя крысы разводились с различными видами шерсти,

короткошерстные особи преобладают.



Это довольно массивные животные с длинными телами. Длина их туловища около 240 мм. Весят они 500 г. Хвост длинный, около 200 мм, толстый у основания, постепенно сужается к кончику, не должен иметь абсолютно никаких пятен.

Коротковолосые крысы обладают пропорциональными, слегка покрытыми шерстью лагами. На передних лапах 4 пальца, на задних – 5.

Уши и хвост у данной разновидности слегка покрыты шерстью. Относительно длинная голова. Глаза большие, круглые. Уши широкие, округлой формы, приземистые, но не слишком большие.

Шерсть у коротковолосых крыс короткая, гладкая, с блеском. Они разводятся во всем диапазоне цветов.

Атласные крысы

Атласная разновидность ручных крыс была обнаружена сравнительно недавно, впервые описана в США. В Европе атласные крысы еще очень редки, значительно шире распространены в США, где они регулярно появляются на всевозможных выставках.



Данная разновидность имеет такое же строение тела, как и особи с обычной шерстью. Волосяной покров у атласных крыс короткий, гладкий, с изумительным глубоким блеском. Шерсть плотная, очень приятная на ощупь. Блеск шерсти – главная отличительная черта и достоинство этих домашних зверьков.

Атласные крысы разводятся в полном диапазоне цветов и маркировок, которые характерны для всех ручных крыс. Красивый блеск шерсти облагораживает практически любой цвет, делает его более насыщенным, привлекает внимание. Некоторые маркировки выглядят особенно хорошо.

Волнистые крысы



Первые представители волнистых крыс были выведены британским генетиком Роем Робинсоном в 1976 году. Они отличаются от других крыс только вьющейся шерстью, а остальные характеристики у них такие же. Данная порода нашла довольно широкое распространение. Зверьки обладают красивой, слегка шершавой вьющейся шерстью, которая немного длиннее, чем у крыс с обычным гладким волосяным покровом. Она не лежит гладко, а слегка торчит. Бакенбарды у этих крыс тоже слегка вьются, придают мордочке забавное выражение. Особи взрослых волнистых крыс

выглядят намного привлекательнее молодых. Данная порода крыс разводится во всем диапазоне цветов и маркировок ручных крыс. Но вьющаяся шерсть плохо подходит для цветных маркировок и пятен, т. к. они нечетки, расплывчаты, поэтому крысы с такой расцветкой не пользуются большой популярностью.

Бесшерстные крысы



Первые сообщения о бесшерстных крысах были опубликованы в 1932 году. Эти крысы выведены путем мутации. Их выставляют только в США. Такие крысы должны быть полностью без шерсти. Разрешается только небольшое ее количество на голове, животе и лапах. Кожа должна быть чистой, без шрамов и пятен. Бесшерстные крысы могут иметь крошечные бакенбарды. На выставки допускаются два типа крыс: полностью без шерсти или с небольшими пучками в определенных местах. Данная разновидность вряд ли станет широко популярной, т. к. любителей мало привлекает отсутствие шерсти. Первоначально трудно было вырастить взрослых бесшерстных крыс, т. к. самки не производили в достаточном количестве молоко для выкармливания малышей. Бесшерстные крысы имеют такое же строение, что и крысы с обильным волосяным покровом. Разводятся в полном диапазоне цветов.

Бесхвостые крысы

Бесхвостые крысы – результат мутации. Первые особи были обнаружены в США в 1942 году. Первая бесхвостая крыса была выведена любителем в 1983 г. Эта разновидность очень редка.



Крысы активны, интеллектуальны и общительны. Большинство из них не страдает из-за отсутствия хвоста. Исключение составляют только те особи, у которых имеются и другие деформации кости. Форма тела несколько другая, чем у крыс с хвостами. У бесхвостых крыс тело должно быть грушевидной формы и не должно быть никакого остатка хвоста.

Разводятся с обычной, атласной и вьющейся шерстью, а также вовсе без шерсти в полном диапазоне цветов.

Некоторые бесхвостые крысы имеют трудность с размножением. Поэтому многие селекционеры спаривают их с крысами, имеющими хвост. В результате такого спаривания, как и спаривания между двумя бесхвостыми крысами, может одинаково рождаться смешанное потомство, в том числе и без хвоста, но некоторые особи могут иметь остаток хвоста.

Крыса думбо

Крыса думбо – одно из самых новых достижений селекционеров. Данная разновидность была выведена в Калифорнии. Впервые она была обнаружена в 1991 году. В качестве домашнего животного еще не получила широкого распространения.

Свое название крыса получила по имени слона из диснеевского мультфильма. Эта крыса выделяется формой уха.

Необычная форма ушей – типичная характеристика породы. Они должны быть как можно больше.



Голова у крысы думбо более широкая и более сглаженная, чем у других крыс. Мордочка довольно острая. Своей грушевидной формой тела она похожа на бесхвостых крыс, но имеет более короткое тело и длинный

хвост.

Крысы думбо менее активны.


Их волосяной покров может быть самым разнообразным – обычным, атласным, вьющимся или вовсе отсутствовать.

Эти зверьки разводятся в широком диапазоне цветов и маркировок, которые характерны для ручных крыс.

Песчанки

Монгольские песчанки

Монгольские песчанки широко распространены в пустынях Монголии и Северного Китая. Их место обитания – засушливые природные зоны со скудной растительностью. Во время невыносимого зноя песчанки постоянно прячутся под землю, где роют всевозможные ходы. В середине XIX века первые представители монгольских песчанок были завезены в Париж из Северного Китая. Сначала они жили в зверинцах и в лабораториях, но с течением времени постепенно начали появляться и у любителей. За последние двадцать лет монгольские песчанки стали очень популярными домашними грызунами. Эти зверьки – очень милые домашние питомцы. Они очень общительны. В дикой природе живут группами. Незнакомые взрослые особи всегда реагируют на себе подобных враждебно. Распознают друг друга в основном по запаху. Если член группы был удален из нее на несколько дней, то по возвращении группа его не примет.



Монгольские песчанки кусаются редко – только в особых случаях, когда им кажется, что их подстерегает какая-то опасность. Зверьки довольно быстро приручаются. Легко вступают в контакт с людьми – приходят на зов, берут пищу из рук. Ручные песчанки охотно идут в руки. Когда их выпускают из клетки, они не прячутся, как многие другие грызуны. Монгольскую песчанку нельзя брать за середину или за кончик хвоста – он может оторваться. Отличительной особенностью монгольских песчанок является их круглосуточная активность с небольшим отдыхом каждые два часа.

Монгольские песчанки могут жить в обычных металлических или в стеклянных клетках-аквариумах. Они очень любят рыть, поэтому на дно клетки желательно насыпать достаточное количество песка, смешанного с

опилками и сеном.

Монгольские песчанки – отличные альпинисты, могут легко выпрыгивать из клетки. Поэтому на клетке должна быть крышка, стойкая к острым зубам зверьков, но пропускающая достаточное количество воздуха.

В клетке следует оборудовать «спальню», для чего вполне подойдут скворечник, горшок для цветов и т. п. Ни в коем случае нельзя помещать в клетку беговое колесо, т. к. оно может повредить или оторвать хвост зверька. Оторванный хвост не отрастает.

Песчанки любят чиститься в чистом белом песке, насыпанном в ванночке. Так что нет необходимости их мыть. Они очень комфортные домашние животные, т. к. не выделяют запаха. За зверьками довольно просто ухаживать, они не требуют особого ухода.

Песчанки нуждаются в небольшом количестве еды (10–15 г в день). Пищей им может служить обычный корм для грызунов, животный белок, кусочки свежих овощей и фруктов, сено, немного веток мягких неядовитых пород деревьев, чтобы удовлетворять инстинкты грызуна. Пьют немного, но в поилке всегда должна быть свежая вода.

Их малыши рождаются в заранее вырытом месте, которое обычно прикрыто сеном или кусочками бумаги. В каждом выводке обычно по 4–5 малышей.

Можно оставлять самку с выводком вместе с другими членами группы. Самец играет большую роль в выращивании маленьких песчанок.

Живут 3–5 лет.

Монгольские песчанки весят 75-120 г. Самцы обычно тяжелее и массивнее самок. Длина тела зверьков около 120 мм, длина хвоста 80-110 мм. У них тонкое, хрупкое, грациозное тело с короткой шеей. Тело и хвост покрыты шерстью. Задние лапы длиннее передних. Голова короткая, широкая. Большие, выразительные глаза. Маленькие, овальной формы уши.

Волосной покров короткий, густой, гладкий, с красивым блеском. На кончике хвоста шерсть образует своеобразную небольшую метелку, которая является отличительной особенностью большинства песчанок.


Монгольские песчанки могут быть самых разнообразных цветов и оттенков. Они бывают дикой окраски (серебряная, желтая, медовая, песок), одноцветные (черная, сирень, серо-голубая, белая с красными глазами). Нередко встречаются особи с различными маркировками.

Толстохвостые песчанки

Толстохвостые песчанки происходят из северной части Сахары. Они ленивые, спят почти целый день, только ночью выходят на поиски

продовольствия. Вся их деятельность ограничивается минимальными потребностями. Кусаются редко.

В неволе плохо размножаются, т. к. они существа необщительные, ведут уединенный образ жизни. Период беременности длится около 19 дней. Средний размер выводка – 4 малыша.



Клетку для толстохвостой песчанки следует оборудовать как для монгольской песчанки. У толстохвостой песчанки округлое тело, почти без шеи. Голова широкая, большие темные овальные глаза. Лапы короткие. Длина тела 80-100 мм. Вес – 40–50 г. Свое название толстохвостые песчанки получили за толстый приземистый хвост, в котором могут хранить питательные вещества и влагу.

Шерсть короткая и мягкая, немного длиннее, чем у большинства песчанок, слегка взъерошенная. Волосяной покров цветной, живот белый.

Песчанки шав

Песчанки шав – обитатели пустынь Северной Африки. Особенно широко они распространены в Египте.

Это необщительные животные. Они весьма нетерпимы друг к другу, поэтому их лучше не держать смешанными группами. Самки очень агрессивны с самцами и враждебны с другими самками. По этой причине лучше держать в одной клетке двух самцов.



Заботиться о песчанках шав следует таким же образом, как и о

монгольских песчанках.

Период беременности у зверьков длится около 25 дней. В каждом выводке 2–5 малышей.

Длина тела этих песчанок составляет 120–140 мм. Шерсть у них короткая, гладкая, блестящая.

Эти зверьки пятнистые. Основной цвет – рыжий с небольшой черной пометкой. Глаза и когти более темные. Живот белый. Хвост покрыт шерстью, которая на кончике образует небольшую черную кисточку.

Бесцветные песчанки

Бесцветные песчанки происходят из пустынь Египта и других областей Северной Африки.

Они очень похожи на монгольских песчанок, о них можно заботиться таким же образом.



Эти зверьки активны, любознательны, могут жить по одному, так и небольшими группами. Они очень любят тепло, поэтому их лучше содержать в закрытом помещении. Клетка ни в коем случае не должна находиться на сквозняке.

Бесцветные песчанки совершенно неприхотливы в пище. Едят и пьют они очень мало.

Зверьки меньше и стройнее, чем монгольские песчанки. Длина тела около 100 мм. Голова маленькая, большие темные глаза и большие уши хорошо выделяются.

Шерсть у зверьков короткая, на хвосте она более короткая и менее густая, чем у монгольской песчанки. Живот, лапы и нижняя часть хвоста белого цвета, тогда как остальная часть тела – песочного.

Морские свинки

Морские свинки происходят из Южной Америки, где они были одомашнены инками, которые разводили их ради мяса и забавы. В XVI веке были завезены в Европу, где вначале обосновались в лабораториях. Но вскоре стали популярными домашними животными. В XIX веке разведение морских свинок процветало в Англии. Сегодня морские свинки – популярные домашние грызуны.

Это общительные животные, незлобны. Отличительной чертой их является наибольшая дневная активность. В природе зверьки живут большими колониями, поэтому домашние морские свинки любят компанию себе подобных. Их содержат поодиночке, парами или группами. Но держать вместе в одной клетке самцов не рекомендуется, т. к. они очень нетерпимы и агрессивны друг к другу.



Морские свинки издают разнообразные звуки, чем-то похожие на хрюканье, которые выражают их настроение. Они очень чистоплотные животные, чистятся несколько раз в день.

Морские свинки очень чувствительны к высокой температуре и к холоду. Идеальной температурой для них считается 17–24 °С. Для содержания зверьков необходима просторная клетка, можно без крышки. Если клетка будет ограничивать подвижность зверька, то он быстро растолстеет, что сократит его жизнь. Морские свинки не способны лазить по стенкам, мебели, что очень удобно в содержании.

На дно клетки следует насыпать опилки, песок. Чистить клетку необходимо примерно раз в неделю, дезинфицировать раз в месяц.

Зверьки питаются исключительно растительной пищей. Им всегда должно быть доступно сено. Ежедневно необходим витамин С. Любят пожевать веточки деревьев. Воду в автопоилке необходимо менять каждый день.

Морские свинки не нуждаются в большой заботе. Уход за ними доступен даже детям. Исключение составляют только длинношерстные особи, которых необходимо расчесывать каждый день. Слишком длинные когти подрезают.


Легко приручаются, практически не кусаются. Половое созревание обычно наступает в 2–3 месяца, но самку можно покрывать не ранее 10 месяцев. Период беременности 65–70 дней. Обычно бывает 2–3 выводка в год по 2–4 малыша в каждом. Самца можно оставить вместе с самкой и выводком.

Живут 6–8 лет.

Цвета морских свинок: дикая окраска (золотая, серая, серебристая, корица, лосось), одноцветные (черные, шоколадные, сирень, бежевые, красные, золотые, тепло-желтые, сливки, альбинос, белые с темными глазами), с маркировками.

Гладкошерстные морские свинки

Гладкая шерсть – первоначальный тип шерсти. Данная разновидность морских свинок наиболее многочисленная.



Они имеют мощное строение. Тело у них коренастое, округлой формы. Нос несколько закруглен к концу, имеет мягкий изгиб римского профиля. Этот изгиб, проходя через голову, переходит в легкую впадину на спине, поднимаясь некоторой выпуклостью, заканчивается на крестце округлостью мягкого профиля. Глаза большие, выразительные и выпуклые. Уши в форме лепестка розы, слегка наклонены.

Зверьки не имеют видимого хвоста. У них 4 пальца на передних лапах, 3 – на задних. Весят они 900-1200 г

Волосной покров у данной разновидности короткий, длиной около 30 мм, гладкий.

Подшерсток мягкий, внешняя шерсть более грубая, жесткая. Гладкошерстные морские свинки разводятся в широком диапазоне цветов. Гладкая шерсть идеально подходит к маркировкам, т. к. они не смазываются.

Атласные морские свинки

Атласные морские свинки происходят из США. Отличительная черта – глубокий блеск волосяного покрова. Их шерсть не нуждается в большей заботе и внимании, чем шерсть обычных гладкошерстных морских свинок. Зверьки имеют такое же физическое строение, как обычные гладкошерстные представители.




У атласных морских свинок шерсть гладкая, густая, с потрясающим блеском по всей длине, но более мягкая, чем у обычных особей. Имеет небольшой подшерсток. Длина шерсти около 30 мм.

Атласные морские свинки разводятся в широком диапазоне цветов, но некоторые цвета еще официально не признаны. Самыми распространенными являются красный, золотой, сливовый, белый. Существуют особи с дикой окраской. Новые разновидности морских свинок были выведены путем скрещивания волнистых, длинношерстных и атласных морских свинок.

Абиссинские морские свинки

Порода абиссинских морских свинок выведена в Англии, наиболее популярная разновидность после гладкошерстных морских свинок.

Хотя шерсть у них более длинная, чем у других представителей, за ними требуется такой же уход, как и за гладкошерстными. Имеют такое же физическое строение, как и другие морские свинки. Но розетки делают плечи менее заметными.



Абиссинские морские свинки покрыты жесткой длинной шерстью, из которой формируются розетки. Шерсть должна торчать, а не лежать, должна быть как можно более жесткой, длиной не более 3–4 см. Розетки распределены равномерно по всему телу, не сливаясь. Форма и размер розеток очень важны. Они должны быть большими и круглыми, с достаточным количеством шерсти.


Абиссинские морские свинки приобретают нужный вид примерно к полутора годам.

Их цвета могут быть различными. Наиболее популярны красные, черные, белые, трехцветные особи.

Волнистые морские свинки

Волнистые морские свинки – относительно новое достижение селекционеров, но они уже приобрели широкую популярность в качестве домашнего животного.

Вьющийся волосяной покров – рецессивный признак, поэтому при скрещивании особей, обладающих вьющейся шерстью, с короткошерстными особями на свет производится гладкошерстное потомство.



Волнистые морские свинки имеют такое же строение тела, как гладкошерстные особи.

Зверьки очень привлекательны, имеют грубую вьющуюся шерсть, которая не лежит гладко вдоль тела, а стоит почти вертикально.


Она густая, на голове немного короче, чем на остальном теле.

Данная разновидность разводится в широком диапазоне цветов, но не все из них пригодны для показа. Трехцветные особи становятся очень популярными, но им не уступают одноцветные черные, белые и красные зверьки.

Английские морские свинки

Английские морские свинки чрезвычайно популярны в разных странах. Главный отличительный признак – корона из волос в центре лба.

Об английских морских свинках следует заботиться так же, как о гладкошерстных или атласных морских свинках – они нуждаются в минимальном внимании. Между этими разновидностями нет особых различий.



Корона – доминирующий признак, поэтому при спаривании гладкошерстных особей с английскими получается потомство с короной.

У них гладкий волосяной покров с небольшим подшерстком. Длина шерсти около 30 мм. Шерсть в короне растет от одного центра в разные стороны. Цвет короны должен быть таким же, как все остальное тело, без постороннего оттенка. Английские морские свинки разводятся во всем диапазоне цветов. Но наиболее характерные – цвета дикой окраски и одноцветные черный, красный, белый, кремовый.

Американские морские свинки

Разновидность американских морских свинок популярна во многих странах. Они должны иметь четко обозначенную и расположенную точно в центре лба корону из волос, цвет которой должен быть чисто белым без всяких примесей. Корона – доминирующий признак. Они имеют те же свойства, что и другие коротковолосые морские свинки. Заботиться о них несложно. Строение тела у них такое же, как у всех морских свинок. Тело коренастое, мускулистое, округлое. Лапы короткие, сильные, прямые.



Различие между английской и американской породой в том, что американская имеет белую корону, которая контрастирует с телом. Волосы такой же, как у английской морской свинки.

Американские морские свинки разводятся в широком диапазоне цветов, включая красный, черный, золотой. И, конечно же, у всех красивая белая корона. Самый распространенный цвет данной разновидности – красный.

Перуанские морские свинки

Перуанские морские свинки – популярные домашние длинношерстные животные. Для поддержания их волосяного покрова в хорошем состоянии требуется много усилий. Его необходимо каждый день расчесывать, чтобы он не сбивался. Перуанским морским свинкам лучше изредка подрезать шерсть, что поможет содержать ее в порядке без особых хлопот. Ген с длинной шерстью – рецессивный признак.



Перуанские морские свинки имеют такое же строение тела, как и другие, но оно скрыто длинным волосяным покровом. Их отличительный признак – розетка на голове. Шерсть у них мягкая, короткая только на мордочке. Нет никакого стандарта для ее максимальной длины. С возрастом шерсть становится длиннее. Перуанские морские свинки лучше

выглядят в молодом возрасте.

Зверьки разводятся в широком диапазоне цветов. Наиболее распространенные цвета – красный, белый, черный. Могут быть трехцветными, черепаховыми, с маркировками.

Морская свинка шелти

Морская свинка шелти внешним видом напоминает перуанскую, но имеют одно важное различие – у них нет розетки на голове. Это позволяет шерсти ниспадать назад, а не на мордочку.



Зверьки имеют такое же строение тела, как и другие морские свинки. Шелти – длинноволосые представители, не имеют абсолютно никаких розеток. На щеках есть борода, которая сливается с остальной шерстью на теле. У них густая, по всему телу, длинная шелковистая шерсть, переходящая на задней части тела в шлейф, который волочится по земле.

Разводятся в разнообразных цветах. Наиболее популярные – трехцветные (черные, красные, белые), с черными и красными пятнами, черепаховые, одноцветные черные, красные и белые особи.

Морские свинки шелти лучше выглядят в возрасте двух лет. Затем их шерсть начинает терять часть блеска, становится менее мягкой на ощупь.

Морские свинки тексел

Морские свинки тексел не так распространены, как перуанские, но их вьющаяся шерсть быстро завоевывает своих поклонников, хотя они требуют еще большего ухода.

Данная разновидность имеет такое же строение тела, как у других морских свинок.



У них длинная вьющаяся шерсть, мягкая на ощупь. Она должна сиять, быть густой, без лысых пятен или областей с меньшими плотностями. Шерсть на голове растет поперек задней части, на морде она короче, чем на теле. На животе шерсть короткая, вьющаяся. Сзади по земле волочится красивый шлейф. Длина шерсти должна быть около 120 мм.

Данную разновидность разводят в большом диапазоне цветов.


Но наиболее распространенными являются белый и красный, красный с пятнами. Зверьки могут иметь цветные маркировки, цвета дикой окраски, быть трехцветными, но не все эти цвета признаны в разных странах.

Сейчас разводятся особи с атласным блеском шерсти.

Морские свинки мерино

Морские свинки мерино нуждаются в большой заботе и уходе, поэтому они не очень подходят для людей, которые не готовы уделять им много времени, чтобы держать шерсть зверьков в надлежащем состоянии. Каждый день необходимо расчесывать шерсть, проверять, чтобы в ней ничего не запуталось.

Они имеют такое же строение тела, как и другие разновидности морских свинок.



Мерино — это длинношерстные морские свинки с вьющимися волосами и двумя розетками.

Сейчас разводятся некоторые экземпляры с атласным блеском шерсти. Морские свинки мерино еще не известны широкой публике, т. к. во многих странах они еще официально не признаны и не появляются на выставках.

Зверьки могут быть самых различных цветов, в том числе красные, черные, кремовые. Нередко встречаются белые особи с красными пятнами, а также трехцветные.

Морские свинки альпако

Морские свинки альпако, как и все длинношерстные особи, требуют много заботы и внимания, поэтому они не самые подходящие домашние животные для детей и для людей, которые не имеют достаточно свободного времени. Опилки, конечно же, нельзя использовать для подстилки, намного лучше применять солому.

Альпако должны иметь такое же строение тела, как и другие длинношерстные морские свинки.



Волосной покров у данной разновидности длинный, вьющийся. Своим внешним видом зверьки очень похожи на морскую свинку тексел. Отличаются они только розеткой на лбу.

Морские свинки альпако теперь также разводятся с атласной шерстью. Особенно глубокий блеск приобретает диадема. Но это разнообразие еще полностью не признано в большинстве стран, поэтому такие особи редки.

Зверьки разводятся в широком диапазоне цветов. Особенно популярны красные, сливовые, черные и белые цвета.

Сони

Сони – довольно редкие гости в наших квартирах. Эти милые, похожие на миниатюрных белочек животные ведут сумеречный и ночной образ жизни, поэтому их изучение всегда было связано с определенными трудностями. Все сони относятся к мелким и средним животным, распространены в лиственных и смешанных лесах Евразии. У них большие глаза, небольшие полукруглые ушки и длинный пушистый хвостик. Будучи очень активными, они прекрасно лазают по деревьям, проводя на них большую часть времени. На зиму впадают в продолжительную спячку, наедая с лета толстый жировой слой. Однако теплые зимы заканчиваются для них трагически. Во время оттепелей зверьки часто просыпаются, тратя при этом драгоценные запасы питательных веществ, и к концу зимовки погибают от истощения. Сони – растительноядные животные, но имеют склонность к всеядности. С большим удовольствием наравне с растительной пищей они поедают разнообразных насекомых, их личинок, яйца, маленьких птиц. В России насчитывается пять видов сонь.

Самая маленькая соня, орешниковая, с длиной тела 7–9, а иногда и до 11 см, похожа на мышь, но отличается от нее опушенным хвостом. Цвет ее шкурки рыжевато-красный или светло-коричневый, пальцы белые, брюшко имеет более светлый оттенок. Встречается она на юге, в лиственных лесах Европы и Малой Азии, не любит большой высоты и является обитателем подлеска. Просыпаясь в сумерках, выходит на поиски пищи, посвящая этому делу всю ночь. Превосходно лазает по самым тоненьким веточкам кустарника и ловко перепрыгивает с дерева на дерево, преодолевая гигантские для такого маленького существа расстояния.

В качестве убежища соня ищет дупла, ямки между корней, любит занимать птичьи домики. Часто плетет шарообразные гнезда из травы и листьев, скрепляя строительный материал клейкой слюной. Свое гнездо может сплести внутри дупла, а может подвесить между ветвей кустарника на высоте один – два метра от земли. Внутри она делает мягкую подстилку из мха и растительности. Получается очень уютно.

На зиму орешниковые сони устраиваются в дуплах или подземных гнездах. Спят долго, почти шесть месяцев. Во время сна температура тела зверька опускается почти до нуля. В таком анабиозе животные проводят всю спячку, если их не будит зимняя оттепель.

В этих зимних убежищах самки рожают свой первый за сезон помет.

Всего их бывает два: один весной, другой летом. Но репродуктивный период протекает с мая по октябрь, так что детеныши могут появиться и осенью. Беременность длится три недели (двадцать один – двадцать четыре дня), после чего самки приносят от двух до девяти детенышей. Малыши совершенно беспомощные, слепые и голые. Только через две недели у них открываются глаза и они покрываются шерсткой. Через месяц детеныши начинают осваивать мир, ненадолго выходя из гнезда, но самостоятельности достигают лишь к полутора месяцам. Молодые особи становятся половозрелыми в тот же год.

Питаются орешниковые сони разнообразно. В их естественный рацион входят желуди, орехи, каштаны, ягоды, буковые орешки, плоды, почки, побеги. Иногда они поедают насекомых и их личинок, но животные корма не играют в питании этого вида сонь такой роли, как в питании других видов.

Соня-полчок – один из самых симпатичных представителей семейства соневых. По сравнению с другими сонями это крупное животное, длина тела которого может достигать 20 см. У него длинный пушистый хвостик, густая шерстка, крупные и умные глаза, очень красивая окраска: спинная сторона дымчато– или рыжевато-серая с серебристым оттенком, брюшко белое. Распространен в лиственных лесах Европы, Малой Азии и Кавказа.

Полчок также ведет древесный образ жизни, но гнезда вьет преимущественно внутри дупла. Иногда спускается на землю в поисках корма. Великолепно лазает по деревьям и может совершать прыжки с дерева на дерево длиной до десяти метров. Активен только ночью.

На зиму впадает в самую продолжительную среди сонь спячку. Спит семь месяцев, с ноября по май, а бывает, и по июнь. Интересно, что он может устраивать подземные зимовочные убежища, расположенные почти на метровой глубине. Иногда встречаются спальни, где лежат несколько зверьков.

К зимовке готовятся основательно, накапливая толстый слой подкожного жира. Поедая разнообразные орехи, желуди, каштаны, ягоды, плоды, насекомых и их личинок, сони становятся очень толстыми. Репродуктивный период начинается в июле. Самцы ведут себя довольно агрессивно, и между ними часто происходят драки. У самки полчка бывает только один помёт, в котором от двух до десяти детенышей. Беременность длится три недели. Детеныши рождаются голыми и слепыми. Глаза открываются через восемнадцать-двадцать дней. Мать кормит их молоком около трех недель. Спустя почти два месяца они выходят из гнезда.

Садовая соня меньше, чем соня-полчок. Длина ее тела достигает 16 см.

Она довольно симпатична, но это нисколько не мешает ей совершать разные разбойничьи выходки. Распространена в лиственных и смешанных лесах большей части Европы. Отличается довольно яркой окраской. Спина буровато-коричневая, а грудь, брюшко и лапки белые с желтоватым оттенком. Вокруг глаз черные «очки», и от них за уши идут черные полосы.

Садовая соня наиболее приближена к человеку. Она может поселиться не только в лесу, но и рядом с человеческим жильем, если поблизости есть сад. Для устройства гнезда подыскивает дупла, птичьи домики, беличьи гнезда. В них и плетет свое шаровидное гнездо.

Спячка у садовой сони непродолжительна, а в некоторых южных регионах может часто прерываться. Но, подкрепившись запасенными кормами, зверьки опять засыпают.

Поселившиеся рядом с человеческим жильем сони становятся довольно надоедливymi соседями. Дело в том, что они всеядны.

В лесу они с одинаковым успехом поедают разнообразные растительные и животные корма, разоряют птичьи гнезда, поедают их хозяев, не брезгают ящерицами, лягушками и улитками. Едят даже других грызунов. Насекомые и их личинки являются элементами повседневного рациона. В садах сони могут уничтожить большое количество ягод и плодов, тем более что часть они запасают для зимовки. Иногда разбойничают даже в кладовых и на кухнях, поедая хлеб и остатки пищи.

Репродуктивный период длится с мая по октябрь. Беременность продолжается двадцать два – двадцать четыре дня. После истечения этого срока самка приносит от двух до семи детенышей. Они становятся взрослыми через полгода.

Лесная соня похожа на садовую, но черные полосы от глаз не заходят за уши. Длина тела достигает 12 см. Распространена практически по всей Европе, в Малой Азии и горах Средней Азии, на Кавказе и на Алтае.

Лесная соня чаще других видов бегает по земле. Для убежищ ищет дупла, норы, птичьи гнезда, ниши между корнями. Но может сплести и шаровидное гнездо, поместив его между ветками кустарника или в кронах деревьев.

Благодаря запасам корма спячка у лесных сонь может так же безболезненно прерываться, как и у садовых. Из спячки выходят в апреле – мае. В это же время начинается репродуктивный период. Беременность длится почти месяц, двадцать семь – двадцать восемь дней. В помете от двух до шести детенышей.

Лесная соня также проявляет склонность к всеядности, но в меньших масштабах, чем садовая. Наравне с растительной пищей она поедает

насекомых и их личинки, иногда яйца.

Все сони в той или иной степени интересны как объекты для домашнего содержания. Но большинство животных, попадая к человеку во взрослом состоянии, практически не приручаются, хотя хорошо переносят неволю. Молодые же особи гораздо быстрее начинают доверять человеку, и многие становятся ручными.

В содержании сонь есть некоторые трудности, на которые необходимо обратить внимание.

Все сони активны ночью и в сумерках. Поэтому придется организовывать смену светового режима или же вставать для наблюдения ночью.

Все сони – деятельные и подвижные существа. В неволе же они часто очень сильно жиреют и теряют свою живость, что ведет к сокращению продолжительности жизни. Впрочем, их излишнюю полноту не следует путать с закономерным набором запасных питательных веществ на зимовку.

Для обеспечения потребности сонь в движении им необходимы большие металлические вольеры и клетки. Расположите в них ветки, коряги, полочки и стволы деревьев. Соорудите дуплянку или домик, где ваш питомец сможет отдыхать. В укрытия положите сено. Сено, сухие листья должны присутствовать в клетке всегда – на случай, если соня захочет сплести гнездо. Домики можно располагать снаружи вольера, выводя в него лаз укрытия. В этом случае вам будет очень удобно наблюдать за животными во время выкармливания малышей.

Все зверьки на зиму впадают в спячку. Особенно продолжительна она у сони-полчка (семь месяцев).

Домашние любимцы – собаки

Крупные собаки

Большую собаку приобретают по разным причинам: или очень нравится, или нужна собака для определенной работы, или дому необходим сторож, или хозяин мечтает участвовать в состязаниях по дрессировке, или просто хочется иметь в семье большого добродушного пса.

Не покупайте громадную, страшную и свирепую собаку только потому, что вы человек робкий и надеетесь рядом с рвущейся с поводка немецкой овчаркой чувствовать себя уверенно; не берите овчарку и в качестве устройства для отпугивания грабителей. Немецкая овчарка – умное животное, которое любит, чтобы у него была своя работа. Да, она верна и преданна, у нее сильнейший инстинкт охраны имущества и защиты хозяина, но не оставляйте ее скучать целыми днями в запертом доме. Ротвейлер и доберман – превосходные сторожа, однако остановите свой выбор на эрдельтерьере или славном, надежном сенбернаре, если хотите, чтобы собака еще и заменяла вашим детям няньку.

Крупные собаки щенятся легче маленьких, и в помете обычно бывает много щенков. Они, как правило, добродушны, но твердое, хотя и ласковое воспитание с щенячьего возраста пойдет им только на пользу, как и занятия на дрессировочной площадке, которые могут из обязанности превратиться в увлечение и даже в одержимость.

Анатолийский карабаш

Неприхотлив, умен, независим и предан. Но не годится для комнатного содержания и замкнутых пространств. Снисходит до прочих людей, но вся его преданность отдана одному хозяину.

Анатолийский карабаш может жить на улице круглый год, но лучше пускать его в дом как члена семьи – он станет более покладистым и из него получится хороший друг и компаньон. Эта собака выделяет из всего рода людского одного человека – своего хозяина. Она признает других членов семьи и нескольких близких друзей, но сердце ее безраздельно и навсегда отдано хозяину.

Анатолийский карабаш нуждается в любви и платит за нее сторицей, но щенка нужно знакомить с окружающим миром и поощрять его общение

с людьми и собаками, иначе он может вырасти ревнивым собственником, тем более, что от природы анатолийский карабаш общителен и у него очень хорошая память. Кстати, если он прислоняется и даже приваливается к вам одним боком, радуйтесь: значит, вы ему понравились и он вас признал.

Карабаш не подходит для комнатного содержания в городе, потому что ему нужен простор, чтобы освобождаться от переполняющей энергии. Эти собаки по своей природе настолько активны и игривы, что будут целый день бегать в большом саду за надежной оградой.

Для своих размеров анатолийский карабаш удивительно ловок и подвижен, отдельные представители породы развивают скорость до 55 км в час.

Английский сеттер

Говорят, что мало встречается более красивых, чем сеттер, собак, а если учесть, что он очень работоспособен, то эту породу можно считать идеальной легавой.

Он неприхотлив и очень красив. Может жить и в доме. Это надежная подружейная собака. Он не любит одиночества: блаженствует в компании людей или других собак.

Английский сеттер – наиболее типичный представитель сеттеров (ирландского, гордона и английского). У него ласковый и добрый нрав; он идеальный спутник и товарищ для детей.

Английский спрингер-спаниель

Одна из самых старых пород спаниелей. Он отлично ведет себя с детьми, хороший работник в поле. Собака умна и преданна. Это любимец всей семьи. При недостаточном моционе ему грозят ожирение, а вдобавок еще и кожные заболевания.

Английский спрингер-спаниель прекрасно совмещает две роли – охотничьей собаки и домашнего баловня. Хорошо зарекомендовал себя на полевых состязаниях и превосходно подает убитую дичь. Нужны продолжительные прогулки с большой физической нагрузкой, иначе начнет набирать вес. Нередко при недостатке движения возникают экземоподобные кожные заболевания.

Английский фоксхаунд

Это первоклассная охотничья собака живого темперамента. Но создает много шума и для роли домашнего любимца не подходит. Законное место английского фоксхаунда – в стае гончих.

Активная работа – насущная необходимость для этой собаки. У фоксхаунда должен быть достаточный запас сил и энергии, чтобы целый день гонять лисиц.

Афганская борзая

С детьми хорошо ладит. Нуждается в больших физических нагрузках, но непригодна для содержания в квартире. Афганскую борзую необходимо ежедневно расчесывать. Обращение должно быть твердое, хотя и полное любви, так как она нередко проявляет агрессивность, особенно в юности.

Афганская борзая полна чувства собственного достоинства, горделива, любит комфорт. Несмотря на прекрасные манеры и поведение в доме, это прежде всего охотничья собака с независимым и нередко крайне вспыльчивым характером – особенно в юном возрасте. К своим хозяевам она горячо привязана и чаще всего вполне надежна с детьми.

Бельгийская овчарка

Служебная собака, отлично охраняющая хозяина и его собственность. Она не обращает внимания ни на какую погоду и радуется жизни под открытым небом, так что ей необходимо как можно больше гулять и работать на свежем воздухе.

Эта порода хорошо себя зарекомендовала на состязаниях по дрессировке. В руках опытного, внимательного инструктора бельгийская овчарка легко выучивается любым приемам, но грубое обращение не пойдет на пользу ни владельцу, ни собаке и может превратить полного энтузиазма, готового на все для хозяина щенка в жалкого неврастеника.

Бладхаунд

Имеет обаятельную внешность, ласков с детьми. Он прекрасно идет по следу. Очень обидчив – для наказания пользуйтесь только голосом.

Бладхаунд – чудесная собака, а его чутье не знает себе равных. На охоте идет по следу, но не убивает загнанного зверя. Отдельных собак используют как ищеек в полиции. Его очень любят дети, которые могут гулять с ним, держа его на поводке.

Этим собакам нужно как можно больше скакать галопом. Если вы завели бладхаунда, вступите в клуб любителей бладхаундов и обязательно принимайте участие в организованных полевых испытаниях.

Бобтейл

Типичная порода группы космат шерстных овчарок. Название бобтейл

получил за свой короткий хвост. Он прекрасно ладит с детьми и хорошо уживается с другими животными. Бобтейл, или староанглийская овчарка, недаром пользуется громадной популярностью: это преданный друг и защитник детей, с очень ровным, спокойным характером. Несмотря на свой громоздкий вид, он прекрасно может жить и в небольшой квартире. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Регулярные прогулки средней продолжительности, две хорошие прогулки по двадцать минут в день, но при этом вам, конечно, нужно иметь еще и садик, чтобы собака могла свободно побегать.

Боксер

Это порода, выведенная около 150 лет тому назад путем скрещивания некоторых немецких догообразных пород собак с английским бульдогом. Нынешний боксер представляет собой результат селекции, целью которой было придать собаке как можно более гармоничный вид. Особенно ценен у немецкого боксера нрав. Он нетерпим и воинствен по отношению к другим собакам, а по отношению к людям, особенно детям, он добр, мил и ласков. Он неутомим и очень подвижен. Своему хозяину боксер бесконечно верен и предан, хотя иногда немного упрямится. Боксер – это обаятельное существо, дольше многих других собак сохраняющее характер щенка. Он обожает детей и самоотверженно защищает всех членов своей семьи. Однако эта полная энергии и сил собака заслуживает жизни в просторном доме с садом, в семье людей, которые не пожалеют времени на прогулки и занятия дрессировкой. Боксера использовали и в армии, и в качестве поводыря слепых. Хвост у него купируют коротко, так что свой восторг он выражает, виляя задом. Боксер смел, весел и забавен, как клоун. Хороший сторож. Он не прочь подраться, но старается не обижать противников меньше себя! Рекомендуется гулять побольше и каждый день давать побегать без поводка.

Большой мюнстерлендер

Привязчив, легко обучается. Это преданный и надежный любимец всей семьи. Нуждается в больших пространствах для прогулок.

По сложению и шерстному покрову большой мюнстерлендер напоминает сеттера, а голова у него, как у спаниеля. Это универсальная охотничья собака, у нее великолепное чутье и твердая стойка, и она одинаково хорошо работает как на суше, так и в воде. Этот умный и обаятельный пес отлично подходит для жизни в семье. Он энергичен и нуждается в продолжительных прогулках.

Бородатая колли

Преданный друг, умна и игрива, дружит с детьми. Нуждается в больших физических нагрузках.

Бородатая колли почти исчезла после Второй мировой войны. Но теперь их число неуклонно возрастает. Эта обаятельная собака, не потерявшая своих пастушьих талантов, идеально подходит для жизни в семье. Она легко поддается дрессировке, ей можно доверить детей, она всегда готова к веселым подвижным играм.

Комнатное содержание для этой собаки не подходит, так как она нуждается в продолжительных прогулках и возможности побегать на свободе.

Бриар

Одна из лучших служебных пород собак. Это активная и недоверчивая к посторонним овчарка, поэтому добродушие, видимо, она проявляет только по отношению к хозяину. Бриар легко поддается дрессировке. Это добродушный любимец всей семьи. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Бриар – наиболее известная из французских овчарок, чего нельзя сказать об остальных трех пастушьих породах из Франции – босероне, пикарди и пиренейской горной собаке. Бриары добродушны, их можно держать и как ласковых домашних любимцев, и как рабочих собак на ферме; немалое их число появляется и на выставочных рингах.

Бульмастиф

Очень привязчив и хорошо ладит с детьми. Первокласный сторож. Помните о его боевом прошлом; если вы держите такого пса, позаботьтесь о том, чтобы он был хорошо выдрессирован и обладал здоровой, уравновешенной психикой.

Бульмастиф – собака необыкновенной силы. В свое время бульмастифы снискали славу самых свирепых собак; в наши дни чаще всего ласковы и вполне надежны, несмотря на свой рост и силу.

Гладкошерстная колли

Это преданная и привязчивая собака, любящая детей. Она легко поддается дрессировке. Не очень привечает незнакомых людей.

Гладкошерстная колли по характеру и внешнему виду похожа на длинношерстную. Это идеальная собака для семьи: она очень

неприхотлива, и уход за ней несложен. Нормальны ежедневные прогулки с пробежками без поводка, когда это возможно.

Грейхаунд

Сильная, гармонично сложенная собака. Это аристократ, созданный для высоких скоростей. Он покладист, предан, добродушен с детьми и взрослыми – редко огрызается, если его не дразнить. Сильнейший инстинкт – гнаться за мелкими, быстро движущимися объектами. Подвержен заболеванию ревматизмом и артритом.

Грейхаундам, закончившим спортивную карьеру, всегда нужны хорошие руки и жизнь в семье. Помните, что собаке нужно время, чтобы «растренироваться». Никакими убеждениями грейхаунда не отучить в одночасье от погони за кошками и за любыми мелкими движущимися объектами – этот инстинкт у него в крови. Поэтому на улицах никогда не спускайте его с поводка.

Далматин

Веселая собака, верная и преданная своим хозяевам, редко вступает в драки. Очень понятлив, легко поддается дрессировке, его нетрудно готовить к выставке. Обычно долго живет и в юности полон энергии. Рад повозиться с детьми, отличный сторож и охранник. Нуждается в продолжительных прогулках. Линяет!

Важнее всего общая слаженность и гармоничность облика далматина.

Не покупайте далматина, если вы не уверены, что сможете обеспечить ему подходящие условия. Эта собака создана для того, чтобы нестись наравне с лошадью, поэтому ей больше всего подходит подвижная, свободная жизнь в сельской местности.

Длинношерстная колли (шотландская овчарка)

Идеальная собака для семьи. Она покладиста, привязчива, верна и преданна. Очень вынослива и, несмотря на густую шерсть, не требует большого ухода. Легко поддается дрессировке, любит детей. Не слишком приветлива с чужими.

Доберман-пинчер

Сильный, бдительный сторож, хотя он и не прочь понежиться рядом с хозяином; готов отдать жизнь за него и его семью. Обычно доберман справляется с любым противником, его считают одной из лучших

сторожевых собак в мире. Он держится несколько надменно, но к своей работе относится серьезно, отлично берет след, из него получается прекрасная розыскная собака.

Дог

Прекрасный друг и компаньон, преданный всей семье; его нелегко вывести из себя, и с другими животными он отлично ладит. Несмотря на свои размеры, он вполне уживается в квартире при условии, что с ним вдоволь гуляют.

Легко поддается дрессировке. Но, к сожалению, эта порода не отличается долголетием. С этой собакой не следует затевать борьбу и возню даже в шутку – как бы она не приняла это всерьез!

Золотистый ретривер

Превосходная подружейная собака. Он нежен и ласков с детьми. С сильным, уравновешенным характером. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Как ни расхваливай золотистого ретривера, – этого идеального друга для всех и каждого в семье, – все будет мало. Это абсолютно надежная собака. Ее можно держать в конуре, но лучше всего она себя чувствует в кругу семьи. Для золотистых ретриверов нет большей радости, чем нести домой хозяйскую газету или таскать по дому и дружески вручать всем старую, стоптанную туфлю. Их часто используют как поводырей слепых.

Ирландский водяной спаниель

Легко поддается дрессировке, очень умен и привязчив. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Ирландский водяной спаниель – в высшей степени привлекательная, понятливая, способная глубоко привязаться к человеку собака. Это прекрасный помощник в охоте на пернатую дичь, особенно водоплавающую; сильный, бесстрашный пловец.

Ирландский волкодав

Ласковый и добрый гигант, который приходит в ярость, только когда на него нападают. Он очень умен, беспредельно предан, и разозлить его нелегко. Но ирландский волкодав чрезвычайно самостоятелен и независим, поэтому со щенячьего возраста должен чувствовать твердую, хотя и ласковую руку.

Ирландский волкодав прекрасно ладит с детьми. Для полного счастья

ему нужны дом и семья. Пока гладишь – мил да хорош, не поладишь – костей не соберешь.

Ирландский сеттер

Очень красив. Это первоклассная подружейная собака и в то же время любимец всей семьи. Он счастлив в домашней обстановке и сторицей возвращает любовь и ласку. Очень умен, ему можно доверить игры с детьми. Но собаку такого живого и пылкого темперамента нельзя держать в тесноте, поэтому ирландский сеттер не подходит для тех, кто не может обеспечить большие, далекие прогулки. Часто дружит с лошадьми. В сторожа не годится – любит всех на свете!

Кавказская овчарка

Выносливая, неприхотливая, хорошо приспосабливается к различным условиям. Обладает природной злобностью и недоверчивостью к посторонним людям. Нуждается в длительных прогулках.

Немецкая овчарка

Сильная, отважная, чуткая, подчиняющаяся только своему хозяину, способная к любому виду обучения собака. Немецкая овчарка – самая смелая и одна из самых умных собак (если не самая умная, как считают некоторые).

Это отменные сторожевые собаки. Но именно сильнейший инстинкт охраны и оборачивается против самой собаки – защищая хозяйского малыша, немецкая овчарка может броситься на любого чужого человека, открывшего калитку. Она может стать злобной и от скуки, если ее взяли просто как комнатную собаку. Немецкая овчарка заслуживает того, чтобы у нее было свое дело в жизни: если уж служба, так служба, а если службы нет, то хотя бы дрессировка и участие в соревнованиях, которые она очень любит.

Ньюфаундленд

Его происхождение сходно с происхождением лабрадорского ретривера, но точно неизвестно. Этот непревзойденный пловец помогал жителям острова Ньюфаундленд в их повседневной жизни и труде, вытаскивая на берег рыбацкие сети, а также спасая утопающих в холодном море. Современный ньюфаундленд – крупная черная собака со своеобразным поставом передних ног, которые создают впечатление, что туловище собаки висит между ее передними ногами. Нрав в основном

спокойный, но это относится к взрослым собакам, молодой же ньюфаундленд очень игривый и веселый, а к тому же и добродушный. Ньюфаундленд – ласковый великан, защитник детей и всей семьи.

Пудель

Точно неизвестно, когда и как появился пудель. Вероятнее всего, эта порода собак была выведена во Франции на основе бородатой легавой барбе, с которой у пуделя много общего. Пудель – жизнерадостная и веселая собака, чрезвычайно подвижная, очень понятливая, с живым и внимательным взглядом, всегда выражающая радость своему хозяину. Пудели обладают замечательной способностью к обучению самым разным трюкам, их охотно принимают в цирковые группы.

Обильная густая шерсть пуделей требует регулярной стрижки, которая придает внешности собаки индивидуальность и оригинальность. Пуделей стригут в классическом стиле или стиле модерн, которые определены стандартом и должны быть строго выдержаны для оценки экстерьера на выставках. Различают больших, средних и малых пуделей.

Пудель – отличная рабочая собака, не превращайте его в клоуна или оригинальную модную игрушку.

Пудель весь так и искрится весельем. Он чрезвычайно послушен. Любит поплавать, если разрешит хозяин, но главные почести и лавры пожинает на выставочных рингах. Эта жизнеспособная, полная сил собака очень любит прогулки. Но пудель не потерял и своих охотничьих способностей. Поэтому чем больше он занят делом, тем больше это идет ему на пользу.

Риджбек

Привязчив, послушен, ладит с детьми. Будет защищать вас и ваше имущество не на жизнь, а на смерть!

Риджбек – красивая, мускулистая собака средних размеров, принадлежащая к группе гончих, с короткой темно-рыжей шерстью, висячими ушами и длинным хвостом.

Риджбек – очень спокойная собака и редко лает; любит целые часы проводить в блаженной лени, свернувшись в уголке комнаты, растянувшись на солнышке. Эта большая, довольно флегматичная и сонная собака кажется создана для медлительной лени, но в движении она преображается. Стоит ей почуять что-то – она мгновенно превращается в летящую стрелу, и дух захватывает у того, кто видит, как она настигает кролика или мчащуюся со всех ног белку. Следить за ней – истинное наслаждение!

Подобный домашний любимец должен бегать на просторе и иметь хозяина, который брал бы его каждый день на большую, далекую прогулку.

Ризеншнауцер

Прекрасная рабочая собака, пригодная к разнообразным видам служб собак. Он легко поддается дрессировке, бесстрашен. Прекрасно ладит с детьми, игрив, так как взрослеет очень медленно. Недоверчив к посторонним.

Ризеншнауцер – самая крупная из трех разновидностей шнауцеров (гигантский, карликовый и средний шнауцеры). Их качества – уравновешенность, смышленность и преданность. Ризеншнауцера использовали для охраны, а также для передачи донесений в армии; он прекрасно работает на соревнованиях по дрессировке.

Сенбернар

Истый джентльмен, могучий, но великодушный. Он обожает детей, исключительно привязчив и предан, очень понятлив и легко всему обучается.

Сенбернар очень своеобразен. У него крупная, сильная голова, крепкое, плотное телосложение, мощный и прочный костяк. Шерсть у него бывает двух типов. Короткошерстный сенбернар имеет очень густую и жесткую шерсть, длинношерстный – длинную. Окрас ярко-рыжий с белыми пятнами или белый с рыжими пятнами.

На морде должны быть обязательно темные «очки», разделенные белой бороздкой. Губы, веки и нос черного цвета.

Чау-чау

Очень сильная собака. Грудная клетка объемная, костяк мощный, но не грубый, мускулатура прекрасно развита. Чау-чау чрезвычайно самостоятельная и обладающая чувством собственного достоинства собака, независимая и вольнолюбивая, храбрая и очень преданная своему хозяину.

Чау-чау получил свое имя, очевидно, от китайской охотничьей собаки чу. Это представитель семейства шпицев, известный более двух тысячелетий, имеющий облик льва и прославившийся своим черным языком. Он совершенно лишен запаха.

В семье, как правило, становится верным другом и компаньоном; имеет склонность безраздельно отдавать свое сердце одному члену семьи, хотя принимает и любовь остальных, отвечая им взаимностью. Ему нужно спокойное, но твердое обращение: характер у него сдержанный и

надменный, он вряд ли соблаговолит выполнить команду, если вы не сумели установить с ним контакт.

Чау-чау недолюбливает чужих и, если его рассердить, становится грозным противником.

Черный терьер

Сильная, мускулистая собака, выносливая, быстро приспосабливается к различным условиям. Легко переносит жизнь в квартире.

Хорошо поддается дрессировке. От природы злобная, недоверчивая к посторонним людям. Нуждается в длительных прогулках.

Элкхаунд (норвежская лосиная лайка)

Жизнерадостная собака, верная и преданная хозяину; ей можно доверять детей. Она полна энергии, любит широкие просторы.

Очень подходит для жизни в семье, надежный сторож. Ее с самого раннего возраста нужно ласково, но твердо взять в руки. Сохраняет здоровье только при больших физических нагрузках.

Южнорусская овчарка

Собака выше среднего роста с прямой вьющейся шерстью. Легко приспосабливается к различным условиям, неприхотлива.

Это злобная и недоверчивая к посторонним собака, хороший сторож. Необходимы длительные прогулки.

Собаки средних размеров

Собаки средних размеров пользуются наибольшей популярностью. Средняя собака, конечно, не так поражает воображение, как крохотная собачонка или пес-гигант, зато она естественнее вписывается в жизнь семьи. Владелец такой собаки не придется ломать голову над тем, как обеспечить ей необходимый моцион и жизненное пространство, как выкроить средства на ее прокорм. Собака будет без усталости играть с ребятами, сопровождать отца или охранять мать семейства.

Американский стаффордшир-терьер

Прекрасный сторож. Он бесстрашен, отличный крысолов. Ладит с детьми. К дисциплине нужно приучать как можно раньше, так как он своеволен и упрям.

Американского стаффордшир-терьера не следует путать со стаффордширским бультерьером, собакой с немного более облегченным костяком.

Английский бульдог

Отважен, умен, добродушен. Собака храпит во сне.

Английский бульдог, несмотря на свой несколько устрашающий облик, очень покладист и очень любит детей. Это сообразительная собака, которая схватывает все на лету и с удовольствием принимает участие в играх. Но ему никак нельзя разрешать носиться в жару, поскольку нос у него не приспособлен для активного дыхания. По той же причине его нельзя запираť в машине или другом закрытом помещении, не позаботившись о свободном доступе свежего воздуха.

Эта порода не отличается долголетием. Лучше себя чувствует в умеренном климате – жара может вызвать сердечный приступ. Не способен к напряженной работе.

Бассет-хаунд

Приветливая собака, которая хорошо ладит с большинством людей, поэтому очень подходит для жизни в семье. Но в нем сильны инстинкты гончей, и он может уйти, если вы случайно оставили калитку открытой. Бассет себе на уме, он полон неотразимого обаяния, но слушается далеко не всегда – только если ему это угодно. Собака ровного, спокойного нрава, любит детей. Нуждается в больших физических нагрузках. Любит побродить сама по себе.

Для бассета прогулки превыше всего. Если вы не можете дать ему возможность много и далеко гулять, лучше вам его не заводить вовсе.

Большой немецкий шпиц

Происходит из районов Северной Европы.

Шпицы отличаются живым характером, чуткостью и внимательностью. Все происходящие в округе изменения они тотчас же отмечают активным облаиванием. Они недоверчивы и злобны по отношению к незнакомым людям.

Бультерьер

Эта порода терьеров особенно выделяется среди своих собратьев необычной формой головы: очень мощная, удлинённая, с тяжелой и прочной костью. Создается впечатление, что голова как бы прикрыта

щитом. Челюсти с сильными и крупными зубами. Тело крепкое, плотное, с хорошо развитыми мышцами. Оно все как бы демонстрирует силу и стойкость. Высота и вес бультерьера ниже среднего предела для терьеров.

Эта порода была выведена специально для собачьих боев, очень популярных до начала нынешнего столетия. В наше время бультерьер используется преимущественно как сопровождающая или служебная собака, но при этом он остался серьезным бойцом, хотя пользуется этим только при необходимости. Несмотря на довольно свирепый вид, бультерьер на самом деле очень ласков, ему можно спокойно доверять детей, особенно если вы возьмете суку: она разрешает детям буквально валяться с ней в обнимку. По отношению к хозяину это веселая и привязчивая собака. Но если бультерьера заденет любая другая собака, он бесстрашно бросается в бой и будет сражаться до конца – никогда не сдастся! Он великолепный сторож; непрошеного гостя в ваш дом он впустит, но можно поручиться, что обратно он его не выпустит. Красивой эту собаку не назовешь, но у нее свое особое обаяние. Бультерьер – собака могучая, с бьющей через край энергией, ее нельзя обречать на жизнь в квартире, с короткими прогулками во дворе.

Вельш-спрингер-спаниель

Жизнерадостная собака, полная энтузиазма, стойкая и выносливая. По размерам – нечто среднее между маленьким коккер-спаниелем и английским спрингер-спаниелем.

Эта порода не знает усталости. Если собака много двигается и ее правильно кормят, у нее будет хорошее здоровье и она проживет долго.

Спаниель верен, послушен. Отличная подружейная собака, хорошо работает на воде. Собаке необходима дрессировка, иначе ее страсть к охоте может принести массу неприятностей.

Как и большинство спаниелей, вельш-спрингер от природы рабочая собака, и для тех, кто живет в тесной квартире или не может брать собаку на далекие прогулки, это не самый лучший выбор.

Ирландский терьер

Очень подвижная, живая, веселая и игривая собака, но при необходимости становится бесстрашным и надежным защитником и сторожем. В борьбе не знает равных.

Ирландский терьер никогда не был модной породой, поэтому он не доведен до того экстерьерного совершенства, как фокстерьер.

Керри-блю-терьер

Очень общительная, добродушная и приветливая собака, хотя не забывает причиненного ей зла. Как и все терьеры, керри обладает прекрасными бойцовскими качествами, но менее упрям.

Добродушие керри-блю-терьера очень относительно. Эта собака признает и любит только своего хозяина, приветлива только со знакомыми собаками. Ко всем же посторонним и чужакам проявляет настороженность и даже агрессивность, часто провоцирует собачьи драки.

Керри-блю-терьер обожает детей, из него получается идеальная собака для семьи.

Однако у него горячий ирландский темперамент, и вам придется ласково, но непреклонно воспитывать его с детства, если вы не хотите без конца оплачивать счета за оказание ветеринарной помощи пострадавшим от него собакам. Созданный для работы, он требует продолжительных прогулок.

Лапхунд (лапландский шпиц)

Легко поддается дрессировке, очень живой и дружелюбный. Подозрительно относится к посторонним.

Лапхунд был выведен для охоты на северного оленя, но когда северного оленя одомашнили, специальностью лапхунда стала пастушья работа. Прижился он в семье в роли комнатной собаки; эта роль ему очень подходит.

Для сохранения здоровья и хорошей формы нуждается в регулярных прогулках и пробежках без поводка.

Миттельшнауцер (средний шнауцер)

Добродушная, живая собака, обожающая и детей, и игры с ними. Но чужим – не доверяет. Похож на терьера, а потому – великий истребитель крыс и мышей, умница и прекрасный сторож. Привязчив, умен, имеет веселый нрав.

Любит регулярные прогулки и игры с мячом; легко приспосабливается к жизни как в городе, так и в сельской местности.

Мягкошерстный пшеничный терьер

Исключительно умная небольшая собака, которая не даст вас в обиду, но при этом не агрессивна. Это прекрасный домашний сторож, с детьми нежна и терпелива. Этот терьер обладает и охотничьими задатками: его удавалось натаскивать как подружейную собаку, и он проявлял себя

отлично. Он вынослив, неприхотлив в еде. Собака только для домашнего содержания. Пшеничному терьеру тем лучше, чем больше он гуляет.

Норботтен-шпиц

Прекрасный сторож, весел и ласков, жизнерадостен, прекрасно ладит с детьми. Сильно выражен инстинкт пастуха. Никаких сложностей и недостатков не отмечено. Норботтен любит полную свободу. Но неплохо приспосабливается к жизни в доме, если с ним регулярно гулять.

Пули

Верная, послушная, сообразительная, выносливая собака, наиболее известная из венгерских пастушьих собак. Ее главный отличительный признак – длинная, темная, свисающая шнурами шерсть, которую содержать в порядке не так трудно, как может показаться. Полезнее всего большие прогулки и физические нагрузки, но эта покладистая собака легко приспосабливается к жизни в городе, лишь бы быть рядом с хозяином.

Самоедская лайка (самоедский шпиц)

Очень красива, предана хозяину, послушна и умна. Она несколько независима. Линная, везде оставляет белую шерсть.

Самоедская лайка, или «самми», как ее называют, – удивительно красивая, хотя и с довольно независимым характером собака. Эти собаки очень любят снег и лучше всего себя чувствуют на широких открытых просторах.

Нуждается в долгих, активных прогулках, и, если возможно, с ней надо хотя бы раз в неделю заниматься на дрессировочной площадке.

Стаффордширский бультерьер

Бесстрашен, но своеволен и упрям. К дисциплине нужно приучать как можно раньше. Первоклассный крысолов.

Стаффордширский бультерьер обладает хорошим здоровьем, прекрасная собака для семьи.

Стаффордширский бультерьер, как и его ближайший родственник бультерьер, хранит под устрашающей внешностью удивительно нежное сердце. Он отличный сторож, обожает семью, в которой живет, ему можно доверять даже самых маленьких детей.

Стаффордширский бультерьер не может устоять перед соблазном ринуться в бой с другим псом, так что, когда идете по улице, держите собаку на поводке. Он хороший спутник в загородной прогулке, но может

приспособиться к жизни в небольшом доме с садиком, конечно, при условии регулярных пробежек.

Финский шпиц

Очень красив, смел, прекрасный сторож и домашняя собака. Ладит с детьми, хороший охотник, любит свой дом, очень общителен. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Финский шпиц – финская национальная собака. Очень популярна как охотничья собака по боровой птице и как участник выставок. Его держат в качестве домашнего любимца и для выставочной карьеры. Эта красивая собака имеет удивительную привычку вылизываться, как кошка.

Финский шпиц создан для жизни на свободе; он радуется всякой возможности побегать. Однако очень любит и посидеть рядом с людьми.

Шар-пей (китайская бойцовая собака)

Чрезвычайно умен. Это отличный сторож, преданный хозяину. Он хорошо ладит с детьми. Может оказаться более восприимчивым к болезням, чем другие ввезенные собаки, успевшие выработать иммунитет.

Шар-пей имеет честь быть упомянутым в книге рекордов Гиннеса как редчайшая собака в мире; интерес к этой породе неуклонно растет.

На кого он похож? Описывают его по-разному: то как собаку, на которую напялили шкуру «на вырост», то сравнивают с блаухаундом, у которого складки не только на морде, но и по всему телу.

У шар-пея маленькие уши, согнутые вперед, к глазам, в форме прямоугольного треугольника, хвост, загнутый в кольцо так, что кончиком касается своего основания, и жесткая, короткая, стоящая торчком шерсть.

Его радует общество людей; он вообще очень привязчив и к тому же имеет еще одно достоинство – говорят, что щенки шар-пея самостоятельно приучаются соблюдать чистоту в доме!

Эта порода больше подходит для тех, кто имеет просторный сад или живет в сельской местности, где собака может резвиться на воле. Шар-пей нуждается в больших ежедневных прогулках и пробежках без поводка.

Японский шпиц

Японский шпиц – смел, умен, предан и жизнерадостен. Это однолюб. Он недоверчив к посторонним.

Близкий родич норботтен-шпица, много лет назад ввезенного в Японию и образовавшего самостоятельную породу. На международной арене он появился недавно и еще довольно редок. Эта собака любит

полную свободу. Но неплохо приспосабливается к жизни в доме, если с ней регулярно гулять.

Маленькие собаки

Маленькие собаки необычайно смелы (иногда до безрассудства), они отличные сторожа (только не разрешайте им тявкать и заливаться лаем попусту), очень преданны своим хозяевам. Хотя их нередко презрительно называют «диванными собачками», самые маленькие из них с восторгом сопровождают вас в далеких прогулках и готовы идти хоть на край света. С маленькими собаками нет никаких транспортных проблем: чи-хуа-хуа или йоркшир-терьер не возражают против путешествия в обычной хозяйственной сумке. Маленькие собаки очень умны и легко поддаются дрессировке, да и возни с их шерстью гораздо меньше.

Маленькие собаки живут обычно дольше своих более крупных сородичей.

Австралийский терьер

Всех людей считает друзьями. Агрессивен, как всякий прирожденный охотник на крыс, – гроза соседских кошек! С собаками сражается самозабвенно. Австралийский терьер – верная и преданная собака; он смел, вынослив, и ему можно полностью доверять при игре с детьми. Необычайно чуткий сторож, но, подняв тревогу, он способен доконать непрошеного гостя лавиной ласк. Отличный товарищ и спутник. Шерсть предохраняет его от любой погоды, поэтому австралийского терьера можно держать и в доме, и в конуре.

Это активный и азартный следопыт, который должен иметь возможность освободиться от избытка энергии, регулярно бегая и резвясь во время долгих прогулок.

Австралийский шелковистый терьер

Приятная маленькая собака, очень похожая на йоркшир-терьера. Он полон энергии, бдителен, вынослив, от природы жизнерадостен и привязчив. У него добрый нрав. Никаких сложностей и недостатков не отмечено. Несмотря на малый рост, австралийский шелковистый терьер ни в чем не уступает другим терьерам. Легко приспосабливается к небольшой квартире и прогулкам по городу, но он в своей стихии, когда носится сломя голову по чистому полю, хотя его прямая шелковистая шерсть приходит от

этого в беспорядок.

Американский коккер-спаниель

Это прекрасная рабочая собака с отлично развитой мускулатурой, крепкая и сильная, с очень интенсивно оброслыми конечностями.

Американский коккер-спаниель – прекрасный охотник: мастерски вспугивает затаившуюся дичь и приносит убитых птиц и подранков. Но он необычайно популярен и как комнатная собака – красивая, преданная, легко привыкающая к любому образу жизни; словом, это прекрасный спутник и друг человека.

Он необыкновенно красив. Это всеобщий любимец семьи, послушен. Нуждается в тщательном уходе за шерстью.

Следует помнить, что коккер-спаниель выведен для охоты, и хотя он вполне доволен ролью домашнего любимца, лучше всего ему будет в тех семьях, которые обеспечат ему две большие прогулки в день и садик, где можно порезвиться.

Английский коккер-спаниель

Эта порода спаниелей небольшого роста, поэтому более всего пригодна для содержания в квартире. Темперамент живой, характер преданный и привязчивый. Коккер-спаниель – необычайно красивая собака. Он любит детей, весел и игрив, долго живет. Переедание приводит к ожирению.

Уши надо подвязывать, чтобы не лезли в миску с едой. «Веселый» коккер, как его зовут, – всеобщий любимец семьи: отец берет его на охоту, а ребяташки носятся с ним по саду. Он покладист, послушен, умен. Идеальная, разносторонняя охотничья собака; его коронный номер – выгонять дичь.

Английский коккер – очень подвижная собака, ей необходим регулярный моцион. Она любит загородные прогулки и нередко возвращается домой, восторженно виляя хвостом и по уши вывозившись в грязи, так что это не самый лучший выбор для тех, кто ценит чистоту превыше всего; но и домашний комфорт вроде теплого местечка у огня эта собака очень ценит.

Аффен-пинчер

Обаятельная маленькая собака, очень напоминающая обезьянку; отсюда и приставка «аффен», что в переводе с немецкого означает «обезьяний».

На родине ее часто называют карликовым аффен-пинчером. Французы окрестили ее «усатым бесенком». Но как ни называй аффен-пинчера, он остается забавной, очаровательной маленькой собачкой; это самая маленькая собака из семейства шнауцеров и пинчеров, бдительная, любящая и преданная, всегда готовая защищать хозяина. Несмотря на малый рост, отличный крысолов. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Как и большинству карликовых пород, аффен-пинчеру достаточно пробежаться по парку или скверу, но если вы дадите ему волю, он готов гулять с вами, пока вас ноги носят.

Бедлингтон-терьер

Обожает детей, хорошо ведет себя дома, но на улице может стать опасным. Несгибаемый боец, если его задеть. Бедлингтон-терьер – привлекательная, выносливая маленькая собака, по внешнему виду напоминающая подстриженную овечку. Она настолько изящна и так любит детей, что ее достоинства первоклассного сторожа отступают на второй план. Собаки этой породы легко поддаются дрессировке и с успехом участвуют в состязаниях.

Бедлингтон, как и большинство терьеров, – подвижная, любознательная собака, любит носиться на свободе без поводка или самозабвенно играть с мячом. Тем не менее он вполне довольствуется жизнью в небольшой квартире – при условии, что его будут хорошо выгуливать.

Бигль

Жизнерадостный, любвеобильный маленький пес; он одинаково хорошо относится и к людям, и к живущим рядом животным. Души не чаает в детях, чудесный товарищ.

Лаять бигль не любит – его голос можно услышать чаще всего на охоте, в разгаре гона. Но, как и большинство гончих, он – бродяга по натуре, поэтому старайтесь не оставлять калитку открытой: может удрать в самовольную отлучку.

Моцион для этой породы не проблема, потому что бигли с одинаковой легкостью сохраняют спортивную форму, гуляя и в маленьком садике, и на просторе. Но, как и для всех собак, прогулки должны быть ежедневными. Бигли славятся здоровьем и крепким сложением, так что к ветеринару вам придется обращаться редко.

Бишон-фриз и болонский бишон

Любимцы всей семьи, ласковые и веселые. Требуют очень тщательного и кропотливого ухода за шерстью.

Бишон-фриз – необычайно привлекательная и жизнерадостная собачка, которая, без сомнения, станет очень популярной, когда с ней познакомится широкая публика.

Вполне подходит для городской жизни при условии регулярных прогулок, но очень рад возможности порезвиться без поводка и побегать на свободе.

Бордер-терьер

Добродушен, вынослив и надежен. У него удобный размер. Нуждается в больших пространствах для прогулок. Бордер-терьер – самый маленький из рабочих терьеров. Его используют для добывания лисиц из норы. Это крепкая, не испорченная цивилизацией собака с уравновешенным темпераментом; обычно она хорошо ладит с другими животными.

Бордер-терьер полон кипучей энергии и может угнаться за скачущей лошастью. Таковую собаку должен держать только тот, кто способен дать ей возможность много и часто бегать.

Вельш-терьер

Имеет спокойный и ровный характер. Несмотря на малый размер, это отважный пес, легко поддающийся дрессировке. Никаких осложнений и недостатков не отмечено.

У вельш-терьеров много общего с эрдельтерьером ирландским, он и похож на маленького эрдельтерьера. Обычно у него милый характер, он предан хозяевам, послушен и удивительно забавен. Как правило, этот малыш становится любимцем всей семьи из-за веселого нрава.

Регулярные ежедневные прогулки и возможность порезвиться в саду вполне удовлетворяют вельш-терьера, но, как и большинство терьеров, он будет в восторге, если ему дадут побегать на просторе.

Гладкошерстный фокстерьер

Элегантен, удобного среднего размера. Нуждается в больших прогулках и нагрузках.

Слово «терьер» происходит от латинского «terra», что значит «земля». Работа терьера сводится к тому, чтобы уничтожать вредных грызунов, а также выгонять и вытаскивать из норы лисиц и барсуков. Очень многие считают, что гладкошерстный фокстерьер лучше всех терьеров справляется

с этой задачей. Он пользовался и пользуется огромной популярностью.

Фокстерьер, некогда заслуживший прозвище «маленького атлета собачьего мира», заслуживает и соответствующего образа жизни. Он может примириться с прогулкой трусцой вокруг парка – разумеется, на поводке; но нельзя отнимать у него радость – как можно чаще бегать на свободе, лучше всего за городом.

Гриффон (брюссельский и брабантский)

Долгожитель, умный, добрый и ласковый. Очень вынослив, подходит как для города, так и для сельской местности. Никаких сложностей не отмечено.

Гриффон – обаятельная, жизнерадостная, добродушная маленькая собака, самое главное назначение которой – быть любимцем всей семьи. У него почти обезьянья мордочка, мудрое выражение глаз, темперамент пылкий. После того как гриффоны стали любимыми собаками, мода на них широко распространилась.

Как и большинство комнатно-декоративных собак, гриффоны легко приспосабливаются к жизни в городе и не требуют больших прогулок, но им очень полезно хоть изредка порезвиться на просторе в сельской местности.

Денди-динмонт-терьер

Отважен, обладает чувством юмора. Однолюб, но сначала надо завоевать его любовь и уважение.

Денди-динмонт – покладистая собака, которая одинаково хорошо уживается и в роли рабочей собаки, охотника на лисиц, и в роли любимца одинокого пожилого человека. Но содержать эту подвижную, любознательную собаку в доме без садика не стоит.

Джек-расселл-терьер

Привязчив, удобного размера, надежный спутник. Стал необычайно популярным в последние годы. Хорошо приспосабливается к жизни в домашних условиях, но его стихия – охота.

Жесткошерстный фокстерьер

Как превосходная норная собака, жесткошерстный фокстерьер все реже попадает к охотникам, чаще это просто любимец дома городского жителя. Это первоклассная собака-компаньон. Он легко вступает в драку. Нуждается в продолжительных прогулках с большой нагрузкой.

Ирландский терьер

Похож на небольшого эрдельтерьера сплошного золотисто-рыжего окраса, что придется не по вкусу большинству любителей этой старинной и чрезвычайно привлекательной породы. Ирландский терьер будет вполне доволен ролью любимца семьи при условии, что есть садик, где он может побегать, и его регулярно водят на прогулки, разрешая резвиться без поводка. Ирландских терьеров почти никогда не укачивает в транспорте.

Таксы

Привязчивы, отважны, обладают чувством юмора. Такса преданный друг семьи. Их легко содержать в чистоте. Это сторожевые собаки с громким голосом. Они своевольны и агрессивны с посторонними, если не отучить. Бывает смещение межпозвоночных дисков.

Таксам необходимы регулярные прогулки, чтобы бороться с тенденцией набирать лишний вес. Лучше гулять меньше, но чаще, и дать собаке хорошенько набегаться на огороженном зеленом участке.

Карликовая такса

Это собака с большим чувством юмора, преданный друг семьи. Уход не представляет сложностей. Чтобы не произошло смещения межпозвоночных дисков, не заставляйте высоко прыгать и не перекармливайте.

Таксы очень привязчивы, забавны и шаловливы и, несмотря на свои короткие ноги, могут выдержать любую физическую нагрузку и дальние переходы. Голос неожиданно густой и мощный для их размеров; они отважны и вообще отличные сторожа.

Карликовый бультерьер

Точная копия бультерьера во всём, за исключением размеров. Так что этот гладиатор собачьего рода в миниатюре, возможно, более подходит для содержания в квартире, чем его более крупный брат.

Карликовый пинчер

Иногда его называют «королем миниатюрных собак» – идеальная собака для горожанина, мечтающего о спортивном, жизнерадостном спутнике. Карликовый пинчер способен целыми днями бегать на свободе, прекрасно идет по следу и отлично зарекомендовал себя на соревнованиях по общему курсу послушания. Присущая этой породе забавная танцующая

походка, напоминающая высокую щегольскую рысь английских лошадей, доставляет истинное удовольствие – собака бежит, как крошечная нарядная лошадка. Еще одно достоинство этой породы – она очень редко линяет и поэтому требует минимального ухода за шерстью.

Карликовый пинчер может прекрасно резвиться в маленьком садике или сопровождать хозяина в далеком однодневном походе. Эта покладистая собачка хорошо себя чувствует и в городской квартире, и за городом.

Карликовый шпиц

Неприхотлив, имеет веселый нрав и любит полаять. У этой собаки оптимально удобные размеры. Считает себя «большой собакой»; следите, чтобы он не задирали крупных псов. Веселая, жизнерадостная маленькая собака, которая одинаково хорошо чувствует себя и в однокомнатной квартире, и в большом доме, блаженствуя в роли «диванной собачки» или резвясь в маленьком садике. Это преданный и верный компаньон.

Кинг-чарлз-спаниель

Вынослив, несмотря на малый рост, чистоплотен, ладит с другими домашними животными. Следите за ушами: легко воспаляются. Собаку необходимо ежедневно расчесывать.

Кинг-чарлз – прекрасная собака. Он очень общителен, хорошо ведет себя с детьми.

Кэрн-терьер

Смышлен, неприхотлив и вынослив. У него веселый нрав. Это сгусток энергии; необходимо время от времени давать ему освободиться от ее избытка.

Кэрн – энергичный пес, отличный охотник на грызунов. Его стихия – бегать по полям вокруг хозяина или носиться за мячом вместе с детьми. Но он может примириться и с чинными прогулками на поводке, и с «оседлой» городской жизнью, если только рядом есть садик, где можно побегать и порезвиться.

Лейкленд-терьер

Отлично ладит с детьми. Это чуткий сторож с сильным грозным голосом. Любимец семьи. Удобного среднего размера. Для людей немолодых может оказаться чересчур подвижным.

Если не считать мелких пород терьеров, например йоркшир-терьера, то терьеров вообще не должен заводить тот, кто не хочет иметь в доме

живой сгусток бьющей через край энергии. Лейкленд-терьер, верный своей природе, – пес жизнерадостный и бесстрашный, всегда готовый бежать на прогулку и носиться сломя голову.

Мальтийская болонка

Обладает хорошим здоровьем и долго живет. У нее ласковый характер, исключительно дружелюбна. Нуждается в тщательном ежедневном уходе за шерстью.

Мальтийская болонка – добродушная маленькая собачка, любимица всей семьи. Ей можно доверять в играх с детьми, она обычно остается жизнерадостной до конца своей долгой жизни.

Не устает при длительной прогулке, но вполне может довольствоваться и пробежкой по скверу или парку.

Манчестерский терьер

Долгожитель. Содержать в чистоте очень просто. Это отличный спутник для прогулок. Всю свою преданность обычно безраздельно отдает одному человеку.

Манчестерский терьер – идеальная порода для тех, кто ищет маленькую, но крепкую и выносливую собаку, которая требует минимальных забот и в то же время может быть прекрасным, жизнерадостным компаньоном. Плохо переносит смену хозяина.

Манчестерский терьер живет долго и редко болеет. Может жить в доме, самое большое счастье для него – место у ваших ног.

Миниатюрный пудель

Изящен и очарователен. Отлично апортирует. Долго живет. Подходит для соревнований по дрессировке. Лает попусту, если не отучить. Не самый лучший подарок для ребенка. Очень чувствителен и раним.

Пудель так и искрится юмором и весельем. Он умен, послушен. Любит воду, если владелец разрешает ему купаться. Пудель всегда рад побегать за мячом и по саду, любит уроки дрессировки и охотно трусит за вами по парку. Миниатюрная разновидность очень подходит для содержания в городской квартире.

Миниатюрный шпиц

Легко осваивается и в городе, и в сельской местности. Очень красив. Отличный сторож. Верный спутник. Он недоверчив к посторонним.

Миниатюрный шпиц – мелкая разновидность большого шпица.

Разница только в размерах, основные стати и телосложение одинаковы.

Это жизнерадостная, поразительно умная собака. Прекрасный спутник и товарищ, не требует больших прогулок, хорошо приспосабливается как к городскому, так и сельскому образу жизни. Обычно он горячо любит своего хозяина, но посторонних недолюбливает. Пожалуй, у миниатюрного шпица единственный недостаток – он с удовольствием слушает собственный лай! Для него важно нести охрану и защищать свой дом.

Мопс

Собака удобного размера, очень привязчива и хорошо ладит с детьми. Если перекармливать мопса, то он из элегантного, жизнестойкого спутника превратится в жирную и недолговечную собаку.

Дыхательный аппарат мопса оставляет желать лучшего, поэтому следите, чтобы собака не переутомлялась от беготни, не находилась в душном помещении и не перегревалась в жаркую погоду.

Папильон

Эти собаки преданны, удобного размера, любимцы всей семьи. Они хорошо поддаются дрессировке. Но недолюбливают гостей и считают хозяина своей собственностью. Папильон – преданная, веселая маленькая собака. Вынослива, легко щенится, хорошо приспособлена к далеким прогулкам, переносит любой неблагоприятный климат. Привлекательная внешность и дружелюбие делают папильона наиболее подходящей для семьи собакой.

Как и многие комнатно-декоративные собаки, папильон с удовольствием будет гулять, пока не загоняет вас до полного изнеможения, но останется вполне доволен и прогулкой вокруг скверика. В одном можете быть уверены: вам его не утомить!

Пекинес

Эффектен, верный и преданный друг. Отличается хорошим здоровьем. У него гордый, сдержанный и независимый характер. Подвержен глазным заболеваниям. Необходимо ежедневно расчесывать. Больше подходит для семьи без маленьких детей. Оберегайте от чрезмерного переутомления или перегрева в жаркую погоду – может начать задыхаться.

Пекинес любит напоминать владельцам о своем царственном происхождении и ждет, чтобы его баловали и лелеяли. Но его не назовешь хрупкой или изнеженной собакой; он не знает страха и великий затейник; очень любит разные игрушки. С детьми обходится милостиво, но его

«законное» положение – единственный друг взрослого человека, предмет безраздельного внимания и заботы. По большей части он – первая персона в доме. Пекинес, на которого мало обращают внимания и которому слишком многое запрещают, может начать наводить «порядок» в доме исключительно со скуки. Он независим и высокомерен от природы. Но если соизволит одарить вас своей привязанностью, вы не найдете более преданного и любящего друга.

Силихэм-терьер

Очень красив и предан, но упрям и любит подраться. Нуждается в постоянном уходе за шерстью.

Силихэм – бойкий, любвеобильный маленький терьер, очень привязывающийся к хозяевам и особенно к детям. Но он может упрямиться и показывать зубы, если его с щенячьего возраста мягко, но решительно не приучить к повиновению.

Скай-терьер

Очень красивая собака. Спокоен и выдержан. Нуждается в тщательном уходе за шерстью. Недоверчив к незнакомым людям.

Приобретать эту жизнерадостную небольшую собаку как изящную модную безделушку не следует: она не знает усталости, и ничто не приводит ее в такой восторг, как долгие прогулки по полям и лесам, возможность порезвиться на свежем воздухе.

Скотч-терьер (шотландский терьер)

Эта небольшая по своим размерам собака имеет очень импозантный вид. Она серьезна и обладает большим чувством собственного достоинства. Прямодушный и честный, скотч предан до конца и очень любит свой дом. Не любит общаться с посторонними. Больше всего подходит для бездетной пары или одинокого человека.

Тибетский спаниель

Уверен в себе, весел и жизнерадостен. Умен. Любимец всей семьи. Никаких сложностей и недостатков не отмечено.

Тибетский спаниель – привлекательная небольшая собака с веселым и независимым характером. Легко поддается дрессировке и умеет ладить с детьми – идеален для содержания в семье. По виду напоминает довольно крупного пекинеса. Его приятно вывести на выставочный ринг. Довольствуется обычными прогулками, если позволять ему побегать без поводка.

Французский бульдог

Преданный друг и всеобщий любимец в семье. У него острое чувство юмора, он умен и легко приспосабливается к жизни как в городе, так и в сельской местности. Очень может быть, что это самый благополучный по здоровью из бульдогов, так как он не страдает от затруднения дыхания, как бостон-терьер или английский бульдог.

Собака очень преданна своему хозяину и при этом, несмотря на небольшие размеры, чрезвычайно отважна. Ей нравится общество людей.

Чи-хуа-хуа

Собака удобного, «портативного» размера. Хорошо переносит путешествия. Необычайно преданна и верна хозяину. Но может цапнуть ребенка, который ее дразнит. Своевольна и старается настоять на своем. Смела до безрассудства – готова сразиться со львом! Предпочитает жить в коллективе – любит общество себе подобных и хозяина. Не выносит холода – может схватить ревматизм. Это самая маленькая собачка на свете.

Взрослая чи-хуа-хуа обычно проявляет свой характер не сразу; несколько недель она внимательно присматривается к своему владельцу и может даже показаться робкой. На самом же деле она прикидывает, кто станет хозяином в доме.

Чи-хуа-хуа всегда готова и вполне способна сопровождать хозяина на прогулках любой продолжительности. Но эти собаки вполне довольствуются и небольшими прогулками, поэтому подходят для пожилых людей.

Шелти (шотландская овчарка)

Необычайно красива, умна и верна. Идеальная собака для участия в соревнованиях по дрессировке. Лучше держать в доме, а не во дворе.

Шелти представляет собой колли в миниатюре; подходит для того, кому кажется, что колли великовата для его дома.

Это прекрасная собака для семьи, но она несколько недоверчива к незнакомым людям; может встретить в штыки чужого человека, который захочет ее погладить.

Ши-тцу (собачка-хризантема)

Обожает общаться с людьми и очень привязчива. Эта выносливая собака любит детей и животных. Годится для содержания и в городе, и в сельской местности. Рекомендуются завязывать челку ленточкой, иначе у

вашей любимицы будут болеть глаза.

Эта жизнерадостная и обаятельная маленькая комнатная собака не выносит невнимания. Она исключительно умна, самоуверенна и терпеливо ждет своего ежедневного туалета, на который вам придется выделять немало времени, если вы захотите иметь эту очаровательную собаку.

Японский хин

Верный и преданный друг семьи. Он очень привязчив и хорошо ладит с детьми.

Но его шелковистая шерсть при линьке переходит на ковры и мебель. Оберегайте от чрезмерного переутомления и перегрева: в жаркую погоду может начать задыхаться.

Эта жизнерадостная маленькая собака очень любит гулять и играть со всеми членами семьи. Она пойдет за хозяином на любую далекую прогулку, но вполне может довольствоваться пробежкой по парку. Хин очень любит взбираться на всякие высокие места, поэтому следите, чтобы он не свалился и не ушибся.

Не забывайте, что щенков в первые месяцы жизни нельзя заставлять долго ходить и бегать, это может привести к растяжению связок или чрезмерному развитию мышц.

Еноты, норки, хорьки

Американский енот-полоскун

Этот симпатичный зверек родом из Северной и Центральной Америки. С помощью человека он хорошо акклиматизировался также в Германии, на юге России, в Азербайджане, Киргизии, Узбекистане.

Внешний вид енота-полоскуна хорошо известен из мультфильма про Крошку Енота: остренькая широкая мордочка с характерной черной маской; небольшие уши; пушистый полосатый хвост; короткие ноги с цепкими, подвижными пальцами. Размерами напоминает небольшую собаку.

Выбирая место обитания, зверек подыскивает в смешанных лесах прилегающие к водоемам участки с дуплистыми деревьями. В дуплах устраивает себе уютное жилище. При нехватке удобных дупел в одном убежище могут жить несколько енотов. Иногда поселяется в нишах между корнями, в расщелинах скал, в норах животных. Но предпочитает все же теплые дупла деревьев.

Ведет полудревесный образ жизни. Активен в сумеречное и ночное время. Проводит его в поисках пищи, которую очень ловко хватает своими цепкими пальцами. Это настоящий хищник, добывающий себе пропитание охотой. В его естественный рацион входят разнообразная водная и наземная живность: рыба, грызуны, насекомые, раки, лягушки. Кроме того, он с удовольствием поедает фрукты, орехи, ягоды. Всю добычу енот очень тщательно промывает и полощет в воде, отчего и получил свое прозвище. Даже своих детенышей самки полощут в водоемах, иногда замывая до смерти.

Во время охоты далеко от убежища не уходит. Бродит по мелководью или по земле. При появлении опасности спасается на деревьях, в дуплах. За свою жизнь сражается отчаянно.

К зиме довольно сильно жиреет. С наступлением холодов впадает в спячку. Сон енотов неглубок, они просыпаются во время оттепелей. В одном дупле могут залечь две семьи.

Гон в нашей стране проходит с января по июнь. Беременность длится около шестидесяти трех дней. Самка приносит от двух до восьми детенышей. Детеныши совершенно беспомощные, слепые. Но уже к четверем – пяти месяцам могут самостоятельно добывать корм. Половой зрелости самки достигают через год, самцы – в два года.

Енот-полоскун хорошо переносит неволю. Это очень приятный,

интересный зверек. Наблюдение за его поведением и общение с ним может доставить массу удовольствия. Но следует взять молодое животное. Взрослые особи практически не приручаются и ведут себя довольно агрессивно. Справиться же с рассердившимся енотом трудно. Он цепляется своими лапами за любые выступы, сильно кусается, рычит, ловко выворачивается из рук. В этом небольшом животном просыпаются недюжие силы. Однако еноты, выращенные искусственно или с маленького возраста, наоборот, становятся ручными и послушными. Их можно выгуливать на поводке, отпускать побегать или искупаться. Одним словом, вы приобретете настоящего домашнего любимца.

Американская норка

Американская норка ассоциируется для многих с красивыми шубами и шапками. Даже глядя на животное в зоопарке, всегда сначала оценивают его мех. А что же мы знаем о самом зверьке, который носит такую великолепную шубку?

Родина данного вида норки, как видно из ее названия, Северная Америка. С активной помощью человека норка широко расселилась по Европе и Северной Азии и в настоящее время самостоятельно осваивает новые просторы. Кроме того, ее природные популяции постоянно подпитываются особями, сбегаящими со звероферм.

Нельзя сказать, что нашествие американской норки никак не отразилось на фауне стран, где она появилась. Норка – активный, ловкий и сильный хищник. В первую очередь от американской норки пострадал другой вид норки – европейской. Дело в том, что длина тела европейской норки достигает 43 см, вес – 800 г. Американская же норка может иметь в длину более 45 см и весить до 1,5 кг. Чем и пользуется, вытесняя европейский вид из привычных мест обитания. В результате естественные популяции европейской норки сильно сокращаются. Охота на нее запрещена.

Два вида норки различаются по расположению белого пятна на губах. У американской пятно есть только на нижней губе, у европейской же распространяется на обе губы; кроме того, у «европейки» может быть и белое пятно на груди.

Поселяется американская норка по берегам водоемов, выбирая подмытые участки с завалами деревьев, кустарника, с выступающими корнями. Предпочитает небольшие лесные речки с завалами валежника. Между завалами зверек и находит надежные убежища. Любит занимать норы ондатр, причем предварительно плотно закусив бывшим владельцем. Если найдет дупло или нишу между корнями, то может поселиться и в них.

Здесь, на берегах небольших водоемов, проводит норка почти всю свою жизнь. Причем ее существование вполне можно назвать полуводным. Для освоения водной стихии зверек выработал ряд приспособлений. Его тело приобрело форму клина, голова стала более плоской, между пальцами образовались небольшие перепонки. Дополняют картину маленькие ушки и, конечно, мех. Как известно, у многих водных животных мех приобрел водоотталкивающие свойства, стал плотным, густым, с хорошо развитой

подпушкой. То же самое произошло и с шубкой норки. Мягкая, шелковистая подпушь сверху прикрыта длинными, блестящими остевыми волосами. Благодаря этому мех норки приобрел свои ценные качества.

Норка великолепно плавает и ныряет. В воде она находит и ловит рыбу, лягушек, моллюсков, раков. По берегам охотится на сухопутную мелочь: на грызунов, птиц, на своих соседок ондатр. Норки – удачливые и добычливые охотники, обладающие изрядной силой и смелостью. Порой они нападают на птицу, которая больше их в несколько раз. И свою жизнь никогда не отдадут даром.

Зимой норки остаются на своих водоемах около полыней – незамерзающих участков воды. Живут в это время под укрытием снега и льда, выбираясь редко на поверхность. В любой момент готовы нырнуть в холодную воду, чтобы скрыться от опасности или добыть корм. Теплый мех и слой жира спасают их от переохлаждения.

В отличие от европейской, американская норка имеет склонность к путешествиям. Свои миграции совершает практически в любое время года. Поэтому часто встречается вдали от водоемов. Эта особенность поведения норки еще больше способствует расширению ареала ее обитания.

Наибольшую миграционную активность зверьки проявляют во время гона. Он начинается в феврале – марте. В это время животные в поисках партнера совершают продолжительные переходы, иногда по несколько километров. Конечно, многие гибнут, несмотря на свои бесстрашие и ловкость.

Беременность длится от тридцати четырех до семидесяти восьми дней. Причем у самок наблюдается очень интересное явление. Развитие эмбрионов может задерживаться на срок от четырнадцати до тридцати дней. Вследствие этого и сроки беременности у одной и той же самки в разные сезоны могут не совпадать. Детеныши появляются в апреле – мае. Они рождаются совершенно беспомощными и слепыми. В помете бывает от пяти до одиннадцати малышей. Половой зрелости достигают через год.

Хорьки

Хорек знаком многим не только понаслышке. Занимающиеся разведением птицы в сельской местности рано или поздно встречаются с этим разбойником. Ловкий, сильный, ненасытный зверь наводит свои порядки в курятниках. Но не все виды хорьков (а их всего три) являются обладателями таких пороков. В Евразии распространены черный (лесной) и степной хорьки. Черноногий хорек встречается в Северной Америке. В настоящее время широко распространены, кроме того, так называемые хорьки фуру, или африканские, о происхождении которых до сих пор идут споры. Это может быть альбиноидная форма черного или степного хорька либо гибрид их обоих. Фактом, однако, является свободная скрещиваемость африканского хорька с этими двумя видами, соответственно, официального статуса самостоятельного зоологического вида у него нет.



Свое распространение фуру начал из Африки, где его содержат в качестве домашнего зверька для борьбы с грызунами. Он играет там роль нашей кошки, но эффективность его работы даже несколько выше. Поэтому на европейских рынках этого зверька стали называть африканским хорьком. Его мех, в отличие от вышеназванных видов, имеет разнообразные оттенки, от желтоватого и даже лимонно-желтого до темно-коричневого или бурого.

Евроазиатских хорьков также приручали и использовали в борьбе с грызунами. Но для этой цели больше подходит степной хорь. Наиболее крупный представитель хориного племени, он может достигать в длину 56 см и весить 2 кг. Окраска его меха гораздо светлее, чем у черного хорька, и имеет желтовато-кремовый оттенок. Он распространен по степным, лесостепным, полупустынным зонам своего широкого ареала. Основу его естественного рациона составляют разнообразные грызуны – мыши,

суслики, пищухи, хомяки. Поселяясь рядом с водоемом, он отлавливает ондатр, птиц.

Черный хорек предпочитает лесные местности, из-за чего его еще называют лесным. Зверек имеет длину тела до 48 см и вес до 1,5 кг. Его естественный рацион очень разнообразен. Основная его часть – это, конечно, грызуны – полевки и мыши. Кроме того, он отлавливает лягушек, жаб, ящериц, разоряет птичьи гнезда, поедая и самих хозяев, нападает на молодых зайцев. Именно черный хорек любит наведываться в крольчатники и курятники, находя здесь легкодоступную добычу.

Все хорьки умеют рыть надежные норы, в которых, кстати, царит не самый приятный аромат. У животных сильно развиты анальные железы, выделяющие жидкость с резким, неприятным запахом, и нора пропитывается им насквозь. Кроме того, у зверьков есть привычка делать запасы. Конечно, это скоропортящиеся животные корма. Так что хорькам приходится периодически чистить свои норы, иначе запах становится невыносимым.

Гон у зверьков проходит ранней весной. Но не все самки к этому времени готовы к спариванию. Поэтому репродуктивный период может затягиваться до лета. Если оплодотворение произошло, то через тридцать шесть – сорок дней самка приносит от двух до десяти детенышей. Детеныши рождаются беспомощными и слепыми. Растут быстро. К осени они должны стать самостоятельными и уйти из семьи. А пока целыми днями заняты играми. Самец принимает участие в выращивании малышей.

Для содержания в комнатных условиях лучше всего подходят хорьки фуру (белые) или фретки (смесь фуру с черными хорьками). Благодаря селекции неприятный запах, всюду сопровождающий животных, несколько ослаблен. И при хорошем уходе его влияние на обонятельные рецепторы можно свести к минимуму.

Семейство кошачьих

Лесная (дикая) кошка

Увидев это животное в клетке зоопарка, многие люди недоумевают. Действительно, легко спутать лесную обитательницу с ее домашней родственницей, тем более что нередки случаи скрещивания. Но стоит внимательно присмотреться, как сразу станет ясно, что перед вами не просто кошка. Она крупнее, мощнее, с толстым хвостом. Длина ее тела может достигать 80 см, а вес – 10 кг.

Лесная кошка населяет всю Западную Европу, Малую Азию и европейскую часть России. Будучи очень осторожной, выбирает самые глухие и заросшие места, предпочитая холмистые и горные местности, поросшие смешанным лесом. Может поселиться в зарослях кустарника и тростника. Человека сторонится – тем более странными являются случаи, когда она поселяется на чердаках домов.

Как и многие ее родственники, дикая кошка предпочитает одиночество. Каждая особь имеет свой участок площадью 2–3 км² и тщательно метит и охраняет свою территорию. Здесь же она устраивает уютное убежище – в дупле, нише под камнями, между корней, в норах лис и барсуков. В своем укрытии проводит дневные часы, переваривая пищу и предаваясь сладкому сну. А с наступлением сумерек, предварительно проверив, что делается вокруг, выходит на добычу пропитания.

Ночь – ее любимое время. Осторожно крадется хищник по сонному лесу. Чутко вслушивается в ночные звуки. Вот прошуршала мышь, встрепенулась во сне птица, запахло зайцем. Лесная кошка – хорошая охотница, обладающая необходимой силой и ловкостью. Далее взрослые особи зайцев-русаков попадают к ней на ужин, а с ними не так-то просто справиться. Впрочем, основную часть ее естественного рациона составляют разнообразные мелкие млекопитающие и птицы.

С наступлением периода гона (февраль – март) поведение кошек кардинально меняется. Они как будто забывают про врожденную осторожность, открывая свое местонахождение громким мяуканьем, ворчаньем, кошачьими воплями. Самцы отчаянно дерутся за право обладания самкой.

Но сначала идет психическое противоборство, которое выдерживают только опытные бойцы. Оно похоже на мартовские концерты домашней кошки, когда самцы пытаются издать самый громкий и яростный вопль, морально задавить врага.

Затем победитель удаляется к самке, и следуют ритуал ухаживания и спаривание. Больше самке от самца ничего не надо, и они расстаются. Через шестьдесят три – шестьдесят восемь дней кошка приносит от трех до восьми котят. Детенышей она старается спрятать как можно надежней, но если появляется враг, яростно бросается на защиту. В это время она опасна и для человека.

Несмотря на старания матери, до года доживают далеко не все котята. Слишком много вокруг самых разнообразных опасностей. Мать кормит малышей молоком почти четыре с половиной месяца. Молодые самки становятся половозрелыми к концу первого года, а самцы – только к трем годам.

Рысь

Внешний вид этой довольно большой кошки хорошо известен. Мускулистое тело на высоких мощных лапах, короткий хвост, голова с пушистыми бакенбардами и черными кисточками на ушах, густой, мягкий, палево-рыжий мех с нечеткими темными пятнами на лапах и спине.

Красавица наших лесов, рысь обитает в умеренном климате (что нехарактерно для большинства видов кошачьих) и великолепно к нему приспособлена. Ее можно встретить по всей лесной зоне Евразии и Северной Америки. Предпочитая поселяться в глухих буреломах, свойственных хвойным лесам, она может найти убежище и в горах, в расщелинах и каменных нишах, поросших кустарником.

На охоту выходит в сумерках и ночью, но и днем едва заметна благодаря прекрасной маскировке. При появлении опасности ловко и быстро залезает на дерево, полностью сливаясь с сосновой корой, и лежит тихо и неподвижно, так что охотники часто проходят прямо под ней, не подозревая о ее присутствии. Впрочем, охотится рысь на земле, вопреки распространенному мнению, что на жертву она прыгает с деревьев.

Чаще всего рысь действительно подкарауливает добычу около тропы, но не на дереве, а хорошо замаскировавшись среди кустарника или за упавшим стволом. Может очень осторожно, бесшумно подкрадываться и затем большими прыжками настигать намеченную жертву. Во время зимней охоты ей хорошо помогают широкие лапы, с помощью которых она подбирается к копытным животным, глубоко увязшим в снегу. Именно в этот период рысь может наносить немалый ущерб популяциям косули, пятнистого и северного оленей. Эти животные становятся практически беспомощными при рыхлом и глубоком снеге. В летний период она довольствуется тетеревиными птицами, зайцами, лисами, мелкими грызунами, енотовидными собаками и так далее. Если попадутся на пути, не прочь поймать и домашних животных: собак или кошек. Сильный и ловкий хищник, рысь очень осторожна и редко нападает на тех, кто способен за себя постоять.

В некоторых регионах основной добычей рыси является заяц-беляк, от численности которого зависит количество хищников в данной местности. Если год выдается неудачным и зайцев мало, то рысь уходит из обжитых мест в более богатые живностью леса. Во время этих миграций зверь может преодолевать значительные расстояния.

С волками у рыси давняя вражда. При случае они всегда стараются загрызть эту наглую кошку, осмеливающуюся охотиться на их территории. Но нападают группой или хотя бы вдвоем: все-таки рысь – опасный противник. Она же, в свою очередь, не упустит шанса задавить волка. Поэтому многие охотники отмечают увеличение количества рыси при массовом уничтожении волков.

Гон у животных протекает в феврале-марте. Он сопровождается громкими вокальными концертами самцов. Для будущего потомства самка подыскивает самое укромное, недоступное убежище, например, нишу в скале или под корнями упавшего дерева, большую нору барсуков. Через шестьдесят три – семьдесят дней она приносит двух-трех котят, которые рождаются беспомощными и слепыми. Интересно, что в выхаживании принимают участие оба родителя. Благодаря этому процент выживаемости малышей довольно высок.

Лев

Лев – царь зверей. Совсем недавно мало кто сомневался в этом высказывании. В настоящее время в связи с более тщательным изучением жизни льва можно опровергнуть устоявшуюся истину. Во-первых, существуют звери сильнее льва. Возьмем для примера амурского тигра. Он и крупнее, и мощнее своего родственника. Во-вторых, лев оказался не таким уж неуязвимым, как думали люди. Но открытые факты совершенно не умаляют достоинств этого великолепного животного.

Раньше ареал обитания львов был гораздо шире. В доисторические времена пещерные львы встречались на Урале и Украине. Но затем во время всеобщего похолодания они стали отступать в более теплые районы. Человек, активно способствуя уменьшению их численности, еще больше сократил ареал обитания хищника, и теперь его можно встретить только в Центральной Африке и Индии. Но индийских львов осталось очень мало, и они обитают в небольшом заповеднике – Гирском лесу, в штате Гуджарат.



Чем же навлек на себя человеческий гнев этот зверь? Ответ на данный вопрос для многих людей до сих пор остается совершенно ясным. Уничтожает домашний скот, разбойничает среди диких копытных, сокращая их численность, нападает на человека. Разве мало доводов, чтобы объявить льву тотальную войну? Но давайте немного отвлечемся от человеческого эгоизма и посмотрим на льва с точки зрения матушки-природы. Какую роль отвела ему она?

Львы предпочитают открытые пространства типа саванн, но не пустыню. Саванны предоставляют хищникам наиболее благоприятные условия для существования. Это обилие стад копытных животных, водопой, высокая трава для маскировки во время охоты, деревья и кустарники, под которыми так уютно отдохнуть после сытного обеда.

Согласитесь, не любая местность обладает данными характеристиками. В других же районах львы влачат жалкое существование и обречены на вымирание. Живут львы прайдами – семейными группами, которые состоят из одного – трех взрослых самцов, самок с детенышами и подростков. Количество особей может превышать два десятка, но такие прайды в наше время очень редки. Самцов легко отличить от самок по характерной гриве: у самок она отсутствует. Именно грива, придающая самцам величественный и мужественный вид, и их громогласный рык ввели людей в заблуждение. На самом деле главное место в прайде занимают самки, которые являются его практически полновластными хозяйками.

Самки составляют ядро прайда, а самцы, как ни странно, переменная величина. Редко когда самец задерживается в группе более чем на три года. Его сменяет вновь пришедший, молодой, сильный лев. Если старый хозяин чувствует в себе силы вступить в бой, он прогоняет захватчика со своей территории. В противном случае старый правитель покидает трон.

Смена властителя не проходит без жертв. Новый самец уничтожает потомство своего предшественника. Жестоко? Да, жестоко. Но так требуют законы выживания вида. У нового самца мало времени. Он должен оставить как можно больше именно своих детей, а кормящая самка сможет принять его только после того, как поднимет на ноги малышей. Поэтому лев вынужден умерщвлять ее детенышей, чтобы самка смогла быстрее принести потомство от него.

Главная задача самца львов заключается именно в зачатии и охране своего потомства. Он даже не ходит на охоту, а лежит где-нибудь в тени деревьев и время от времени издает ужасающий рев, оповещающий всех в округе, что это его территория. Для других самцов он оставляет пахучие метки на наиболее заметных местах: кустах, холмиках, деревьях.

А что же самки? Вот они как раз и занимаются добычей пропитания для всей большой семьи. От них зависит благополучие и процветание их прайда. С приходом ночи, иногда и днем, часть самок и молодых львов выходят на охоту. Тактика подхода к жертве может быть разной. Если охотников много, то одни уходят в засаду, а остальные начинают медленно подходить к стаду зебр, гну или других антилоп. Естественно, что животные стремятся спастись бегством, и среди них львы выделяют самого слабого, который, скорее всего, и станет добычей. Когда нападающих мало, они просто подкрадываются к стаду, великолепно маскируясь с помощью своей песочного цвета шкуры в желтоватой траве саванны, а затем нападают, совершая мощные прыжки. Жертву они чаще всего душат, схватив за горло. Кроме того, львы поедают падаль и разнообразных

мелких животных. На крупных же нападают сравнительно редко. Исследователи подсчитали, что прайд из четырех львов умерщвляет взрослую зебру или другое крупное животное раз в неделю. Такая потеря для стада из тысячи особей совершенно незаметна, а если учесть, что львы выбирают самых слабых, больных, старых животных, то и полезна; ведь болезнь не сможет широко распространиться, слабый не даст еще более слабое потомство, старая особь избавится от мучений. Таким образом, лев – санитар саванны, как волк – санитар более умеренных широт. И нельзя даже отдаленно сравнивать так называемый урон, который он наносит популяции копытных ради благополучия прайда, с бездумным уничтожением целых стад человеком, охваченным охотничьим азартом.

Конечно, львы нападают и на домашний скот, а порой и на людей. Но каковы причины этого и кто больше виноват в таком положении вещей – зверь или человек? Люди, безжалостно вторгаясь во владения хищников и нарушая естественное равновесие между копытными и львами, лишают последних добычи и с неизбежностью наживают себе врагов, практически заставляя животных выбирать самую слабую и беззащитную жертву – человека. А если еще неудачный выстрел, и раненый хищник уходит, затаив злобу и, опять-таки, обрекаемый на голод?...

Размножение львов не приурочено к одному сезону. Было замечено, что количество малышей в приплоде и количество самих приплодов зависит от состояния кормовой базы. В засушливый период, когда многочисленные стада копытных уходят в поисках свежей травы, у львов наступает голод. В саванне остается слишком мало животных, и их явно не хватает, чтобы прокормить весь прайд. В это время самки могут жертвовать своими малышами, обрекая их на голодную смерть, чтобы выжить самим. Опять необходимая жестокость. Самки смогут принести новое, здоровое потомство, а недокормленные, слабые детеныши вряд ли вырастут в полноценных особей.

Но с возвратом копытных жизнь львов налаживается, и самец немедленно приступает к пополнению поредевших рядов прайда. Он выбирает самку и уводит из группы. Лев-самец – один из самых ласковых и тактичных «мужей» в животном мире. Он постоянно нежно облизывает свою подругу. Перед его беспредельно преданным и влюбленным взглядом не может устоять ни одна четвероногая красавица, и они совершают многочисленные спаривания, сопровождающиеся утробным ворчанием и мяуканьем.

Затем пара возвращается в прайд, а перед родами самка опять уходит из него и подыскивает подходящее укрытие в зарослях кустарника,

каменной нише, яме. Через сто пять – сто двенадцать дней она приносит на свет от двух до пяти детенышей, и когда им исполняется полтора месяца, все семейство возвращается обратно. Самки достигают половой зрелости в четыре года, самцы – к шести годам. Многим из подросших львов придется уйти из прайда, чтобы найти новую семью или создать свою. Но некоторые самки остаются. Они станут будущим ядром семьи.

Перед приобретением льва вы должны, во-первых, оценить состояние ваших финансов. От их наличия зависит все остальное. Во-вторых, следует задуматься о безопасности ваших близких. Это очень серьезно! В-третьих, необходимо разработать механизм обеспечения будущего питомца кормом. В сутки взрослому самцу (ведь вы решили приобрести именно самца?) понадобится до 9 кг свежего мяса, желательно парного, один целый кролик, яйца, молоко, зелень злаков, витамины и минеральные вещества. В-четвертых, важно предоставить льву соответствующее поле деятельности. Без этого он превратится в огромную разжиревшую тушу, мало способную на грациозные прыжки.

Породы домашних кошек

Кошки не отличаются большим разнообразием внешних форм, несмотря на их многочисленность и популярность.

Рассмотрим породы, наиболее распространенные в нашей стране.

Длинно– и полудлинношерстные

Персидская кошка

По сравнению с другими породами показывает наивысшую степень одомашнивания.

Она даже утратила способность ловить мышей, крыс и не может обитать вне дома. Отличается спокойствием, ласковым характером и полным доверием к человеку. Ее преданность человеку можно сравнить с верностью собаки. Эти признаки характера вместе с красивой внешностью делают ее «аристократкой» в семье кошачьих.

Кошка средних размеров, коренастая. Тело покрыто пушистым, шелковистым, мягким и длинным волосом, что придает животному исключительно привлекательный вид. Вокруг шеи, плеч и груди шерсть образует красивый воротник.

Масть может быть разнообразной. По расцветке различают 90 разновидностей. Встречается масть чисто белая, черная, голубая, красная, кремовая, рыжая, лиловая, а также черная со светло-серебристыми мордой и боками, песчаная с выраженными черными полосами и др. Кошки одноцветной масти не должны иметь пятен или оттенков, т. е. цвет всего тела должен быть одинаковым. Цвет мочки носа, подушечек лап, усов, как правило, соответствует основной масти. Голова относительно крупная, массивная, с округлым, выпуклым лбом и маленьким, коротким, но широким и слегка вздернутым носом. Щеки полные. Усы представлены в виде длинных кистей волос. Борода полная, челюсть широкая, мощная. Уши короткие, треугольные, закругленные на концах, широко и низко поставленные, наклонены вперед, с пучками длинных волос внутри раковин. Глаза большие, округлые, выпуклые, широко расставленные, выразительные. Цвет их темно-оранжевый, голубой, медный. Кошки определенной масти имеют присущий им цвет глаз. Туловище массивное, крепкое, мускулистое, пропорционально сложенное. Шея короткая,

несколько толстая. Грудь широкая и глубокая. Плечи, спина, поясница мощные.

Ноги короткие, прямые, мощные, с довольно крупными волосистыми лапами. Пальцы плотно прилегающие, между ними имеются пучки длинных волос. Хвост недлинный, направлен к земле, пушистый, со слегка закругленным кончиком.

Бирманская кошка

По размерам занимает среднее положение между персидской и сиамской. Очень ласковая, любознательная, привязана к хозяевам (особенно к детям), не шумливая, обладает тихим голосом и редко его подает. Однако может быть упрямой и даже несносной при достижении цели. Боится холода и любит спать под одеялом. В некоторых случаях она боязливая, убегает и прячется, особенно когда заходят незнакомые люди. Иногда позволяет им себя гладить и даже брать на колени. Мирно уживается с собаками, кроликами и другими животными. Шерсть может быть длинной и средней, шелковистой. Обычно она короче и тоньше, чем у персидской кошки, и не способна поэтому сваливаться. Подшерсток развит слабо. На спине и боках волос он обычно очень длинный, а вокруг шеи образует «жабо», на животе слегка завивается. На морде шерсть короткая, удлинняющаяся постепенно по направлению к щекам.

Масть чаще бывает бежевой или белой с золотистым отливом. Живот при этом абсолютно белый. По цвету шерсти различают 4 разновидности. Тело несколько вытянутое, крепкое, приземистое. Голова округлая, мощная, с широким и слегка выпуклым лбом и носом средней длины. Подбородок хорошо развит. Уши маленькие, стоячие, закругленные на концах и несколько направлены вперед, опушенные. Глаза круглые или слегка овальные, широко расставленные, голубые.

Шея мускулистая. Грудь и плечи развитые, мощные. Спина и поясница прямые, сильные.

Ноги короткие, коренастые, мощные. Лапы сравнительно крупные, сильные, закругленные и сводистые. Концы ног обычно бывают белыми, что создает впечатление, будто на них надеты носки.

Хвост средней длины, покрыт на всем протяжении густым волосом, приподнят вверх, как у белки.

Турецкая кошка ангора

Характеризуется красивой внешностью, нежным и ласковым характером по отношению к своим хозяевам. Кошки эти понятливы, быстро

воспринимают и усваивают желания и требования человека. Одновременно им свойственны некоторая медлительность и флегматичность. Шерсть средней длины, тонкая, шелковистая, мягкая на ощупь, прилегает к телу. На шее и плечах она длинная и образует воротник. На животе может быть волнистой. Подшерсток слабый (особенно на спине). Чаще встречаются кошки белого цвета.

Турецкая ангора несколько крупнее других пород. По внешнему виду и характеру шерстного покрова напоминает персидскую и в некоторой степени – лесного кота. Голова короткая, широкая, имеет форму заостренного книзу треугольника. Подбородок закруглен. Нос средний, несколько скошен. Носовое зеркало розовое. Уши сильные, относительно короткие, заостренные на концах, несколько опущены. Ушные раковины внутри покрыты пучками шерсти. Глаза большие, круглые или овальные, незначительно косо поставленные, очень выразительные, голубые или светло-янтарные.

Тело длинное, гибкое, элегантное, пропорционально сложенное, выглядит очень сильным. Задняя часть несколько приподнята. Шея средней длины, стройная, мощная. Грудь и плечи хорошо развиты. Спина мускулистая, поясница широкая, крепкая.

Ноги длинные, крепкие, с красивыми круглыми лапами (задние длиннее передних). Когти в спокойном состоянии втянуты. Между пальцами имеются пучки волос. Хвост длинный, широкий у основания и суживающийся к концу. На всем протяжении покрыт длинными волосами. Изогнут вверх над туловищем и при быстром движении может касаться головы.

Турецкая кошка ван

Шерсть длинная, мягкая, нежная, очень шелковистая, прямая, с негустым подшерстком. Масть белая с красно-каштановыми отметинами на голове и хвосте. Хвост покрыт более темными кольцами, расположенные на морде симметричные пятна должны быть разделены проточинами.

Голова треугольной формы, сильно волосистая, с крепким подбородком и прямым носом средней длины. Уши большие, близко и прямо поставленные, желто-розовые, с пучками волос внутри раковин. Глаза округлые, большие, светло-янтарные, голубые с розовым ободком. Может быть разноцветие глаз: один голубой, другой оранжевый.

Тело мускулистое, длинное, крепкое. Шея короткая. Грудь развитая. Плечи, спина и поясница мускулистые.

Ноги средней длины, мощные. Лапы округлые, с пучками волос между

пальцами.

Хвост пушистый, умеренной длины, каштаново-рыжий, с ясно выраженными каштановыми кольцами. Цвет колец у молодых кошек может быть неоднородного тона.

Норвежская лесная кошка

Животное от средних до крупных размеров, по внешнему виду напоминает европейскую короткошерстную кошку. Похожа также на турецкого вана и мэйнкуна. Отличается спокойным характером, выносливостью и неприхотливостью, достаточно подвижная и энергичная.

Шерсть длинная, гладкая, прилегающая к телу, с хорошо выраженным густым подшерстком. На щеках образует бакенбарды, на задней части туловища и задних конечностях – «штаны».

К зиме вокруг плеч и шеи вырастает воротник, который на лето исчезает.

Масть бывает самая разнообразная, как у европейской короткошерстной. По цвету шерсти различают 4 разновидности. Тело удлиненное, достаточно массивное, гибкое. Голова треугольной формы, длинная, без заметной границы между лбом и широким длинным носом. Подбородок массивный, щеки полные. Уши длинные, концы их заострены и имеют кисточки, как у рыси, стоячие, широко расставленные. Глаза большие, округлые, выразительные. Цвет их допускается разный, и в основном он соответствует окраске тела.

Шея длинная, мускулистая. Грудь и плечи хорошо развиты. Спина и поясница широкие, крепкие.

Ноги длинные, причем задние выше передних, мощные. Лапы широкие, округлые, тяжелые на вид. Хвост длинный, типичный для данной породы кошек. Он покрыт длинным волосом, который свисает, прикрывая задние конечности (мохнатый хвост).

Мэйнкун (американская енотовая кошка)

Имеет величину от средней до крупной, крепкого телосложения. По темпераменту и характеру схожа с персидской кошкой.

Шерсть густая, лохматая, шелковистая на ощупь, блестящая, на передней части тела короче, на животе и задних конечностях длиннее.

Масть разнообразная. Имеются белые пятна и рисунки на любом основном фоне. По окраске шерсти делятся на две разновидности.

Голова маленькая по отношению к туловищу, средней ширины, с высокими скулами. Морда средней длины, мощный подбородок придают

голове квадратную форму. Нос недлинный, с плавным переходом от лба к морде. Уши большие, поставлены широко и высоко, заостренные на концах и широкие у основания, с пучками шерсти внутри. Глаза большие, круглые, широко и слегка косо поставленные. Цвет их различный, но чаще – желто-зеленый.

Тело длинное, с широкой грудью и горизонтальной спиной, прямоугольного формата, мускулистое. Ноги сильные, мощные, широко поставленные, средней длины. Лапы большие, круглые, с пучками волос между пальцами.

Хвост длинный, с широким основанием и тупым концом, без изломов, покрыт густой длинной шерстью, словно страусиное перо.

Сомалийская кошка

Животное от средних до крупных размеров, гармонично сложенное, имеет довольно грациозный вид. Спокойная, любит детей.

Шерсть средней длины, густая и в то же время мягкая, шелковистая. Обычно она длиннее на животе и короче на остальной части тела. Может образовывать на шее воротник и на задних конечностях «штаны».

Масть самая разнообразная. Чаще встречается темно-красная, темно-коричневая, голубая. По окраске кошка напоминает абиссинскую.

Тело умеренной длины, гибкое, крепкое. Голова напоминает по форме закругленный короткий клин с заметным переходом от лба к морде. Контуры лба и щек мягкие. Уши большие, с широким основанием и заостренными концами. Обычно ушные раковины направлены в стороны. Глаза крупные, выразительные, с темными веками, блестящие, обычно янтарные или зеленые.

Шея мускулистая, короткая. Грудная клетка округлая. Спина прочная, несколько закругленная. Ноги стройные, длинные, крепкие. Лапы овальные, маленькие, компактные, с пучками шерсти между пальцами. Хвост средней длины, толстый у основания и сужающийся к концу, покрыт равномерно длинным волосом.

Балинез

Кошка средней величины, гибкая, с удлинёнными и заостренными сиамскими линиями. Шерсть, как у горноста: мягкая, шелковистая, спадающая, почти без подшерстка, более 5 см длиной, но летом она бывает короче. Масть голубая, шоколадная, лиловая. На плечах и бедрах разрешаются более темные оттенки основного тона.

Голова длинная, образует заостренный клин в профиль и

равнобедренный треугольник от морды к ушам. Нос прямой с незаметным переходом, подбородок в меру развит. Уши большие, заостренные на концах, зрительно продолжают линию клина головы. Глаза средние по величине, миндалевидные, косо поставленные, цвет их сочно-голубой.

Шея длинная, стройная. Туловище также длинное, с тонким костяком, мускулистое. Ноги длинные, тонкие, задние длиннее передних. Лапы изящные, маленькие, овальной формы, не распушенные. Хвост длинный, тонкий, заостренный на кончике, опушен, похож на страусиное перо.

Сибирская кошка

Достаточно крупная, подвижная, ласковая, игривая, неприхотливая и выносливая. Легко приучается к унитазу. Спит обычно на спине с поднятыми вверх или сложенными на груди передними лапами, что забавно и умирительно. Однако иногда проявляет своенравность, неусидчивость и не всегда отвечает лаской на внимание владельца, то есть имеет свое настроение. Хорошо приспособлена к условиям жизни в умеренных и средних широтах. Не боится воды.

Шерсть достаточно длинная, густая, мягкая, шелковистая. Вокруг шеи образует красивый воротник, на задних конечностях – «штаны».

Масть бывает разнообразной: серая, серо-золотистая, серебристо-голубая и др. Голова относительно большая, широкая, напоминает по форме затупленный треугольник. Лоб выпуклый, с заметным переходом к прямой морде средней длины. Подбородок хорошо выражен, щеки полные. Нос недлинный, широкий, прямой. Уши средней величины, поставлены торчком, с широким основанием и несколько закругленными концами. Ушная раковина заполнена длинным волосом. Глаза большие, округлые, широко расставленные, выразительные.

Цвет их однородный – желтый или зеленый. Тело средней величины, хотя на вид массивное, плотное, слегка вытянутое, пропорциональное. Шея короткая. Грудь объемная. Спина и поясница хорошо развитые, мощные.

Ноги умеренной длины, толстые, крепкие. Лапы округлые, с щетинистыми пучками волос между пальцами. Хвост средней длины, пушистый, выглядит сравнительно мощным.

Симрик

По внешнему виду и характеру во многом схожа с мэнской кошкой. Шерсть средней длины, мягкая, прилегающая к телу. На голове и передней части тела она короче. На шее образует воротник.

Масть может быть разнообразной. Голова округлая, с развитыми

щеками и коротким носом. Уши средней длины, широкие у основания. Глаза большие, круглые, открытые, темно-голубые и других оттенков.

Тело малых или средних размеров, пропорциональное. Ноги короткие, мускулистые, с округлыми небольшими лапами. Хвост или отсутствует, или имеется лишь небольшой зачаток.

Короткошерстные с крепким телосложением

Европейская короткошерстная

Одна из первых кошек, поселившихся в доме. Предками считаются нубийская и дикая европейская.

Хорошо приспособилась к требованиям, предъявляемым к ней человеком. В доме ведет себя спокойно. Доверчивая, охотно играет с детьми и при этом сохранила ловческий инстинкт даже тогда, когда нет недостатка в пище. Европейская кошка имеет общее происхождение с британской, и они очень похожи, поэтому в описании Международной федерации идут под одним номером.

Животное от среднего до крупного телосложения, подвижное. Масть бывает самой разнообразной: белая, черная, кремовая, серебристая или коричневая с черным рисунком и другие сочетания этих цветов. По цвету шерсти различают 35 разновидностей. Шерсть короткая, густая, жесткая, плотно прилегает к коже.

Голова сравнительно большая, длина ее превышает ширину, с развитыми щеками и крепким подбородком. Морда округлой формы. Нос средней длины, прямой, одинаковой ширины на всем протяжении. Переход от лба к носу хорошо заметен. Уши небольшие, треугольные, слегка закругленные на кончиках, широко и вертикально поставлены. Глаза большие, круглые, широко и несколько косо поставленные, темно-голубые, золотисто-оранжевые, медные, зеленые и других цветов. Взгляд открытый, ясный. Тело плотное, мускулистое, гибкое, пропорциональное, с короткой толстой шеей и круглой, хорошо развитой грудной клеткой и прочной спиной.

Ноги умеренной длины, крепкие, с небольшими, круглыми по форме лапами. Хвост средней длины, с более толстым основанием и постепенно сужающийся к несколько закругленному концу, равномерно покрыт волосом.

Американская короткошерстная

Животное средних размеров, атлетически сложенное. Имеет сдержанный темперамент, неприхотливо, легко приспосабливается к жизни в естественных условиях.

Активное, подвижное, отличается добрым характером (особенно по отношению к детям) и хорошим чутьем к ловле грызунов.

Шерсть короткая, густая, упругая, ровно покрывает все тело. Зимой она бывает еще более густой. Масть может быть белой, черной, голубой, кремовой и других оттенков. По окраске полностью соответствует персидским кошкам.

Тело крепкое, умеренной длины, гибкое, пропорционально сложенное. Голова сравнительно большая, с удлинённой овальной мордой и крепким прямоугольным подбородком. Щеки полные, особенно у самцов.

Уши средней величины, с закругленными кончиками, высоко и широко поставленные. Глаза большие, круглые, широко расставленные, темно-оранжевые, медные, голубые.

Шея мускулистая, грудь и плечи хорошо развитые, спина широкая.

Короткошерстные со средним телосложением

Русская голубая кошка

Не крупная по размерам, с несколько вытянутым гибким телом. Имеет грациозный внешний вид. По характеру ласковая, покладистая, послушная. Сравнительно подвижная, энергичная, с игривым настроением и характером, легко дрессируется.

Шерсть короткая, густая, очень нежная, шелковистая, плотная, похожа на плюшевую ткань или мех морского котика. Шерсть двойная, одинаковой длины, чем отличается эта порода от других. Масть чисто-голубая, равномерная, без всяких оттенков. Верхушка носа и нижняя часть ног могут быть серо-голубыми.

Голова короткая, клиновидной формы, с плоским черепом и узкими скулами. Морда также короткая, прямая, в профиль образует прямой угол, подбородок крепкий. Уши крупные, с тонкой прозрачной кожей, заостренные на концах, поставлены вертикально. Глаза большие, широко расставленные, живые, обычно сочно-зеленого цвета.

Шея длинная, стройная, но из-за густой плюшевой шерсти кажется короткой. Грудь круглая, мощно развитая. Спина и поясница мускулистые.

Ноги тонкие, высокие, с небольшими овальными или округлыми лапами.

Задние конечности несколько длиннее передних и массивнее. Хвост средней длины, с утолщенным основанием и заостренным концом.

Абиссинская кошка

Средних размеров, стройная. Шерсть короткая, тонкая, плотно прилегает к коже. Масть разнообразная, но чаще встречается красно-коричневая с черной или темно-коричневой прострочкой, темно-красная, голубая. Отдельные волосы могут быть по цвету двойными или даже тройными.

Голова небольшая, клиновидной формы, с сильным подбородком. Нос прямой, средней длины. Переход от лба к морде слабо заметен (без стопа). Уши сравнительно крупные, вертикально поставленные, с широким основанием и закругленными концами с кисточкой волос. Брови и веки темные. Глаза большие, выразительные, широко и слегка косо поставленные, обычно зеленые, желтые, цвета лесного ореха.

Тело крепкое, мускулистое, гибкое, подобранное. Шея короткая, изящная, элегантно изогнутая. Спина мощная, развитая, грудь широкая и достаточно глубокая. После годовалого возраста формируется окончательный цвет волос – бронзовый, с почти незаметным потемнением с обеих сторон туловища. По цвету шерсти различают 10 разновидностей.

Голова малая, клиновидная, с выраженным стопом между округлым лбом и коротким носом. Подбородок округлый. Уши крупные, несколько наклонены вперед, широко расставлены. Глаза средней величины, выразительные, косо поставленные, миндалевидные, золотистого цвета.

Туловище средней величины, длинное, стройное. Шея длинная, тонкая. Грудь широкая и глубокая. Спина и поясница пропорциональные. Ноги длинные, тонкие, с небольшими округлыми лапами. Хвост длинный, заканчивается не так заостренно, как у сиамских кошек.

Короткошерстные со стройным и легким телосложением

Сиамская кошка

Выглядит несколько суровой и замкнутой, отрицательно реагирует на посторонние шумы. Тем не менее это симпатичное, ласковое, нежное животное, очень преданное своим хозяевам, быстро реагирует и приспосабливается к изменениям в их настроении. Всегда радостно встречает возвращение хозяев домой. Поэтому по праву пользуется большой популярностью среди любителей.

Кошка небольшая по размерам, легкая. Шерсть очень короткая, густая, блестящая, плотно прилегающая к коже.

Наиболее распространена двухцветная масть: тело обычно светлое с легким желтоватым или шоколадным оттенком, морда, уши, лапы и хвост – темно-бурые. Ноги бывают как бы одетыми в черные или шоколадного цвета «чулки». Встречается белая с голубым или золотисто-красным значком, кремовая с черно-коричневым значком (котик) и др. Известно 18 разновидностей сиамской кошки по цвету шерсти.

Голова средней величины, пропорциональна по отношению к туловищу. Имеет клиновидную форму с острием, начинающимся от конца носа. Нос длинный, прямой, продолжает линию лба без излома. Подбородок и челюсти умеренной величины. Уши удлинённые, большие, широкие у основания и заостренные на концах. Глаза округлые, слегка раскосые, неглубоко посаженные, желто-голубые или янтарные.

Шея стройная, длинная. Туловище мускулистое, гибкое, несколько вытянутое, пропорционально сложенное. Плечи примерно одинаковой ширины с бедрами. Спина и поясница прочные.

Ноги относительно длинные, тонкие, стройные, крепкие. Задние несколько длиннее передних. Лапы маленькие, овальные. Хвост длинный, тонкий, заостренный на конце, обычно окрашен в черный цвет.

Ориентальная (восточная)

Кошка легкой конституции, с покладистым, ласковым характером. Неприхотливая, легко поддается дрессировке.

Шерсть короткая, тонкая, густая, блестящая, плотно прилегает к телу. Масть разнообразная: коричневая, черная, кремовая, черепаховая, мраморная, серебристо-черная и др. По цвету шерсти различают 40 разновидностей.

Тело среднего размера, вытянутое, гибкое, мускулистое.

Голова небольшая, клиновидной формы, несколько вытянутая. Нос длинный, прямой, с прямым переходом от лба. Подбородок развит. Уши большие, широкие у основания и заостренные на кончиках. Глаза небольшие, округлые, блестящие, несколько косо поставленные, выразительные, сочно-зеленого цвета.

Шея длинная, стройная. Спина и поясница мускулистые, крепкие. Грудь объемная, плечи обычно не шире бедер.

Ноги длинные, крепкие, прямые, с маленькими овальными, сжатыми в комки лапами черного или бронзового цвета. Хвост длинный, тонкий, заостренный в виде хлыста.

Сингапура

Кошка маленьких размеров, привлекательных форм, изящная, очень жизнерадостная и подвижная. Послушная, забавная, любимица детей. Шерсть короткая, очень тонкая, нежная, шелковистая, плотно прилегающая к телу. У кота она обычно бывает длиннее.

Наиболее характерной мастью является двойной темно-коричневый тикинг на кремовом фоне, в основном без рисунка. Мочка носа и подушечки лап, как правило, темно-коричневые. Грудь и живот могут быть окрашены в мягкий коричневый цвет. Туловище средней длины, несколько округлое, мускулистое, но легкое, изящное.

Голова круглая, с короткими широкими челюстями, тупой мордой и полным подбородком. Переход от лба к морде почти незаметен. Подушечки усов хорошо выражены. Уши большие, длинные, с глубокой и заостренной ушной раковиной. Глаза большие, миндалевидные, несколько косо поставленные. Цвет их может быть разным: от золотистого до медного.

Шея средней длины, спина мощная и слегка выпуклая. Грудь развитая.

Ноги недлинные, крепкие, стройные. Лапы маленькие, узкие, пальцы собраны в комочек. Хвост умеренной длины, толстый у основания, постепенно утончающийся к тупому концу.

СОВЫ

Ушастая сова

Ушастые совы широко распространены в Евразии и Северной Америке, занимают регионы с теплым или умеренным климатом. Это лесные жители, но наиболее удобными для них местами обитания являются опушки леса, поляны, лесополосы. Они любят поселяться в садах и на островках леса посередине поля, что позволяет им расширить свой охотничий участок, облетая ночью или в сумерках открытые места.

Своей внешностью ушастые совы очень похожи на филинов, только гораздо меньшего размера. И те, и другие имеют длинные перьевые «ушки», оранжевые глаза и практически одинаковую охристую окраску оперения, поэтому их часто не различают. Но стоит посмотреть на этих птиц где-нибудь в зоопарке, и больше путаница вам не грозит. Филин – самая большая сова. Размах его крыльев может достигать практически двух метров (190 см). И вес птицы достаточно большой – до 3 кг. Ушастая сова редко весит больше 430 г, а размах крыльев ее – всего 85–95 см. Внушительная разница, не так ли? Тем не менее каждый год в зоопарки попадают десятки птенцов мнимых «филинов».

Несмотря на ее сравнительную многочисленность, мало кто из людей может похвастаться тем, что видел взрослую ушастую сову. Она может поселиться рядом с домом человека, вывести птенцов, а он даже не будет подозревать о присутствии рядом с собой такой соседки. Конечно, в первую очередь это связано с образом жизни птиц этого семейства. Как известно, практически все совы ведут сумеречный и ночной образ жизни. Их полет практически бесшумен, что помогает им близко подлетать к своей жертве. Именно за эти особенности поведения эти невинные птицы и попали в немилость инквизиции, причислившей их к нечисти. Очень интересно, но и в настоящее время многие люди рисуют в своем воображении ведьму с сидящей на ее плече совой. А вспомните про бабу Ягу. Ее избушка наполнена страшными совами с горящими глазами. Значит, и у современных людей сохранились предрассудки по поводу этих полезнейших пернатых.

Если посмотреть на ушастую сову глазами ученого, то никаких таинственных способностей у нее мы найти не сможем. Просто она идеально приспособлена к ночному образу жизни, и каждый участок ее тела помогает ей выжить в трудной борьбе за существование.

В природе совы выполняют ту же роль, что и дневные хищные птицы, и занимают ту же экологическую нишу. Чтобы избежать конкуренции, им пришлось научиться охотиться в сумеречное и ночное время. В результате они выработали ряд особенностей, помогающих выполнять эту сложную задачу. Их оперение приобрело определенную мягкость, маховые перья имеют нежную бахрому, поэтому при полете исчезает свистящий звук рассекаемого воздуха. Таким образом, совы научились бесшумно летать.



Они обладают бинокулярным зрением, как человек. Глаза большие, зрачок сжимается и расширяется в зависимости от степени освещения. Зрение очень острое. Все эти особенности зрительного аппарата позволяют хорошо ориентироваться в сумерках и ночью. Однако здесь кроется еще одно заблуждение, порождающее слухи о том, что днем совы ничего не видят. В действительности даже днем у сов прекрасное зрение, немного лучше, чем у человека. В пасмурную погоду ушастые совы могут вылетать на охоту и днем.

Слуховой аппарат сов практически совершенен. Большие ушные отверстия, расположенные по бокам головы асимметрично, одно ниже, другое выше, позволяют определять местоположение жертвы очень точно. Проводились опыты, когда сову помещали в абсолютно темную комнату,

куда не проникал ни один лучик света. В помещение запускали мышь, и птица, ориентируясь только по шороху, издаваемому животным, точно ловила жертву.

А еще ушастые совы прекрасно умеют маскироваться. Цвет их оперения идеально сочетается с разнообразными оттенками коричневого на коре дерева. При появлении опасности птица вытягивается, одно крыло выдвигается вперед и наподобие щита закрывает тело, глаза полуприкрыты, и ее не отличить от древесного сучка. Можно пройти в нескольких шагах и не заметить. Часто зимой на дневки совы устраиваются в городских парках, располагаясь по несколько особей на одном дереве. И преспокойно проводят там время до сумерек, так и оставаясь никем не обнаруженными.

Если ко всем вышеприведенным особенностям прибавить острые длинные когти и загнутый крючком сильный клюв, то мы получим законченное описание этого прекрасного, совершенного творения природы, созданного для царствования в ночи, но без примеси какой-либо мистики.

Ушастые совы обычно мигрируют, но в более южных районах могут быть и оседлыми. Кстати, в холодное время они могут демонстрировать особенность, не свойственную остальным представителям семейства, а именно: собираясь в небольшие стайки, по пятнадцать – тридцать особей, вместе перезимовать или вместе отлетать на места зимовок. Но охотятся все равно поодиночке.

Питаются в основном мелкими млекопитающими: полевками, мышами, землеройками, мелкими птицами. Во время выкармливания уничтожают огромное количество грызунов, спасая тем самым урожай. Именно от количества грызунов зависит благополучие этого вида. При снижении численности мышей резко снижается количество выкармливаемых птенцов. Во время голода наблюдается каннибализм, когда старшие птенцы съедают младших. Этот жестокий механизм спасает вид от вымирания.

Возвращаясь ранней весной, в марте или апреле, самцы начинают петь. Их пение не отличается разнообразием и красотой. В весеннем лесу раздаются грустные, монотонные звуки: «гуу, гуу, гуу...». Этой незатейливой песенкой самец заманивает самку к выбранному для гнездования месту. Чаще всего он выбирает старые гнезда сорок, грачей, хищных птиц. В дуплах ушастые совы гнездятся редко, а сами строить гнезд не умеют.

Самка откладывает три – восемь белых яиц. Насиживает их двадцать пять – двадцать восемь дней. Самец в это время старательно кормит самку.

После вылупления птенцов на его плечи ложится двойная нагрузка по выкармливанию малышей и их мамы. Птенцы вылупляются покрытые пухом и к десятому дню превращаются в светло-серые пуховые комочки с яркими оранжевыми глазами. Но они не так безобидны, как кажется. Увидев врага, начинают щелкать клювами, опрокидываются на спину и отчаянно царапаются, нанося своими острыми коготками ощутимые ранки. Родители также не дают прохода обидчику, кричат, щелкают клювами, пикируют, иногда бьют лапами с налета по голове и спине.

Через двадцать дней совы начинают потихоньку выбираться из гнезда, а еще спустя пять-шесть дней окончательно покидают его и разбредаются по соседним кустам и деревьям. Там они приступают к изучению мироздания, ползая по веткам. Летать малыши еще не умеют и при лазанье помогают себе клювом, цепляясь им за ветки и подтягиваясь вверх. Родители находят их по громкому писку, которым совы сообщают о своем местонахождении, и кормят еще примерно полтора месяца. На данном этапе развития гибнет много сов. В настоящее время к их естественным врагам присоединился и человек, по своему незнанию приносящий огромный вред этой птице. Совы еще настолько глупы и любопытны, что не могут долго прятаться в кустах при появлении опасности и выдают свое присутствие писком, возней. Человек, увидев сидящего на веточке совенка, практически тут же пытается его поймать, что не составляет особого труда. Или, постояв рядом с ним некоторое время и убедившись в его брошенности, забирает его домой. При этом забывая, что осторожная птица никогда не подлетит к своему птенцу в присутствии человека, а совы вовсе не бедные сиротинки, – просто пришло их время учиться самостоятельно жить.

Но вот наступает осень, и уже практически взрослые птицы собираются к первому отлету на зимовку. К концу первого года они смогут приступить к гнездованию. Срок жизни ушастых сов невелик – примерно двадцать восемь – тридцать лет.

Вьюрковые

Чиж

Эта небольшая птичка уже многие годы покоряет сердца любителей-орнитологов. Хотя ее нельзя отнести к особо оригинальным и красивым видам, она своеобразна и не лишена определенного очарования.

Чиж избежал печальной участи попасть в список исчезающих видов, наоборот, он очень распространен. Встречается практически по всей Европе, в Западной и Восточной Азии. Будучи типичным лесным жителем, приемлющим как хвойные, так и смешанные леса, он очень невелик и весит всего 11–14 г. Имеет неброскую окраску, превосходно маскирующую его среди ветвей деревьев. Основной тон оперения самца зеленоватый с различными оттенками, от оливкового до желтоватого; щеки и брови желтые; на голове черная шапочка; подбородок и горло черные. Самка окрашена в серовато-бурые с пестринами тона.

Чиж очень подвижен. Стоит вспомнить детскую песенку про чижику, и перед глазами сразу возникает юркая птичка, прыгающая по кустам и сующая везде свой маленький клювик. И этот портрет будет соответствовать действительности. Чиж действительно суетлив, с очень ловкими пальчиками на лапах, позволяющими ему проворно прыгать по веточкам и висеть на них вниз головой.

Держатся чижики небольшими стайками, кочуя в поисках кормовых мест по своему ареалу. Во время кочевок их можно встретить в березняках и в других лиственных лесах. Питаются в основном семенами и побегами деревьев, таких как береза, ольха, сосна, ель, а также семенами разнообразных дикорастущих трав и кустарников. Но не пропускают и насекомых.

В апреле начинается гнездовой период. В это время самец начинает петь. Песенка чижики незатейлива, но очень приятна и мелодична. Взрослый опытный самец может добавлять в свою песенку и голоса других птиц. Любители певчих птиц любят чижей именно за их импровизации.

Гнездятся чижи только на высоких елях, устраиваясь на высоте в десять метров над землей и выше. Гнездо вьет самка, а самец иногда приносит материал для достройки. Оно имеет «классическую» форму: в виде чаши, сплетенной из травы и веточек, – и искусно маскируется мхом и лишайником, так что его практически невозможно найти в гуще еловых ветвей. Лоток выстилается перьями, пушинками от растений. Самка

приносит три – шесть нежно-голубых в коричневую крапинку яиц, которые насиживает двенадцать – четырнадцать дней. После вылупления родители кормят птенцов разнообразными насекомыми, постепенно, по мере их роста, добавляя в корм семена и побеги. В мае или июне молодые птицы покидают гнездо, а старые могут приступить к повторной кладке.

Щегол

Эту птицу можно смело отнести к отечественным экзотическим видам. Ее охотно приобретают даже зарубежные любители. Кроме довольно яркого оперения, щеглы имеют приятные голосовые данные и незаурядные умственные способности, хорошо поддаются дрессировке. Были случаи использования этих сообразительных птичек для вытаскивания счастливых билетиков, наподобие попугаев.

Ареал обитания щеглов велик. Он включает всю Европу, Западную Азию, Северную Африку, Западную и Южную Сибирь. Встречается два вида щеглов: обыкновенный, или черноголовый, и седоголовый. Они различаются окраской и ареалами обитания.

Наиболее известен обыкновенный щегол. Его чаще всего содержат в качестве домашнего любимца. Общий тон его окраски коричневый; хвост черный с белыми пестринами; крылья черные с яркими желтыми полосами; лоб и горло красные; щеки белые; темя, затылок черные. Самец и самка окрашены практически одинаково. Для подбора пары нужно будет обращаться к специалистам. Но довольно точно можно попытаться идентифицировать пол по размерам красной окраски лба и темени. Цвет оперения самки менее интенсивный, плечи покрыты перьями буроватого цвета, красное пятно занимает меньшую площадь. Также есть различия в ширине красной полосы под основанием клюва. У самцов она шире – от 8 до 10 мм, у самок – от 4 до 6 мм.

Седоголовый щегол окрашен менее ярко. Красное пятно меньше. Нет черной шапочки, а голова, спина и грудь окрашены в буровато-серые тона. Распространен в Южной Сибири и Средней Азии.

Щеглы любят поселяться в рощах, разреженных и светлых лесах, садах. Их можно встретить в перелесках и пойменных лесах, особенно благоприятны условия существования при наличии зарослей бурьяна. Щеглы относятся к растительноядным птицам. Поэтому они выбирают местности с богатым травостоем, и бурьян вполне отвечает их кормовым требованиям. В их естественном рационе присутствуют многочисленные семена разнообразных кустарников, деревьев, трав. Но птенцов выкармливают насекомыми. Поселяясь в садах, щеглы приносят большую

пользу их владельцам, в период выкармливания птенцов уничтожая огромное количество вредных насекомых.

Щеглы могут неплохо петь. Некоторые любители, покоренные их красотой и приятными песенками, звучащими даже зимой, когда за окном трещат морозы, на всю жизнь остаются их поклонниками.

Осенью и зимой щеглы собираются в стайки, кочуя в поисках кормовых мест. Но далеко от мест обитания не отлетают. Ранней весной стайки начинают делиться на пары, а в апреле уже разлетаются по гнездовым участкам. Гнездо строят высоко на дереве в начале или середине мая. Оно имеет чашевидную форму и свито из травинок и корешков, скрепленных паутиной. Снаружи гнездо маскируется под тон дерева кусочками мха, лишайника, коры, бересты. Изнутри выстилается перьями, шерстью животных, растительным пухом.

В мае самка откладывает четыре – шесть голубоватых с фиолетовыми крапинками и полосками яиц. Насиживает двенадцать – тринадцать дней. Птенцы растут очень быстро и покидают гнездо примерно в середине июня, через тринадцать – пятнадцать дней, но родители еще кормят птенцов в течение недели.

Зяблик

Зяблики широко распространены практически по всей Европе и Северной Африке, В России этот вид занимает территорию до Средней Сибири, а также встречается в западных частях Азии. Приятно осознавать, что эти красивые птички до сих пор остаются одними из наиболее часто встречаемых в наших лесах и садах пернатых жителей.

Самца зяблика легко отличать от других видов по серо-голубой шапочке и розово-коричневой окраске щек, груди и верхней части спины. После линьки, которая начинается во второй половине лета, окраска приобретает более коричневый оттенок за счет коричневой окантовки покровных перьев. Но к весне окантовка снашивается, и доминирующим оттенком оперения становится ярко-розовый. У самочки окраска скромнее, в основном присутствуют светло-коричневые тона. Но как и у самца, так и у самки на крыльях имеются две белые полосы. Встречаются птицы длиной до 18 см.

Селятся зяблики в лесах всех типов, но не любят густых зарослей. Они настолько неприхотливы к местообитанию, что довольно часто поселяются в городских парках, оживляя их своим задорным пением. Любят светлые березовые леса, боры, особенно с подлеском из разнообразных лиственных кустарников.

Зяблики – перелетные птицы. Прилетают стаями в апреле – мае, в зависимости от ареала, в южных частях раньше, в северных позже. Самки прилетают на несколько дней позже самцов. Самцы вскоре после прилета начинают подыскивать себе гнездовую территорию и активно петь. В это время они драчливы, и между самцами происходят бои за обладание полюбившимся им участком. Зяблики очень привязаны к своим прежним гнездовьям и стараются из года в год к ним возвращаться. Возвращаются на то же самое дерево и часто выют гнездо на том же месте, где оно находилось в прошлом году.

Примерно через месяц после прилета самка приступает к строительству гнезда. Зяблики неприхотливы при выборе места для гнездовья. Они выют гнезда на самых разных деревьях и располагают их то около ствола, то на ветке или в развилке. Даже высота расположения сильно колеблется – от 0,5 до 20 метров от земли. Среди птиц мало таких непритязательных и выносливых, как зяблики.

Гнезда этих птиц относят к одним из самых искусных. Они очень аккуратно и красиво свиваются из разнообразных травинок, корешков, мха, тонких веточек в виде чаши с толстыми стенками. Снаружи маскируются под общий тон коры дерева кусочками бересты, лишайника и паутиной. Поэтому их трудно увидеть среди ветвей. Лоток выстилается шерстью животных, мягким мусором типа ваты и бумажек с добавлением перьев.

Наконец самка откладывает четыре – семь яиц, которые насиживает в течение двенадцати-тринадцати дней. Они очень красивые, похожи на разноцветные камушки и очень отличаются окраской. Есть и практически белые с редкими пятнышками, а есть окрашенные в мягкие пастельные тона фиолетового, красноватого, зеленоватого, голубого, бурого оттенков. По общему фону разбросаны фиолетовые, красноватые, коричневые пятна, тонкие линии, завитки. Каждое яйцо – это произведение искусства.

В странах с теплым климатом птицы могут выводить птенцов дважды в год. Первую кладку обычно делают в середине апреля или начале мая, а вторую – в июне. Насиживает только самка, а самец старательно кормит ее и птенцов. Птенцы вылетают из гнезда через одиннадцать – четырнадцать дней. Родители подкармливают их еще несколько суток.

Птенцов кормят разнообразными насекомыми, их личинками, мягкими семенами и ягодами. В этот период зяблики уничтожают огромное количество насекомых-вредителей. Поселяясь в саду, они спасают его от долгоносиков, листоедов, гусениц совок, пядениц, клопов-щитников. Взрослые птицы в большом количестве поедают семена сорных трав, разнообразных кустарников и деревьев. Летом они хорошо поедают

насекомых. Поэтому зябликов нельзя относить только к зерноядным птицам.

Перед отлетом зяблики собираются в большие стаи на опушках или лесных полянах. Отлетают в сентябре – октябре, В южных частях ареала это кочующие или оседлые птицы.

Коноплянка

Коноплянка – один из лучших певцов, высоко ценимый многими любителями. Кроме певческого таланта эта птичка обладает довольно приятной и красивой окраской. У самцов в брачный период на лбу и по бокам груди проступают ярко-красные пятна, отсутствующие у молодых птиц и самок. Голова серая; спина и верх крыльев светло-коричневые; брюшко еще светлее. Самочки и молодые птицы в основном коричневого оттенка, малоприметные. После линьки самцы приобретают охристую окраску, а все яркие пятна укрываются рыжеватыми каемками покровных перьев. В длину достигают 16 см.

Коноплянки, или, как их еще называют, реполовы, широко распространены в Европе, Северной Африке, Передней Азии. Встречаются в небольших лесочках, лесополосах, садах, парках, в кустарниках рядом с лугом, полем, выпасом. Не боятся поселяться рядом с человеческим жильем, в городах могут гнездиться в небольших парках рядом с дорогой. Несмотря на это, люди плохо с ними знакомы.

Коноплянки – перелетные птицы, зимуют только в южных частях ареала. К местам гнездования прилетают в конце мая, но вообще сроки прилета зависят от наступления весны. Самцы много и охотно поют практически до отлета. В их пении можно услышать трели других певчих птиц, и эти импровизации всегда отличаются мелодичностью и красотой звука. Часто слышится и хоровое пение самцов, находящихся на небольшом удалении друг от друга. Поют самцы, сидя на верхушках деревьев, на проводах, столбах и других возвышениях.

Для гнезда птицы чаще всего выбирают кустарник, по возможности колючий. Охотно гнездятся на небольших елочках или деревьях, невысоко над землей, редко выше двух с половиной метров. Отличаются мирным нравом, так что несколько пар могут располагаться недалеко друг от друга. Гнездо строит только самка, используя в качестве строительного материала траву, корешки, волокна луба, мох. Лоток выстилает шерстью животных, мягкой травой, перьями.

Самка откладывает четыре – семь разноцветных яиц. Тон их окраски в основном белый с зеленоватым, голубым или серым оттенком и

коричневыми, рыжими, буроватыми пятнами на тупом конце. Насиживание длится десять – двенадцать дней. Птенцы покидают гнездо через одиннадцать-семнадцать дней. В течение гнездового периода могут иметь место две кладки, а при их гибели возможна и третья.

Снегирь

Перед вами еще один отечественный красавец, и, надеюсь, его вам представлять не нужно. Для многих людей он является символом зимы, неизменным персонажем зимней сказки. И действительно, появляясь в наших регионах в ноябре, снегири символизируют приход зимнего сезона. Внешний вид их известен практически всем: самец и самка имеют черные шапочки и черные крылья с белой полосой; хвост тоже черный; поясница белая; у самца грудь ярко-розовая и серая спина, у самки грудь розово-бурая, спина – серо-бурая. Молодые птицы похожи по окраске на самку, только грудь буровато-охристая и нет червой шапочки. Птицы достигают в длину 19 см. Встречается вид по всей Евразии. К сожалению, снегирей нельзя отнести к широко распространенным птицам, хотя в ряде регионов они обычны. Населяют леса всех типов. Их можно встретить также и в городских парках, где они охотно посещают рябины. Но все же предпочитают разреженные леса с хорошей еловой порослью.

Во внегнездовой период снегири кочуют небольшими стайками в поисках кормовых мест. Именно в это время они часто встречаются в городах и поселках. Если достаточно корма, то снегири долго задерживаются на одном месте. Яркие стайки птиц можно увидеть на кустах боярышника, сирени, на рябине, кленах и ясенях. Они разгрызают ягоды и коробочки, добываясь до семян.

В период зимовки, в феврале или марте, снегири разбиваются на пары. В это время можно услышать их негромкие песни, которые поют самцы, сидя на кустах или деревьях. Иногда к ним присоединяются самочки. Прилетая на гнездовые участки в апреле, птицы замолкают до следующего кочевого периода.

Для гнезда птицы выбирают густые ветви разнообразных хвойных и лиственных деревьев. Но предпочитают сосны, ели и пихты. Гнездо вьют не очень высоко над землей, редко выше двух с половиной метров. Оно имеет чашевидную форму и сплетено из веточек, мха, травы и лишайника. Лоток выстилается шерстью животных, растительными волокнами, травой и перьями. Строит только самка. Наконец, она откладывает четыре – семь яиц, которые насиживает двенадцать – четырнадцать дней. Птенцы вылетают из гнезда через двенадцать-шестнадцать дней. Причем птенцов

кормят оба родителя.

Снегири – растительноядные птицы. В их естественный рацион входят разнообразные семена трав и деревьев, ягоды, почки, бутоны, редко насекомые. Птенцов выкармливают также растительной пищей с добавлением насекомых.

Дроздовые

Обыкновенный соловей

При взгляде на эту невзрачную птичку многим и в голову не придет, что перед ними знаменитый певец-соловей. Многие люди, послушав пение соловья, представляют прекрасную, ярко окрашенную птицу, красочные переливы оперения которой вполне соответствуют ее удивительному голосу. На самом деле соловей имеет оливково-коричневую спинку, белые горлышко и середину груди и рыжеватый хвостик. И размерами не велик (достигает в длину 20 см). Именно благодаря такой окраске соловей практически невидим в гуще ветвей и в траве во время насиживания яиц.

Обитают соловьи в странах Восточной Европы и Западной Сибири. Прилетают в первых числах мая, когда начинают распускаться листья, и занимают местности, заросшие кустарником, желательны сырые. Поэтому их можно услышать в старых заросших садах и парках, на небольших болотцах, по берегам рек в кустах. В таких местах их практически невозможно увидеть.

Старые самцы возвращаются в места, где жили прежде, даже на тот же куст. Поэтому и можно услышать в одном заросшем уголке сразу нескольких соловьев. Впрочем, после прилета самцы некоторое время молчат, запевая лишь спустя несколько дней.

Гнездо самка вьет на земле, выбрав самый укромный и густой участок. Оно прекрасно замаскировано, и наткнуться на него можно только случайно. К строительству гнезда приступают в конце мая или начале июня в зависимости от региона. Самка использует в качестве строительного материала мох, траву, сухие листья, кору, растительные волокна. Лоток выстилает шерстью животных и мелкими листьями. Гнездо имеет форму глубокой чаши с рыхлыми краями.

Свив гнездо, самка откладывает три – шесть яиц, имеющих темную оливковую окраску. Насиживает тринадцать – четырнадцать дней. Птенцы покидают гнездо через одиннадцать – тринадцать дней, но летать начинают только на восемнадцатый день. До этого времени они сидят на ветках кустов и ждут родителей с кормом. Выкармливают оба родителя.

Соловьи относятся к насекомоядным птицам. В рационе основными кормами являются разнообразные насекомые, которых они охотно собирают на земле и ветвях. Хорошо едят ягоды. Птенцов также выкармливают насекомыми.

На зимовку улетают в Юго-Восточную Африку.

Скворцовые

Скворцы

Скворцы – одни из самых лучших подражателей и импровизаторов в мире птиц. Они прекрасно перенимают голоса других птиц, животных, звуки неживой природы. Поэтому и являются желанными гостями в наших квартирах. Но, к сожалению, содержание скворцов сопряжено с рядом определенных трудностей, которые будут перечислены ниже.

В нашей стране распространено пять видов скворцов, и три из них пользуются наибольшей популярностью у любителей. К ним относятся обыкновенный скворец, розовый скворец и майна. Все они имеют длину от 24 до 28 см и обладают острым, длинным клювом. В основе их питания разнообразные насекомые, но если есть возможность полакомиться ягодами, скворцы никогда не упустят ее.

Обыкновенный скворец широко распространен в России; его ареал занимает практически всю Евразию. В настоящее время, не без помощи человека, он довольно широко расселился и в других странах. Так, он с успехом заселил Южную Африку, Северную Америку, Австралию и некоторые острова, причем в Северной Америке стал даже многочисленным.

Обыкновенный скворец имеет характерную черную окраску, переливающуюся металлическим блеском зеленых, красных, фиолетовых тонов. По темному фону разбросаны белые пятнышки, будто птицу обсыпали мелким жемчугом. У самца они расположены в основном на спине и ближе к хвосту, а у самки пятнышки больше и рассыпаны по всему телу, даже по голове. Молодые птицы окрашены в невзрачный бурый наряд.

Во внегнездовое время обыкновенные скворцы собираются в большие стаи, которые рано начинают миграцию на место зимовки. Их отлет можно наблюдать в конце августа, а последние птицы улетают в октябре. Но в регионах с теплыми зимами скворцы остаются зимовать около сытных кормовых мест, таких как свалки или скотные дворы. Весной, вернувшись на родину, они разлетаются по своим гнездовым участкам.

Эти птицы прилетают в наш регион рано, когда появляются первые проталины. Люди сразу замечают их прилет по активному пению самцов около вивешенных скворечников. Вообще скворцы – удивительные птицы. Они не чуждаются общества людей и активно заселяют разнообразные

разрушенные здания, скворечники, дупла в старых деревьях около человеческого жилья. Любят, когда рядом есть огород, пашня, сад и водоем. С успехом поселяются в лесной и степной зоне, выбирая для гнездования дупла дятлов, норы на крутых склонах, оставленные береговой ласточкой, сизоворонком, щурком, и даже просто россыпи камней. Гнездиться могут как отдельными парами, так и целой колонией.

Место для гнездования выбирает самец. Активным пением привлекает самку, и они вместе строят гнездо. Скворцы не относятся к искусным строителям, и их гнездо представляет собой довольно беспорядочное сплетение из травы, перьев, растительных волокон, сена и так далее. Самка откладывает пять-шесть яиц, окрашенных в нежно-голубой цвет. Скворцы – заботливые родители, они оба участвуют в насиживании. Насиживают одиннадцать – четырнадцать дней. Птенцы покидают гнездо через три – три с половиной недели.

Как уже отмечалось, скворцы – преимущественно насекомоядные птицы. Насекомыми выкармливают и птенцов. В данный период они уничтожают огромное количество разнообразных вредителей. Но из-за своей любви к ягодам могут нанести урон и плодово-ягодным культурам.

Другой вид, розовый скворец, отличается от предыдущего очень красивой брачной окраской. Самец приобретает розовую окраску тела, а голова, шея, хвост и крылья имеют черную окраску, с синим, фиолетовым и зеленым отливом. На голове птицы есть длинный хохол, малозаметный при беглом осмотре. Самка окрашена в более тусклые тона. Молодые особи желтовато-бурые. После окончания брачного периода розовое оперение сменяется на менее яркий наряд, состоящий из смеси розовых, бурых и желтоватых тонов. На черных участках также появляются бурые оттенки. К сожалению, в неволе розовая окраска быстро исчезает, сменяясь серым тоном. Но при правильном кормлении и содержании можно приостановить этот процесс.

Встречается розовый скворец в странах с теплым климатом по всей Евразии. Предпочитает районы с большими пустыми пространствами, но недалеко от водоемов, поэтому в нашей лесостепной зоне может оказаться только случайно.

Прилетают розовые скворцы в апреле и часто гнездятся колониями, иногда располагая гнезда практически вплотную. Они могут устроить гнездо среди кучи камней, в нишах скал и утесов, в степных могильниках, в расширенных норках ласточек и щурок. Как и обыкновенный скворец, розовый скворец любит старые развалины.

Часть птиц прилетает, уже разбившись на пары. Остальные ищут

партнера на месте. Гнездо строят вместе, самец и самка, из разнообразных стебельков, травы, веточек, располагая их в виде тонкой подстилки. Сверху укладывают перья, свежие листья полыни, иногда шерсть. Самка откладывает три – семь голубоватых или бледно-серых яиц. Оба родителя заботливо насиживают их в течение одиннадцати – пятнадцати дней, после чего так же заботливо выкармливают своих птенцов. Птенцы вылезают из гнезда рано, через четырнадцать – девятнадцать дней, но летать начинают только к концу месяца.

Питаются розовые скворцы насекомыми и являются основными природными врагами саранчи в годы ее массового размножения. Их распространение также связано с районами, для которых характерны большие скопления этих насекомых. Кроме саранчи они добывают и другие виды насекомых, едят ягоды, плоды и семена дикорастущих растений. Птенцов выкармливают этими же кормами.

Большим спросом у любителей пользуется майна. Этот вид обладает прекрасными подражательными способностями. Распространен в Южной и Центральной Азии, но благодаря человеку его ареал сильно расширяется.

Тело майны имеет бурую окраску с розовым или красноватым оттенком.

Голова и шея черные, хвост и крылья черные с бурым оттенком. На щеках есть голое кожистое пятно желтого цвета. Подхвостье, брюшко, пятна на крыльях и конце хвоста белые. Самец и самка окрашены одинаково, но размеры самца несколько больше.

Майны являются оседлыми птицами, на зимний период собирающимися в стаи. В это время их можно встретить на свалках, городских мусорках, скотных дворах и в других кормовых местах. Начиная с марта, птицы разбиваются на пары и ищут место для гнездования. Они выбирают дупла деревьев, ниши в старых постройках и скалах. Гнездо строят вместе. В мае появляются первые кладки, чаще всего из пяти голубых яиц. Насиживание продолжается четырнадцать дней, птенцов кормят в течение двадцати пяти дней и докармливают в течение пяти дней после вылета из гнезда. За летний период майны могут сделать три кладки.

Питаются майны, как и другие скворцы, в основном насекомыми, по большей части саранчовыми, не брезгуют ягодами и плодами. Но рацион их довольно разнообразен, что позволяет им в зимний период кормиться на свалках. Птенцов стараются выкармливать саранчой, отрывая предварительно крылья и лапки.

Канарейки

История канареек

Слово «канарейка» ассоциируется у нас с географическим названием Канарских островов. Орнитологи относят канарейку к семейству вьюрковых, объединяющему 468 видов птиц, которые группируются в 4 подсемейства: овсянковые, кардиналовые, дарвиновы вьюрки и настоящие вьюрковые. К последнему подсемейству принадлежит до 150 видов птиц, в том числе и канарейка. Размером дикие канарейки мельче птиц большинства пород домашних канареек, их длина не превышает 13 см. Окраска птиц неяркая. Верхняя часть тела пестрая, желтовато-зеленого цвета; лоб, брови, зашеек, горло и грудь золотисто-желтые с зеленоватым оттенком. Бока шеи пепельно-серые, брюшко и поясница желто-зеленые. Маховые перья темно-бурые с зелеными наружными опахалами, хвост темно-серый, почти черный со светлыми вершинами перьев. Самки окрашены более скромно, основной цвет оперения желто-зеленый, клюв и лапки серо-красные, глаза темно-карие.

Трудно теперь точно установить, когда канарейка впервые была привезена в Европу. Известно, что в 1395 году на Канарские острова высадились испанцы. Уже тогда они обнаружили этих птиц в бамбуковых клеточках у местного туземного населения. Канарейки так заинтересовали испанцев своим пением, что те начали ловить, держать их в клетках у себя на родине и даже установили монополию на право торговли этой птицей. Вскоре после этих событий португальцы начали осваивать ранее необитаемые Азорские острова. Здесь они также обратили внимание на невзрачных певуний, обладавших голосами редкой красоты. Продавая только самцов, испанцы искусственно поддерживали высокие цены на канареек. Птиц импортировали в Италию и другие страны. В то время их покупку могли себе позволить лишь очень состоятельные люди. Нередко канареек содержали в золотых или серебряных клеточках, украшенных драгоценными камнями. В середине XVI века итальянцы и другие европейцы стали успешно разводить канареек у себя дома. На рубеже XVI–XVII веков появились первые признаки одомашнивания этих птиц. В разных местах независимо друг от друга у обычных зеленых певуний стали появляться чисто-желтые птенцы. В это же время первые канарейки попали из Италии в Тироль. Именно в этой шахтерской местности Австрии образовалась первая порода певчих канареек, которая получила название «тирольская». Местные канароводы научились облагораживать песни своих

питомцев, применяя искусственный отбор и обучение птиц. В качестве учителей тирольцы использовали лучших местных певцов: соловья, славку-черноголовку, зяблика, коноплянку, жаворонка. Обучали молодых кенаров и мелодиям, наигранным на флейте или небольшом органчике, специально изготавливавшемся для этих целей. Постепенно удалось получить птиц, поющих не очень громко с закрытым клювом и низким тембром.

Большие успехи в выведении певчей породы канареек были достигнуты в Германии, в городе Гарце, где в XVIII столетии выведена так называемая гарцская канарейка, или гарцкий роллер. Его песня напоминала звучание органа и исполнялась с закрытым клювом. Разводят эту породу канареек в Германии и в наше время. Много поклонников гарцкого роллера насчитывается во всем мире, в том числе и в нашей стране, где он называется канарейкой дудочного напева.

Ну а что же произошло с тирольской канарейкой? Эта порода дала начало не только гарцскому роллеру, но и всем породам певчей канарейки, в том числе и русской овсяночного напева. Исключение, по-видимому, составляет только испанская певчая канарейка тимбрадос, выведенная еще в XV веке при скрещивании канарейки с канареечным вьюрком и не получившая широкого распространения. В течение 200 лет расселялась тирольская порода канареек по всему свету. Известный в XIX веке автор Карл Русс в своей книге о канарейках, изданной в 1860 году, сообщает: «... в Россию канарейка стала попадать в большом количестве, как и во все европейские страны, из Тироля, что на юге Германии или севере Италии». Сохранилась эта порода и до настоящего времени на западе Германии и называется саксонской канарейкой. В старину в России «тирольками» называли кенаров, имевших лесной произвольный напев.

Впервые упоминания о канарейке появились в 1555 году в «Естественной истории птиц» Конрада Гесмера. Первое же подробное описание жизни диких канареек мы встречаем в трудах известного натуралиста Карла Болле в 1885 году. Сравнивая пение диких и домашних канареек современных пород, мы приходим к выводу, что несмотря на наличие сходных элементов в их песне, дикая канарейка имеет жесткое, резкое, прерывистое пение высокого тембра. Большим сходством с песней дикой канарейки обладают породы тимбрадос и тирольская. Это свойство от последней перешло и к канарейкам, появившимся в России еще в XVIII веке.

Породы канареек

Пятисотлетняя история одомашнивания канарейки не прошла даром. В разных странах появилось множество пород и породных линий этих птиц. Их группируют в две крупные категории: певчие и декоративные канарейки. Наиболее древними считаются певчие канарейки, которых культивировали уже с XV–XVI вв. И несмотря на такую продолжительную историю их существования, человечество не может похвастаться большим количеством их пород в отличие от множества декоративных форм.

Певчие канарейки

Всемирной орнитологической конфедерацией (СОМ) зарегистрировано пока только три породы певчих канареек. К сожалению, русская канарейка овсяночного напева еще не получила признания в этой организации, как и некоторые другие аборигенные породы. Какие же породы вышли на международную арену? Испанская певчая канарейка – тимбрадос относится к одной из самых древних пород канареек и во многом сохранила черты своего дикого предка. Так, длина ее тела не превышает 13 см, окраской она также сходна с дикой канарейкой. В песне тимбрадос сохранилось много элементов от песни дикой канарейки. Что же касается истории происхождения породы, то здесь нет единого мнения среди любителей канареек. Одни считают, что порода появилась еще в XV веке в результате скрещивания канарейки, вывезенной с Канарских островов испанцами, с ее ближайшим родственником, населяющим леса Европы, – европейским канареечным вьюрком. Другие утверждают, что получена порода путем скрещивания гарцкого роллера с дикой канарейкой. В доказательство приводят факт, что тимбрадос поют с полуоткрытым клювом. А это является промежуточным признаком исходных родительских форм. Так это было или иначе, нам трудно судить за недостатком исторических материалов, однако с уверенностью скажем, что тимбрадос не является родоначальником других пород певчих канареек и представляет собой скорее местную – аборигенную породу. Международное признание как порода, тимбрадос получила в 1962 году – с регистрации в СОМ. Исходной породой, от которой удалось путем направленной селекции получить гарцкого роллера, была тирольская канарейка. В Германии она носит название саксонской канарейки, а в нашей стране ее называют канарейкой дудочного напева. Окрашена она в

зеленый, желтый или желто-пегий цвета. Во время пения у самцов вертикальная посадка. Почти все туры песни кенары поют с закрытым клювом. Особенно ценятся глухие низкие звуки. В песне бывает до 9 и более туров. Основные из них, за которые птицы на конкурсах получают наибольший балл (до 27): «глухой раскат», «кнорра» и «журчащий раскат». Второстепенные туры носят названия: «глухой колокольчик», «раскат колокольчика», «шокель», «клохтанье», «свистки», «колокольчик». Глухой раскат может быть ровным, с понижающимся, повышающимся и волнообразным звучанием. Его можно передать как «юророророр» или «уруруруруру». И чем ниже звучит это колено, тем больше оно ценится.

«Кнорра» – название звукоподражательное. Эта басовая трель звучит как «кнуррррр» или «кноррррр». Лучшие роллеры поют мягко и ровно, не издавая резких звуков и плавно переходя от одного колена к другому.

Бельгийская певчая канарейка – малинуа выведена в конце XIX века в окрестностях города Михельна. Ранее она носила название «фландрская малинуа». Канарейки эти славятся не только своей великолепной песней, которая по разнообразию колен превосходит роллера, но и красотой, стройностью и изяществом. Иногда любители называют малинуа золотыми канарейками за красивый желтый цвет оперения. Поют самцы как с закрытым, так и со слегка приоткрытым клювом. Стараниями любителей-селекционеров пение канареек стало более модулированным и насыщенным. В пении птиц особо различают мягкое и жесткое звучание, так же как у соловья. Именно поэтому малинуа получила и прозвище – канарейка-соловей. Бельгийские любители считают, что пение малинуа лучше пения соловья, а для пущей убедительности в грампластинках, посвященных этой породе, сначала воспроизводят песню настоящего соловья и лишь затем – малинуа. Различают до 12 колен в песне малинуа. Самые ценные среди них: журчание, бульканье и клокотание. Это так называемые водяные туры. И недаром бельгийцы их называют: гул воды – трель, состоящая из довольно четких звуков, идущих из глубины гортани и напоминающих шум бурлящей и вращающейся воды «влуи, блуи, клуи»; kloкочущая вода – колено, состоящее из менее отчетливых звуков, то больше, то меньше связанных между собой, и напоминающее игру или шум kloкочущей и струящейся воды; вращающаяся и плещущаяся вода, где слоги соединены в переходящие сочетания, благодаря чему постоянно слышится согласный «р» («яу-р, лу-р, лю-р»). В песню лучших самцов включены колена: кнорра, флейта и колокольчик, изредка – шокель. Заканчивается песня тремя коленами соловья. Особенно ценятся птицы, обладающие высоким, глубоким и благозвучным напевом. Эта порода

канареек была зарегистрирована СОМ в 1960 году.

Распространена также цветная канарейка, или цветной роллер. В послевоенное время в США и европейских странах началась работа по выведению певчей красной канарейки. Исходным материалом послужили красная цветная канарейка и гарцский роллер. Цветной роллер, предполагается, должен был сочетать особую привлекательность цветных канареек и песню, заслуживающую внимания опытных любителей-канароводов. Эта работа еще не закончена. Еще несколько местных пород культивируются в США, Франции, Италии и других странах. Так, итальянские любители работают над выведением новой породы певчей канарейки – фиуме и называют ее итальянским соловьем. В качестве исходных форм взяты гарцский роллер и малинуа. Полученных птиц обучают пению соловья.

Европейским любителям хорошо известна также французская певчая канарейка – смета. Этой породе, так же как и русской канарейке овсяночного напева, еще предстоит регистрация и СОМ. Фирмой звукозаписи «Мелодия» в 1973 году выпущена пластинка с песней канарейки смета. Ее автор – французский канаровод Жорж Альбуза. В песнях этих канареек поражают ваш слух необыкновенные голосовые возможности птиц. В содержании песни канарейки смета нетрудно угадать голоса многих болотных птиц, которые имитируются с какой-то особой выразительностью.

Вообще имитаторские способности канареек уникальны. Вспоминается удивительная пластинка с записью «говорящей» канарейки по кличке Пиши, принадлежавшей ленинградской любительнице И. Двужильной. Эта пластинка была также выпущена в 1973 году в виде приложения к книге А. Мальчевского, Э. Голонановой и Ю. Пукинского «Птицы перед магнитофоном и аппаратом». Кенар Пинчи, приученный своей хозяйкой брать пищу из рук, оказался очень способным в имитации высокого женского голоса.

Любительницей был удачно подобран по ритму и содержанию текст, который хорошо гармонировал с природными певческими возможностями канареек. Обучение кенара проходило в присутствии самки, возраст обеих птиц в начале этого процесса не более 2–3 месяцев. Среди большого набора слов выделялись целые фразы, которые произносились довольно четко: «пинчи-пинчи, брики-брики», «чудненькие птички, миленькие птички, вот какая птичка». Человеческие слова перемежались врожденными канареечными турами песни. От этого кенара было получено потомство, которое тоже умело имитировать отдельные слова, однако значительно

уступало в этой способности своему родителю.

Цветные канарейки

Большой интерес у любителей, особенно у тех, кто увлекается селекционной работой, вызывают цветные канарейки. В данном случае отбор идет только по признаку окраски оперения, и качество песни здесь не имеет значения. К настоящему-времени выведены около 500 цветовых вариаций канареек, но лишь около 100 из них можно встретить на выставках птиц. Дело в том, что остальные оттенки менее красочны и не столь ценимы специалистами.

Все многообразие цветов вызывается лишь двумя типами пигментов в оперении: меланинами и каротиноидами. Меланины, присутствуя в различных участках пера, придают ему окраску в спектре от песочно-желтого до красно-бурого и черного. Интенсивность окраски зависит от количества красящего пигмента. Ярко-желтая окраска обычно вызывается не меланином, а каротиноидами. Пегий окрас является следствием отсутствия меланинового пигмента на отдельных участках оперения. Полное отсутствие меланиновых пигментов в оперении птицы вызывает явление альбинизма. При этом глаза у канарейки красного цвета из-за того, что в отсутствие меланина на радужной оболочке просвечивают кровеносные сосуды глаза. Но встречаются и «красноглазые» птицы, у которых оперение окрашено в желтые цвета. Это происходит благодаря действию каротиноидов. Нередко таких птиц называют хромистами, или лютиносами. Каротиноиды носят и другое название – липохромы. Их присутствие обуславливает яркую окраску оперения. Это жирные красящие вещества, широко распространенные в различных растениях, откуда с пищей они и поступают в организм птицы. Кровью каротиноиды разносятся по всему организму, попадая и в перьевые сосочки, которые формируются накануне линьки оперения. Здесь каротиноиды кристаллизуются в роговидное перьевое вещество. Пигмент продолжает поступать в перо в период роста до его полного ороговения. Каротиноиды, в противоположность меланинам, очень неустойчивы к воздействиям внешней среды. Характер питания птиц может повлиять на замену каротиноидов меланинами или одного каротиноида другим. Обычно такое изменение и окраске оперения происходит во время линьки. Содержание в корме большого количества жирных семян (конопли, подсолнечника) может привести к потемнению оперения. Поэтому цветных канареек нужно кормить максимально разнообразно. Особенно это относится к красным канарейкам. В их рационе обязательно должны присутствовать морковь,

дробленая кукуруза красных сортов, красный сладкий болгарский перец, декапсулированная артемия. В зоомагазинах продается искусственный каротиновый премикс для канареек и других певчих птиц, имеющих в оперении красные цвета.

Дикие канарейки окрашены в желто-зеленые тона. Это происходит в результате смешения желтого липохрома с черным и коричневым меланинами. В результате генетических мутаций и направленной селекции у домашней канарейки появилось великое множество цветовых вариаций в окраске. Согласно международной классификации канарейки, в зависимости от наличия того или иного пигмента, подразделяются на два ряда: липохромовый и меланиновый.

Канарейки липохромового ряда должны быть однородными, без пятен. Это разных оттенков желтые, имеющие пигмент канареечный ксантофилл, белые (беспигментные), а также красные, оранжевые и розовые птицы, имеющие пигмент кантаксантин. Смешиваясь между собой, липохромовые цвета создают множество промежуточных оттенков. Окраска у помесей всегда ровная. Пользуясь направленным отбором и скрещиванием, основанным на законах генетики, можно закрепить в потомстве желаемую окраску. Так создавались все цветовые расы канареек. Но есть еще одна, правда менее значимая, группа, имеющая свои особенности в окраске оперения. Речь идет о структурной особенности оперения, которая дает эффект голубизны для серых птиц, обычную желтую канарейку превращает в лимонную, у красных канареек возрастает интенсивность окраса. Структурные особенности влияют на меланиновую группу птиц, липохромо-пастельный фактор модифицирует окраску каротиноидного пигмента. Все эти структурные факторы обусловлены наличием гена, отвечающего за данный признак. Они наследуются согласно законам генетики. Канарейки со светлым окрасом, которых относят к липохромовому ряду, отличаются белыми маховыми и рулевыми перьями. Лишь изредка на крупных перьях наблюдается узкая каротиноидная каемка. Мелкие контурные перья могут быть разных оттенков – от желтого до красного. От смешения желтых и красных пигментов получаются различные переходные окраски. Селекционеры-разводчики разделяют этот переход на пять самостоятельных цветовых классов. В отсутствие каротиноидного пигмента у канареек бывает белое оперение. Известны две породы канареек – немецкая и английская. У немецких белых канареек на сгибе крыла и маховых перьях слегка выступает желтый цвет. При разведении этих канареек часть потомства бывает желтой, а часть белой. Рекомендуется скрещивать белую немецкую канарейку с неяркими

желтыми, тогда потомство более жизнеспособно и в первом же поколении половина особей будет белой. По терминологии генетиков немецкая канарейка имеет доминантный аллель. Английская же белая имеет рецессивные гены и при разведении «в себе» дает только белых птиц, в оперении которых совершенно отсутствует желтизна. При скрещивании с желтыми в первом поколении получаются только желтые особи, несущие в своем генотипе признак белой окраски в скрытом виде. При дальнейшем их разведении во втором поколении появляются и белые особи (по количеству примерно 4-я часть всего потомства). Большой интерес представляет история выведения красной канарейки. Ведь долгое время селекционерам не удавалось получить красный цвет в оперении канареек. Это и не удивительно – ведь в исходном материале у дикой канарейки в генотипе отсутствовал ген, обеспечивающий красный цвет в оперении птиц и передаваемый по наследству. Это натолкнуло любителей на мысль скрестить обычную желтую канарейку с каким-либо родственным видом вьюрковых птиц, имеющим в оперении красные пигменты. Таким видом оказался красный колумбийский, или венесуэльский, чиж – *Spinus cucullatus*. Он обитает в лесах северной части Южной Америки – в Венесуэле, Колумбии, на островах Монос и Гаспари. Это очень маленькая птица, даже несколько меньше нашего чижа. Окрашена она в ярко-красный цвет, и лишь голова, рулевые и маховые перья черные. Венесуэльский чиж не является ближайшим родственником канарейки. Большинство орнитологов-систематиков относят его к другому роду птиц. И все же скрещивание увенчалось успехом – часть гибридного потомства оказалась плодовитой. Правда, самки и некоторые самцы из гибридов первого поколения все же были бесплодны. При дальнейшем (обратном) скрещивании плодовитых гибридов первого поколения с желтыми канарейками получены гибриды второго поколения, имевшие оранжевую (промежуточную) окраску. Вот они-то и явились тем ценнейшим генетическим материалом, который и послужил основой при выведении красных канареек. Проводился жесткий отбор производителей по интенсивности окраски, и в конце концов были выведены ярко-красные особи. От скрещивания красных канареек с другими цветовыми расами получены розовые, медные, коричнево-красные, оранжевые и другие формы цветных канареек. Известна и мозаичная окраска светлых канареек, иначе называемая диморфной, когда каротиноидная окраска проявляется лишь на определенных участках тела – полоска над глазами, сгиб крыла, хвост, отблеск на груди. Для точного определения цвета канареек пользуются сравнительными таблицами, такими, как таблица стандартов

Освальда, названная в честь Освальда Фарнборма. Так, кроме желтых канареек, различают и бледных птиц, более мощного сложения, с оперением более густым и как будто бы покрытым инеем. В разных странах их называют мучнистыми, или подмороженными, птицами.

Канарейки с темным окрасом, к которым относят птиц меланинового ряда, отличаются темными рулевыми и маховыми перьями, темным цветом ног, когтей и клюва. Меланиновый ряд разделяется на четыре цветовые группы: черную, коричневую, агатовую и изабелловую. В черной группе имеется пять цветовых классов, совмещающих каротиноиды с неразбавленными черными меланинами: зеленый, имеющий лимонный и золотистый оттенки; бронзовый с оранжево-желтым оттенком; медно-красный с оранжево-красным цветом; красно-черный с красным каротиноидом и синевато-серый при полном отсутствии каротиноидов. В последних публикациях французских разводчиков-селекционеров сообщается о выведении новых вариаций черных и сатиновых, или атласных, канареек.

У агатовых канареек черные меланины замещены своеобразными сероватыми и антрацитовыми меланинами. Микроскопические гранулы пигмента размещены в перье птиц с вдвое меньшей плотностью, поэтому говорят о разбавленных меланинах. По данным генетики, такие меланины сцеплены с полом и являются рецессивными по отношению к неразбавленным меланинам. Причем самцы могут носить ген активности в скрытом, гетерозиготном состоянии, тогда как самки всегда гомозиготны, поскольку имеют морфологически различные половые хромосомы (XY). Этим самки у птиц напоминают самцов млекопитающих. Для агатовых канареек характерны четкие отметки над глазом – светлая полоска и по бокам горла – темные полосы. Птицы, лишенные каротиноидов в оперении, называются серебристо-агатовыми.

Коричневые канарейки имеют неразбавленные коричневые меланины в оперении и в сочетании с каротиноидами разных цветов могут называться: желто-коричневыми, оранжево-коричневыми, красно-коричневыми и др. В то же время птиц, лишенных светлых пигментов (имеющих в основе белый цвет), называют серебристо-коричневыми. Изабелловые птицы имеют разбавленные коричневые пигменты, что выявляется в очень светлых коричнево-бежевых маховых и рулевых перьях. Темных изабелл нередко называют коричневыми, а светлых – палевыми. Общий цветовой эффект варьируется в зависимости от наличия тех или иных каротиноидов. Скрещивая изабелл с другими цветовыми расами канареек, удастся получить интересные цветовые вариации окраски, однако

слишком коричневые или серые птицы считаются в судейских оценках браком, поскольку неизменно являются продуктом скрещивания меланиновых групп. Получены и другие цветовые варианты у канареек – пастельные, слоновой кости и другие. Эксперименты по скрещиванию различных линий канареек могут привести к неожиданно интересным результатам. Нежелательно только скрещивать канареек меланинового ряда с птицами липохромового окраса. В результате получаются пятнистые особи, а признак пятнистости часто считается браком. Лишь опытные любители могут прогнозировать получение красивых, симметрично расположенных пятен, которые только украсят канарейку.

Декоративные канарейки

Эта категория канареек объединяет следующие породные группы: горбатые, курчавые, фигурные, хохлатые и расписные. Далее декоративные канарейки делятся на 21 выставочный класс и 6 подклассов. На выставках-конкурсах декоративных канареек каждый выставочный класс соревнуется только внутри себя. Но иногда из-за малого количества участников внутри каждого класса (менее 8 одиночных птиц и 7 – в коллекциях) создают смешанные группы классов, куда объединяют: 1) курчавые породы, 2) крупные породы, 3) мелкие породы. Это, правда, не всегда приветствуется любителями и судьями.

Группа горбатых канареек включает пять пород: бельгийскую, шотландскую, мюнхенскую, японскую и джибосо. Впервые горбатые канарейки были выведены в Бельгии. Это одни из самых крупных канареек, длина тела которых достигает 20–22 сантиметров. Поза, в которой канарейка пребывает, удивительна: тело птица держит практически вертикально, а шею выгибает под углом головой вниз. Канарейка как бы раскланивается с вами. Любители стараются усилить эту особенность породы тем, что ставят жердочки почти под самым потолком клетки, и птицы вынуждены еще больше пригибаться. Особенно высоко ценились горбатые канарейки в Бельгии со второй половины XIX века до 1914 года. Первая мировая война нанесла серьезный удар по канароводству в этой стране. В группу курчавых канареек в настоящее время входит восемь пород: парижский трубоч, северная курчавая, французская курчавая, швейцарская курчавая, итальянский джиббер (бормотушка), падуанская курчавая, миланская курчавая и фиорино, которая зарегистрирована СОМ в 1983 году.

Первые курчавые канарейки появились в Голландии в XVII веке. Это были довольно крупные птицы, имевшие слегка курчавые перья на груди.

Такая особенность канареек понравилась французам, к которым эти птицы попали на рубеже XVII–XVIII веков. С помощью искусственного отбора была выведена парижская курчавая канарейка, одна из самых крупных. Длина тела птиц достигает 20–22 см, а размах крыльев 30 см. Несмотря на такие размеры, парижская курчавая канарейка стройна и изящна. Контурное перо, покрывающее все тело птицы, неимоверно длинное и закручивается локонами в разные стороны. Курчавость распространяется и на оперение головы, когти – вывернутые. Тело она держит почти вертикально. Окраска бывает желтой, белой или пестрой. Песня сходна с песней беспородной домашней канарейки. Птенцов этой ценной породы подкладывают для выкармливания простым беспородным канарейкам, которые хорошо зарекомендовали себя в выращивании собственных детей.

Породы курчавых канареек, выведенные в Италии, более теплолюбивы. Птицы требуют тщательного ухода. В их зерновом рационе должно быть больше канареечного семени и проса и меньше рапса и льна. В летний период им нужно давать много зелени, особенно мокрицы. Главное отличие северной курчавой канарейки от парижской в том, что у нее курчавы лишь спина (плащ), бока (плавник) и грудь (корзинка), а остальное оперение гладкое. У южной – голландской (французской курчавой) канарейки маленькая головка, расположенная на длинной шее, которую птица держит опущенной вниз, чем сходна с горбатой канарейкой. Швейцарская курчавая, хотя и похожа на предыдущую, но держит тело полумесяцем – ее хвост заходит под жердочку. У итальянского джиббера (итальянская горбатая) голени не оперены, а вокруг глаз имеется голое кольцо, посадка же и остальное оперение, как у французской курчавой. К группе фигурных канареек относят шесть пород, из которых четыре – английские: бордер, мини-бордер, норвич-ская и йоркширская, а также швейцарская, или бернская, и испанская. Эти канарейки имеют узкие и сжатые перья, плотно прилегающие к телу, образующие ровную шелковистую поверхность. Экстерьер у них различен. Так, если йоркширская канарейка – стройная элегантная птичка, имеющая маленькую головку, укороченные шею и клюв, тонкое тело и длинный хвост, то норвичская – довольно крупная, коренастого телосложения птица с короткими ногами и хвостом, с округлой головой и компактной посадкой. Окраска их очень разнообразна: желтая, зеленая, белая, коричневая. Встречаются хохлатые особи у норвичских канареек, причем хохолок прикрывает глаза и клюв этих птиц. Расписных канареек объединяют в две породы: ящеричную, или лизард, и лондонскую. Большую ценность и интерес у любителей в нашей стране представляет порода лизард, что в

переводе с английского означает ящерица. Названа так эта маленькая, изящная канарейка потому, что на верхней стороне тела ее оперение имеет чешуйчатый рисунок. Каждое перышко окаймлено светлой полоской. Это главный признак породы, на который обращают внимание на выставках канареек. На голове большинства птиц светлая шапочка, подобная шапочке самца обыкновенной овсянки.

Известны две цветовые формы ящеричных канареек – серебристая и золотистая. Выведена также голубовато-серая канарейка. Особенно нарядна золотистая. Она имеет оранжевый оттенок. К сожалению, ящеричную окраску канарейки носят не всю жизнь. Она появляется только на втором году жизни и исчезает уже через три года. Лондонская канарейка относится к мелким птицам и также имеет изменяющуюся в течение жизни окраску. В ювенильном (юношеском) оперении у канареек преобладают зеленовато-бурые тона. Повзрослев, птицы надевают яркий, оранжево-желтый наряд. Их хвост и перья становятся черными. С возрастом эта окраска исчезает, и птицы вновь выглядят довольно скромно.

К группе хохлатых канареек относят четыре породы: глостерскую, цветную хохлатую, или немецкую, крестед и ланкаширскую. Глостерская – самая мелкая из домашних канареек. Ее длина не превышает 11 см. Она миниатюрнее дикой канарейки и почти такая же, как канареечный выюрок. Встречаются как с хохолком, так и без него. Причем хохолок по окраске значительно отличается от остального оперения. Он небольшой и глаз не прикрывает.

Ланкаширская порода считается самой крупной. Длина тела этих канареек достигает 22 см. И также известны две формы – с хохолком и без него. Хохолок у птиц очень большой, прикрывающий глаза. Несмотря на величину тела и крепость конституции, это одна из самых нежных пород, требующая тщательного ухода.

Не следует путать хохлатых декоративных канареек с певчими канарейками и птицами других породных групп, имеющими хохолки. К сожалению, в настоящее время у любителей в нашей стране декоративные канарейки встречаются редко.

Выбор канарейки

Перед тем, как приобрести птицу, необходимо оценить все положительные и отрицательные стороны этого решения. В первую очередь следует убедиться в том, что вы действительно готовы на протяжении 10–15 лет посвящать часть свободного времени заботам о птице. Конечно, канарейки – довольно неприхотливые создания, однако это вовсе не означает, что за ними необязательно ухаживать.

Людам, чья работа связана с длительными командировками, пожалуй, не следует заводить канареек. Если оставить птицу в одиночестве более чем на 2 суток, она сильно затоскует, перестанет петь, а возможно, даже погибнет.

Известно, что канарейки обладают очень высокой чувствительностью к ядовитым газам и погибают даже при малой их концентрации в воздухе. Еще в древности гарцские рудокопы брали клетки с птицами в шахты, используя их в качестве своеобразных индикаторов рудного газа.

Содержание канарейки едва ли можно назвать дорогостоящим хобби, и тем не менее ее потенциальный владелец должен быть достаточно материально обеспечен. Не стоит забывать, что в случае болезни птицы вам придется оплатить услуги ветеринара.

Также важно помнить о том, что для полноценной жизни канарейке требуется определенное пространство, и в квартире должно быть достаточно места для того, чтобы разместить большую клетку. Кроме того, время от времени нужно давать птичке возможность полетать по комнате, а значит, вам придется смириться с тем, что в некоторых местах она будет оставлять свой помет.

Владельцам домашних животных, которые могут представлять опасность для канарейки, также следует тщательно обдумать свое решение. Приучить собаку терпимо относиться к птичке довольно нетрудно, но подавить охотничий инстинкт кошки практически невозможно.

Перед приобретением канарейки необходимо выяснить, не страдает ли кто-либо из членов семьи аллергией на птичьи перья. Разумеется, наличие любых симптомов этого заболевания исключает возможность содержания птицы.

После того как вы окончательно убедитесь, что действительно можете позволить себе завести канарейку, целесообразно подумать о том, где ее купить. Большинство любителей предпочитают обращаться в зоомагазины.

Там представлен богатый выбор не только птиц, но также клеток и всевозможных аксессуаров. Это, пожалуй, оптимальный вариант для тех, кто не имеет достаточного опыта в области канароводства, поскольку квалифицированный продавец обязательно посвятит покупателя во все тонкости, связанные с содержанием птиц. Однако, помимо этих преимуществ, зоомагазины имеют и некоторые недостатки. Дело в том, что даже самый опытный специалист вряд ли сможет предсказать вокальные данные молодого кенара, если он не занимался целенаправленной селекцией.

Если есть возможность, лучше купить канарейку у профессионального заводчика. Эти люди знают о своих птицах абсолютно все и, как правило, охотно предоставляют покупателям все необходимые сведения. Адреса и телефоны канароводов можно узнать в любом селекционном объединении (при условии, что они имеются в вашем городе).

Нежелательно покупать канарейку на птичьем рынке. Вероятность приобрести певца-виртуоза в этом случае снижается до минимума, зато значительно возрастает риск стать обладателем нежизнеспособной птицы, страдающей какими-либо заболеваниями или генетическими пороками.

Большинство людей заводят канареек исключительно ради их пения. Однако ожидания далеко не всегда оправдываются: насильно заставить птицу исполнять трели подчас бывает крайне сложно. Кроме того, во время и после линьки многие кенары вовсе перестают петь. Очень важно подготовиться к такого рода проблемам, чтобы впоследствии разочарование не повлияло на ваше отношение к птице.

Канарейки не относятся к числу птиц, сильно привязывающихся к человеку (в отличие, к примеру, от длиннохвостых попугаев). Тем не менее известны случаи, когда они проникались безграничным доверием к хозяевам и очень тосковали в их отсутствие.

Как уже неоднократно говорилось, многие любители предпочитают певчих птиц, но не исключено, что кому-то больше понравятся цветные или декоративные канарейки. Как бы то ни было, выбор той или иной разновидности – прежде всего дело вкуса.

Значительно важнее вопрос о том, каким должен быть пол вашего будущего питомца. Если вам нужен певец, без малейших колебаний приобретайте кенара. Самки, конечно, тоже могут петь, но до самцов им далеко. Голосовые данные кенаров намного богаче, разнообразнее и совершеннее. Если же пение не является для вас главным, половая принадлежность канарейки не имеет значения, поскольку в остальном и самцы и самки практически одинаковы.

Определить пол птицы, особенно если она совсем молодая, довольно непросто. Самцы и самки не различаются по внешнему виду, и выявить половую принадлежность канарейки позволяет только пение. В любом случае ответить на этот вопрос вам поможет продавец или заводчик.

Нередко будущие владельцы канареек предпочитают покупать сразу двух или нескольких птиц. Такое решение является оптимальным (конечно, при условии, что в вашей квартире достаточно места, ведь им потребуется более просторная клетка). Дело в том, что канарейки, как и большинство других живых существ, нуждаются в общении, и лучшая компания для них – общество соплеменников.

Можно содержать вместе как птиц одного пола, так и разнополых особей (последний вариант наиболее подходит тем, кто собирается заняться разведением). В любом случае они будут прекрасно ладить между собой, поскольку канарейки – создания спокойные и миролюбивые. Как правило, они хорошо уживаются не только с представителями своего вида, но и с другими пернатыми. Однако не следует поселять канареек в одну клетку с птицами, значительно превосходящими их по размеру (например, с крупными попугаями), поскольку это может привести к нежелательным последствиям.

Многие опасаются, что совместное содержание самца и самки отрицательно скажется на музыкальных способностях кенара. Отчасти это действительно так, ведь при этом у него не будет необходимости привлекать самку пением. Тем не менее в период высиживания потомства певец, без сомнения, вознаградит вас богатством репертуара и мастерством исполнения своих лучших трелей.

Приобретение одиночки является оправданным только при условии, что вы имеете возможность проводить с ней все свое время. Птичка, лишенная общества себе подобных, не заскучает лишь в том случае, если в течение всего дня хозяин будет разговаривать и играть с ней.

Лучше всего покупать канарейку в возрасте 4–5 месяцев, поскольку в это время большинство птенцов уже успевает пережить первую линьку. Идеальное время для приобретения птицы – осень, когда заводчики обычно начинают продавать молодняк. В сентябре – октябре следует покупать цветных и декоративных канареек. Однако тем, кто рассчитывает обзавестись домашним певцом, рекомендуется подождать до декабря. К этому моменту голос кенара достаточно окрепнет после первой линьки. Кроме того, к декабрю птицы, как правило, в совершенстве осваивают искусство вокала (ведь оно передается не только по наследству, но и посредством обучения).

Некоторые полагают, что канарейки поют во весь голос, выражая тем самым свою радость. В какой-то степени это верно, ведь если птица заскучает или заболит, она будет упорно хранить молчание. Однако полностью отождествлять их с людьми все же не стоит, так как пение канареек обусловлено ни чем иным, как инстинктом. Человеку, не имеющему достаточного опыта в области канароводства, при выборе птицы желательно обратиться к знатоку, особенно в том случае, если он желает приобрести певчего кенара. Не стоит сразу покупать канарейку, даже если она вам очень понравилась. Сначала нужно некоторое время понаблюдать за птицами и послушать их пение.

Приобретая канарейку, обратите внимание на ее внешний вид и поведение. Здоровые птицы обычно веселы и подвижны. Однако, если канарейка сидит на жердочке нахохлившись и не проявляет активности, это далеко не всегда означает, что она больна. Возможно, птица просто спит. Чтобы убедиться в этом, взгляните на нее немного позднее.

Выбрав понравившуюся особь, обязательно поинтересуйтесь у продавца или заводчика, привыкла ли птица находиться в обществе людей. Если канарейка жила в птичнике (просторной клетке, предоставляющей относительную свободу передвижения), скорее всего, она редко общалась с хозяином, а значит, ей будет несколько сложнее приспособиться к новой обстановке. Такой птице на первых порах следует уделять как можно больше внимания.

Целесообразно также взять у продавца немного корма, к которому привыкла канарейка. Это значительно облегчит птице адаптацию к непривычным условиям.

Покупать канарейку следует утром, чтобы до наступления темноты она успела привыкнуть к новому хозяину и жилищу. При этом нужно заблаговременно купить или изготовить подходящую клетку и запастись всеми необходимыми аксессуарами.

Содержание канареек

Вначале следует подумать о месте для размещения канареек, ведь вопрос о свободном пространстве рано или поздно встанет перед вами со всей остротой. Наличие хотя бы двух углов в различных комнатах позволит не только объединить лучших и способнейших певцов в «школу», но и умело рассредоточить и изолировать канареек друг от друга, так как избыток птиц в одном месте может существенно повлиять на качество формируемой песни.

Перед приобретением канареек необходимо запастись клетками трех типов, о которых скажем в следующей главе, полками и стеллажами для них или специальными птичьими шкафчиками с изолированными ячейками. Последние нужны для успешного обучения молодых кенаров пению. Лучше, если пролетные и разводные клетки будут изготовлены из металла или пластмассы, что облегчает их уборку, а клетки для одиночного содержания кенаров – из твердых пород дерева: бука, дуба и пр. Хороши одиночные шкафчики, которые позволяют переносить в процессе обучения молодую птицу в любое место. Необходимо и всевозможное оборудование клеток, без которого непросто будет содержать пернатых домочадцев. Крайне важно приобрести качественных птиц. Это достигается покупкой их только у известных разводчиков, где птицы обладают устоявшимся напевом (ходом). Лучше приобретать потомство от канареек, выставлявшихся на конкурсы и получивших там хорошие оценки. Решая все эти проблемы, начинающему любителю не избежать материальных затрат, порой значительных. К этому надо быть готовым.

Приобретать нужно не менее двух кенаров, лучше, если они будут одного хода песни. Нет никакой гарантии в получении потомства от одного самца, поскольку на способность к размножению сильно влияет режим затемнения, который используют любители певчих канареек. Для разведения необходимо приобретать на одного самца 2–3 самок. Их лучше брать в других хозяйствах, но они должны относиться к тому же типу (ходу) песни. Для этого предварительно прослушивают их отцов, братьев. А если они уже размножились, то и потомство. Позывки у самок должны быть нежные, а самки, пытающиеся петь в процессе размножения, нежелательны. Исключение составляют лишь те, которые воспроизводят в чистоте отдельные фрагменты песни, а лучше – запевку.

В старину у канароводов был обычай: перед размножением самок

канареек «выгоняли на песню»: допускали к размножению птиц не моложе 1,5 года, что часто побуждало их к воспроизведению песни. Таким образом получали ценную информацию о наследовании певческих признаков.

Начиная выводить певчих канареек, любитель не должен надеяться на то, что все пойдет само собой после того, как он однажды наладит свое хозяйство. Содержание, разведение и обучение канареек – непрерывный процесс, требующий постоянных затрат. Иначе и не поддержать в хорошем состоянии приобретенных певчих птиц.

Важным фактором в канароводстве является правильное кормление птиц. Только наличие качественного и разнообразного корма обеспечит здоровье питомцев и успех вашего предприятия. Для корма также потребуется отдельное место, лучше не хранить его в комнате с птицами. Хорошо, если он находится в прохладном, темном и сухом помещении или на балконе в герметически закупоренных банках либо в полотняных мешках с двойным швом и двойной завязкой. Перед закладкой на хранение зерновой корм перебирают и просушивают. Перед подачей птицам зерно с вечера промывают и сушат на бумаге или материи. Нежелательно заготавливать зерно на длительный срок, превышающий 1–1,5 года, лучше брать его из нового урожая. Чтобы преуспеть в нелегком деле канароводства, начинающий любитель должен обладать большой любознательностью, уметь многое делать своими руками, постоянно совершенствоваться, общаясь со многими любителями не только канареек, но и диких певчих птиц. Любителю певчих канареек необходимо обладать музыкальным слухом и хорошим вкусом и постоянно развивать в себе эти способности, интересоваться музыкой. Желательно научиться узнавать и природных птиц по голосам. Существенно поможет в этом содержание некоторых из них в домашних условиях, ведь только содержание и уход за певчими птицами дают возможность проникнуть в сущность их весьма разнообразных песен. Во многих крупных городах созданы клубы любителей птиц, где можно получить различную информацию о канарейках. Много полезного можно узнать, бывая на выставках птиц. Но самые интересные сведения можно почерпнуть на конкурсах певчих канареек.

Многовековая история одомашнивания канареек не прошла даром. Из диких и капризных к условиям содержания птиц они превратились в неприхотливых созданий, неплохо чувствующих себя в различных по объему помещениях, нетребовательных к кормам, при этом птицы почти всегда поют и хорошо размножаются. Это, конечно, не значит, что канареек можно содержать без должного к ним внимания. За проявленную заботу

они оплатят сторицей. Вы получите истинное удовольствие от общения с хорошо сложенной, чистой, подвижной птицей. Самцы будут петь большую часть года, исключая период линьки оперения, а во время гнездования от пары канареек можно получить целую компанию чудесных птенцов.

Какие же клетки нужны канарейкам? Это зависит от цели любителя. Взрослых и молодых обучающихся песне кенаров содержат в небольших клетках длиной 40–45 см, шириной 25 см и высотой 30 см. Для разведения канареек используют клетку большего размера: 70х25х30 см. Опыт содержания большого количества птиц на ограниченной территории показал, что минимальные размеры клеток, в которых птицы чувствуют себя хорошо, могут быть следующими: для одиночного содержания певчих кенаров – 32х16х 4 см, а для совместного – 50х25х30 см. Самок вне периода гнездования и молодых птиц лучше содержать в просторном садке длиной 80-100 см или вольере. Здесь у птиц разовьются полетные мышцы, успешнее пройдет линька оперения. Самок, в отличие от самцов, можно селить по несколько особей вместе. При строительстве вольера нежелательно использовать сетку рабицу, поскольку в ее переплетениях птицы часто оставляют свои коготки и ломают пальцы. Лучше пользоваться паяными (звероводческими) сетками.

Более практичны клетки прямоугольные, без сферического купола и архитектурных излишеств. Используются и клетки ящичного типа. В них сеткой или прутьями закрыта лишь одна сторона, а остальные сделаны из дерева, пластмассы, металла, оргстекла или другого материала. Такие клетки легко затенять шторками из плотной материи, создавая необходимый для каждого сезона световой день (фотопериод). Независимо от типа клетки, в каждой из них должно быть не менее двух дверок. На одну навешивается купал-ка или гнездовая клеточка, а через другую можно производить уборку клетки и кормление птиц.

Необходимо следующее оборудование клеток. Жердочек должно быть не менее двух и желательно располагать их на разных уровнях. Прыгая с жердочки на жердочку, птица лучше развивает мышцы ног.

В больших клетках между жердочками должно быть такое расстояние, при котором канарейка сможет взмахнуть крыльями, что также способствует лучшему развитию птицы. Толщина жердочек 1–1,5 см, и лучше, если они сделаны из лещины, черемухи или ивы, а в сечении – овальные. Кормушек должно быть не менее трех: для зерновых, мягких и минеральных кормов. Они могут быть изготовлены из дерева, пластмассы, керамики или стекла.

Канарейки любят купаться, поэтому им необходима купалка, лучше подвесная, а в вольер можно ставить и ванночку с водой. Глубина воды в купалке не должна быть больше 2 см. Поскольку вода в купалке быстро загрязняется, нужны еще и поилки с чистой водой. Лучше использовать стеклянные или пластмассовые автопоилки, которые прикрепляются снаружи клетки, а носик поилки просовывается между прутьями вблизи жердочки.

На выдвигающийся поддон насыпают тонким слоем песок либо кладут лист гигроскопичной бумаги. Заменять песок и бумагу следует не реже двух раз в неделю.

Кормление канареек не представляет больших трудностей, так как птицы относятся к числу зерноядных и не требуют разведения мучных червей или специального сбора муравьиных яиц. Основным кормом является зерносмесь, которую готовят по разным рецептам.

Мы рекомендуем следующий ее состав:

10 проса (белого, желтого или красного), 20 – канареечного семени, 40 – рапса или сурепки, 10 – салата, 10 – овсянки, по 5 % конопли и подсолнечника. К этой смеси в небольших количествах хорошо добавлять семена льна, одуванчика, подорожника, репейника, салата, мака, различных дикорастущих трав. Особенно охотно птицы съедают семена конопли и мака. Но их надо давать понемногу, так как мак действует на кишечник закрепляюще и может вызвать запор, а конопля способствует ожирению и нарушению обмена веществ. Коноплю желательно предварительно ошпарить кипятком.

Для того чтобы канарейки поедали весь предложенный им корм, а не выбирали особенно любимые компоненты и при этом не жирели, нужно строго соблюдать его суточную норму. Ожирение может привести к потере способности размножаться. В среднем на одну птицу полагается ежедневно по 1–1,5 чайной ложки зерносмеси. Норма эта может несколько изменяться в зависимости от породы и физиологического состояния птиц. Так, в период линьки норму следует увеличить, поскольку у птиц наступает явление гиперфагии, то есть большого потребления пищи, необходимой для образования нового оперения. В это время ожирения не может произойти. Наиболее крупным экземплярам (породы ланкаширская, северная курчавая канарейка и другие) дают ежедневно по 1,5–2 чайных ложки корма, а певчим, большинству цветных и беспородным канарейкам предлагают по одной. В садках и вольерах, где птицы могут активно двигаться и даже летать, норма может быть увеличена. Но в тесных одиночных клеточках ее нужно строго соблюдать. Следует также помнить,

что биоэнергетический обмен у мелких птиц очень высок, поэтому их нельзя оставлять без корма в дневное время даже на 1–2 часа.

Помимо зернового, канарейкам необходим мягкий и зеленый корм – источник большинства витаминов. В равных частях берут морковь и куриные яйца. Морковь натирают на мелкой или крупной терке, добавляя в нее немного растолченного белого сухаря. Затем сваренное вкрутую и размятое вилкой куриное яйцо смешивают с морковью. Сюда же добавляют 1/3 часть мелко порубленных листьев одуванчика, салата, подорожника или мокрицы и немного (1 чайную ложку на литровую банку корма) молочной смеси типа «Малютка», а также растительного масла (1 столовую ложку на литр корма). Вне периода гнездования мягкий корм дают через день, а в период выкармливания птенцов и линьки – ежедневно.

Его заготавливают впрок на 1–2 дня и хранят в холодильнике. Периодически канарейкам можно давать и круто сваренные каши: пшеничную, рисовую, гречневую. Можно делать смесь из перечисленных круп в пропорции 3:1:1. Каши хорошо чередовать с мягким кормом, но можно и смешивать с ним. В период выкармливания птенцов доля куриного яйца в мягком корме должна быть довольно большой – не менее половины объема. Во время гнездования, линьки, а также зимой полезно давать птицам пророщенные семена проса и канареечника, чередуя их с сухим кормом. Летом и осенью канарейкам можно предлагать незрелые семена подорожника, одуванчика, мокрицы, пастушьей сумки, репейника.

Хорошим источником витаминов и каротина являются различные овощи и фрукты. Их нарезают ломтиками и укрепляют между прутьями клетки около жердочки либо в специальных подвесных кормушках. Как и другие птицы, канарейки нуждаются в минеральных кормах. Они должны постоянно находиться в отдельной кормушке. К ним относятся толченая яичная скорлупа (ошпаренная кипятком или сваренная), мел, древесный уголь, размятые таблетки глицерофосфата или глюконата кальция. Для хорошего пищеварения птицам необходим тщательно промытый речной песок. Если песка нет на поддоне, его насыпают в отдельную кормушку. Дополнением к минеральной подкормке может служить негазированная минеральная вода. Минеральную воду можно чередовать с обычной водопроводной, которую отстаивают в течение суток.

Утром у птиц заменяют воду и корм, при этом мягкий корм в тепле может быстро портиться и его заменяют дважды в день. Это необходимо делать во избежание кишечных заболеваний, причиной которых может быть прокисший мягкий корм. Для сохранения корма от прокисания в него добавляют консерванты, такие, как цветочная или березовая пыльца,

последнюю подают прямо с сережками. Птицам нужны также витамины, микроэлементы и другие минеральные компоненты.

Некоторые любители диких птиц в качестве консервантов применяют хвойную муку. В зимний период в мягкий корм добавляют травяную муку, которую изготавливают следующим образом. Летом заготавливают и сушат листья одуванчика, подорожника, крапивы или кипрея (иван-чая), а перед употреблением измельченными добавляют в мягкий корм. При замене корма и воды нужно быть осторожным, не делать резких движений. С птицами в это время разговаривают спокойным, ровным голосом: как показал опыт, пернатые домочадцы успокаиваются и не бьются о прутья клетки. Это особенно важно в период гнездования, чтобы самка не сошла с гнезда, а сойдя, быстро туда вернулась.

Клетки с канарейками желательно устанавливать в светлом месте, где нет сквозняков, а прямые солнечные лучи попадают в помещение для птиц хотя бы на непродолжительное время. Летом клетки можно выставлять на балкон или подвешивать за окно. При этом жердочка должна быть обязательно затенена от солнца, чтобы птицы не перегрелись. Солнечные лучи необходимы им для хорошего самочувствия. Но все это можно рекомендовать с оговоркой относительно элитных птиц певчих пород и молодых самцов, проходящих обучение пению. Они не должны слышать чириканья воробьев и песни других пернатых с улицы, которые могут повлиять на качество песни. Канарейки, выставляемые на балконе или в саду, должны быть предохранены от хищных птиц специальным ограждением.

Не менее важно при содержании и разведении канареек соблюдать световой режим. Длина светового дня влияет на громкость и качество пения самцов, готовность птиц к размножению, начало и конец линьки. Дикие канарейки живут в широтах, где продолжительность светового дня летом и зимой почти одинакова. Но даже эти незначительные, на наш взгляд, колебания фиксируют чувствительные клетки мозга, которые регулируют количество гормонов в крови, отвечающих за различные стадии годового цикла птицы. В январе – феврале происходит распев самцов. В это время в средней полосе России самый короткий световой день. Для канареек его нужно увеличить с помощью подсветки до 13–14 часов. В марте, когда птиц уже можно отсаживать на размножение, световой день должен быть не менее 15–16 часов.

В июне – июле завершается размножение канареек, и световой день необходимо уменьшать. Сложный период в жизни птицы – линька оперения. В это время происходит перестройка организма. Как показали

многочисленные эксперименты орнитологов, произведенные на разных воробьиных птицах, линька проходит в более сжатые сроки, если световой день уменьшен до 8–9 часов. В это время птицы перестают петь, много едят, им нужны богатые минеральными веществами и витаминами корма. Короткий день, если он идет после длинного, может вызвать линьку птицы. Это особенно важно при длительном отсутствии линьки, когда у птицы выпало оперение и появились голые участки кожи. В целом весь период линьки занимает около 3 месяцев. У молодых птиц юношеский (ювенильный) наряд начинает сменяться на взрослое оперение уже в 1,5-2-месячном возрасте. Но эта линька, носящая название постювенильной, у них частичная, то есть меняются лишь мелкие контурные перья, а крупные – полетные и рулевые – остаются прежними. У взрослых птиц осенняя линька полная. При правильном содержании и строгом соблюдении светового режима канарейки линяют только раз в году.

Транспортируют канареек в небольших клеточках. Лучшими являются специальные транспортные клеточки размером 15x7x10 см. Они изготавливаются в виде глухого ящичка с одной решетчатой стенкой, она же служит и дверкой. В ней можно установить одну жердочку. Обязательными условиями для транспортировки птиц являются достаточное количество воздуха, темнота, тепло в зимнее время и ограниченность пространства. Ни в каком случае нельзя перевозить птиц в просторных клетках, предназначенных для их постоянного содержания, – в отдельных случаях птички могут разбиться о прутья клетки, получить тяжелую травму. Следует помнить также, что время перевозки в дневное время без корма не должно превышать 2–3 часов. Но приходится перевозить птиц по нескольку дней, тогда применяют специальную клетку ящичного типа, больших размеров, где можно установить кормушку и поилку. Иногда необходима бывает проверка физиологического состояния птицы – наличие и интенсивность линьки, упитанность. Для этого канарейку осторожно берут в руку, фиксируя ее голову между указательным и средним пальцами, переворачивают вверх брюшком и слегка дуют в область брюшной аптерии – место, не покрытое пером. При линьке хорошо видны пеньки или кисточки не раскрывшихся еще перьев. В то же время на брюшке почти отсутствуют прожилки подкожного жира. В другое время года жир может закрывать аптерию до половины. Аптерия, полностью закрытая жиром, – признак ожирения. В этом случае нужно сократить количество мягких и жирных, но увеличить количество зеленых кормов. Неплохо пересадить канарейку в более просторное помещение. Некоторые любители выпускают своих питомцев полетать по комнате. Это

можно позволить только спокойным или ручным птицам. Они сами покидают клетку, а затем возвращаются обратно. Но в это время нужно следить, чтобы канарейка не попала в беду, не покалечилась, не вылетела случайно на улицу. Птицу нельзя оставлять без присмотра. Лучше и надежнее – не выпускать птиц из клетки, создав им оптимальные условия существования.

Любителям канареек необходимо знать, что пойманные и взятые в руку птицы приходят в состояние стресса, в результате чего некоторые из них даже погибают, особенно это относится к старым птицам. Лучше переносят стресс канарейки, которым предварительно дали сладкую воду (глюкозу или разведенный в кипяченой воде сахар).

Как научить кенара петь

Самцы канареек обладают уникальными голосовыми данными. Они искусно подражают пению других птиц, имитируют человеческую речь и воспроизводят музыкальные фразы, а подчас даже целые мелодии. Некоторые кенары певчих пород являются, настоящими виртуозами в этой области.

В результате тщательной селекционной работы, проводившейся на протяжении многих лет, природные способности канареек были значительно усовершенствованы. Представители многих пород, в частности гарцской, обладают определенной генетически закрепленной песней, передающейся по наследству из поколения в поколение. Она состоит из нескольких туров, или колеи, которые нередко исполняются в особой, строго установленной последовательности (такие птицы ценятся наиболее высоко).

Однако песня канарейки передается не только по наследству, но и через воспитание. Птица может иметь прекрасную наследственность, но для того, чтобы стать первоклассным певцом, способным безупречно исполнять соответствующую стандарту породы песню, ей необходимо пройти длительный курс обучения.

В различные периоды истории канароводства для этого применялись разные средства.

Так, в XIX веке широко использовались особые музыкальные инструменты, так называемые птичьи органчики, созданные специально для обучения канареек. В наши дни канароводы, разумеется, отказались от этого способа, поскольку благодаря развитию техники появилась возможность заменить органчики магнитофонными записями пения кенаров-виртуозов и лесных птиц с лучшими голосовыми данными.

Способности к обучению у различных птиц неодинаковы и зависят в первую очередь от происхождения. К примеру, практически невозможно научить петь канареек-метисов, потомков представителей, разных пород. При этом птенцы признанных мастеров пения, как правило, отличаются великолепными вокальными данными.

Однако, вне всякого сомнения, идеальными учителями являются живые кенары-певцы, причем обязательно той же породы, что и обучаемые птицы. Конечно, чем совершеннее песня кенара-учителя, тем лучшего результата можно добиться. Но мастера, чье пение поистине

безукоризненно – большая редкость, и отыскать такую птицу весьма непросто, особенно для начинающего канаровода. В связи с этим вполне можно использовать для обучения молодняка самцов, имеющих незначительные погрешности в пении.

Ведущие немецкие канароводы, которые в течение многих лет занимаются воспитанием певчих канареек, в своей работе придерживаются важного правила. Оно заключается в том, что в песнях учеников и учителей обязательно должны преобладать одни и те же туры.

Уже давно было замечено, что лучше всего молодые самцы воспринимают песню своего отца. Тем не менее при наличии в ней ярко выраженных дефектов целесообразнее использовать другую птицу. Но бывает и так, что найти подходящего учителя невозможно. В таких случаях опытные канароводы советуют вовсе прекратить попытки обучить молодняка пению. Птицы с хорошей наследственностью вполне способны «сочинить» песню самостоятельно. Естественно, кенары-самоучки ценятся не так высоко, как прекрасно выученные птицы, но все-таки намного выше, чем самцы, перенявшие пороки плохого учителя. К тому же неправильно обученные кенары сильно ухудшают генетическую базу, поскольку все присущие им недостатки пения передаются последующим поколениям.

Общеизвестно, что способности к обучению в наибольшей степени развиты у молодых птиц. Начинать воспитание следует в конце сентября, когда у птенцов закончится первая линька. Предварительно необходимо отделить самцов от самок (обычно в этом возрасте половые различия уже заметны) и внимательно осмотреть каждого кенара, чтобы определить его физическое состояние. Истощенных или, наоборот, ожиревших птенцов не рекомендуется допускать к обучению.

Каждого самца следует поместить в одиночную клетку, а затем расставить их на открытых полках. Считается, что первое время молодые кенары должны видеть друг друга: это помогает им адаптироваться к непривычной обстановке.

На верхнюю полку нужно поместить клетку с учителем и с птенцами первого выводка, которые раньше остальных начинают распеваться. Под ними рекомендуется расставить клетки с молодым последующих выводков. Через несколько дней между клетками следует установить тонкие перегородки из картона, поскольку, если птицы не видят друг друга, их поведение становится более уравновешенным, а песня – долгой и ровной.

Молодые кенары намного лучше воспринимают песню учителя, находясь в немного затемненном помещении. В этом случае птиц ничто не

отвлекает, они легко усваивают все необходимые навыки. Ни в коем случае нельзя содержать в одной комнате с молодняком взрослых особей, особенно разнополых. Также птенцы не должны слышать пения других птиц, поскольку они могут перенять от них серьезные недостатки, которые впоследствии будет очень сложно искоренить. Важно помнить о том, что любые посторонние звуки оказывают негативное влияние на результат обучения. Правда, иногда разрешается содержать вместе с молодыми самцами синиц и овсянок: пение этих птиц обогатит репертуар кенаров новыми мелодичными трелями.


Канаровод должен ежедневно наблюдать за процессом обучения. Если в пении молодых кенаров обнаруживаются резкие и громкие трели, необходимо усилить затемнение. Примерно через месяц в напевах самцов проявятся различия, однако новичок может их и не заметить. Поэтому для прослушивания птиц рекомендуется пригласить опытного специалиста.

Каждого кенара нужно прослушивать отдельно от остальных, поочередно вынося клетки в другую комнату. На основании сделанных наблюдений следует изменить порядок расположения клеток таким образом, чтобы птицы с каким-либо определенным типом напева помещались отдельно от тех, что исполняют другой набор колен. Благодаря этому в каждой группе кенаров достигается идеальная слаженность. Клетки с лучшими певцами полагается устанавливать на верхние полки. Многие канароводы считают метод затемнения неприемлемым, поскольку птицам очень тяжело жить без света и свежего воздуха. Они утверждают, что при открытом методе обучения песня канареек становится ничуть не хуже, чем при закрытом.

Некоторое время спустя каждая птица вполне освоит навыки вокала и сформирует собственную песню. Для того чтобы ее закрепить, рекомендуется возобновить затемнение. Клетки с кенарами следует поместить в специальный шкафчик с ячейками и окошками из матового стекла. Также можно просто накрыть их неплотной материей.

Применяя такой метод обучения, необходимо принимать определенные меры предосторожности. Ни в коем случае нельзя ради качества исполнения песни жертвовать здоровьем птиц. Канарейки должны ежедневно получать достаточное количество свежего воздуха и дневного света, не говоря уже о полноценном питании. Несколько раз в день нужно снимать затемнение, а на ночь обязательно открывать дверцы шкафчика. При правильном обучении песня кенаров окончательно формируется к 8 месяцам. Когда это произойдет, уже не будет необходимости затемнять помещение, где содержатся самцы, и оберегать их от «влияния» других


птиц. Однако после линьки многие кенары временно «теряют песню», и в этот период следует проявлять особую бдительность, поскольку такие птицы легко воспринимают чужие недостатки.



Русская канарейка




Бельгийская горбатая канарейка



Зелено-пестрая канарейка




Красная канарейка




Канарейка с оранжевым оперением



Пестрый голубой метис




Белая канарейка с пигментами



Пестро-палевая канарейка



Курчавая канарейка



Нервическая канарейка



Хохлатая канарейка

Попугаи

Волнистые попугайчики

Среди птиц, содержащихся в неволе, пожалуй, нет более популярного и любимого существа, чем волнистый попугайчик. Действительно, ведь у этой птички масса преимуществ: она живет до 15 лет, содержание ее недорого, во время вашего отпуска ее несложно отдать на попечение другим членам семьи или друзьям, она не производит шума и даже старается установить контакт со своим хозяином. Кроме того, для содержания этого маленького попугайчика не нужны особые условия. Быть может, вы тоже из числа многочисленных любителей волнистых попугайчиков, и вам хотелось бы получить более профессиональную информацию о содержании этих птиц; а может быть, вы пока еще совершенно неопытны. Но в любом случае вы желаете добросовестно и с полной ответственностью относиться к содержанию вашей птички. Возможно, это также означает обязательство взять на себя расходы, которые будут в несколько раз превосходить цену приобретения волнистого попугайчика. Кроме того, возникает необходимость содержать попугайчика в наиболее комфортных условиях. Что под этим подразумевается? Нам необходимо знать, как эти птицы живут в дикой природе на изначальной родине, и это касается не только обеспечения их кормом.

Содержание животного дома и в семье только тогда продлевает ему жизнь на долгое время, когда в семье все согласны с появлением нового «члена». Только тогда все будут хорошо себя чувствовать, не в последнюю очередь и ваш волнистый попугайчик.

В этом разделе – все необходимые сведения по уходу и содержанию волнистых попугайчиков. Мы расскажем вам о том, где лучше держать птицу – в клетке или на воле, как их учить говорить, как лечить болезни, словом – все-все.

Цветовые вариации волнистых попугайчиков

Все цветовые вариации по насыщенности разделяют на темные, светлые и средние. Для согласованности толкования цветовых вариаций у волнистых попугайчиков кроме основной окраски туловища принято оговаривать окраску определенных участков оперения или расположение рисунка, что значительно облегчает понятие о принадлежности птицы к той или другой цветовой вариации. Такими параметрами могут служить окраска горловых пятен, волнистого рисунка и центральных рулевых

перьев. Если же окраска туловища разных особей сходится, то разница в окраске этих участков оперения или отдельных перьев может служить ориентиром в определении основной окраски.

1. Зеленые с нормальным рисунком. Основной цвет туловища зеленый, с однородным оттенком. Маска ярко-желтая, с шестью круглыми черными горловыми пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна по обе стороны головы перекрываются фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок на голове, шее, спине и крыльях черный, четко выраженный на желтом фоне. Центральные рулевые перья темно-синие. Ноги серо-синего цвета. У птиц темно-зеленого цвета основной цвет темно-зеленый, а центральные рулевые перья заметно темнее, чем у зеленых птиц.

2. Зеленые с опалиновым рисунком. Маска ярко-желтая, с шестью круглыми черными пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна по обе стороны головы перекрыты фиолетовыми пятнами в виде капли. Крылья с темным рисунком на одноцветном зеленом фоне спины образуют букву V. Верхняя часть головы желтая, задняя часть головы и шея имеют слабую волнистость (или штрихи) на зеленом или на желтом фоне. На спине нет волнистого рисунка черного цвета, он выражен только на крыльях и зеленом фоне, в результате чего возникает опалесцирование и подобный рисунок назван опалиновым. Посредине маховых перьев имеется светлый участок – «зеркальце», шириной 1–2 см. Центральные рулевые перья темно-синие с зеленым стержнем, цвет которого не должен быть светлее основного цвета. Наличие рисунка на спине считается недостатком.

3. Синие с нормальным рисунком. Основной цвет туловища синий. Маска чисто-белая, с шестью круглыми черными горловыми пятнами, равноудаленными друг от друга. Два крайних пятна частично перекрыты фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок черный, четко выраженный на белом фоне. Центральные рулевые перья темно-синие.

4. Синие с опалиновым рисунком. Птицы всех цветов синего ряда, включая серый и фиолетовый, а также желтоголовые типы. У желтоголовых обоих типов почти вся голова желтая, в отличие от желтолицых, у которых только маска желтого цвета. Основные цвета соответствуют цветам птиц с нормальным рисунком, но они светлее. Стержни центральных рулевых перьев могут быть голубыми, но не светлее основного цвета. Края маховых перьев синие, бело-голубое «зеркальце».

5. Зеленые рецессивные пестрые. Маска желтая. Число горловых пятен от одного до шести. Каплевидные пятна могут быть фиолетовыми или серебристыми, иногда – смешанными из этих цветов. Желтый и

зеленый цвета располагаются на теле неравномерно. Зеленый цвет преобладает в нижней части туловища и на надхвостье, желтый – в верхней части тела, на спине, крыльях. Волнистого рисунка нет, имеются отдельные темные пятна на голове, шее, верхней части спины и крыльях. Цвета должны быть четко разграничены. Глаза темные, без светлой радужной оболочки. Восковица у самца розового цвета, лапы – красно-бурого.

6. Синие с коричневым рисунком. Птицы всех цветов синего ряда (кроме белых), а также желтолицы типов 1 и 2. Основной синий цвет возможен во всех вариантах, включая фиолетовый и серый, но в пастельных тонах. Маска чисто-белого цвета (у желтолицых обоих типов – желтая), горловые знаки и волнистый рисунок у самок светло-коричневого цвета, а у самцов – темно-коричневый на белом фоне. Центральные рулевые перья коричневые с синим оттенком и заметно выраженным коричневым стержнем.

7. Зеленые с коричневым рисунком. Окрашены в стандартные цвета зеленого ряда (кроме желтого). Маска желтого цвета, с шестью круглыми коричневыми пятнами, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Два крайних пятна частично перекрываются фиолетовыми пятнами в виде капли. Волнистый рисунок на голове, шее, спине и крыльях у самок светло-коричневого цвета, а у самцов – темно-коричневый, отчетливо заметный на желтом фоне. Центральные рулевые перья коричневые с синим оттенком.

8. Синие рецессивные пестрые. Окрашены во все цвета синего ряда, аналогично зеленым рецессивным пестрым, только зеленый цвет заменен на цвета синего ряда, включая серый и фиолетовый, а желтый – на белый. Цвета должны быть четко разграничены.

9. Зеленые доминантные пестрые континентального происхождения. Маска желтого цвета, с шестью круглыми черными горловыми пятнами. Два верхних пятна частично перекрыты каплевидными фиолетовыми пятнами. На затылке – пятно желтого цвета. Окраска нижней части тела зеленая, но допустимы небольшие резко очерченные участки желтого цвета. Волнистый рисунок на голове, шее и крыльях (если имеется) начинается от основного желтого цвета. Светлые участки на крыльях допустимы при условии их симметричности. Маховые и рулевые перья желтые. Глаза темные, со светлой радужной оболочкой. Восковица у самца синего цвета.

10. Синие доминантные пестрые континентального происхождения. Основные цвета синий, серый и фиолетовый. Маска и пятно на затылке Senbie (по международной классификации). Остальное – как у

предыдущих, но зеленый цвет заменяется синим, а желтый – белым.

11. Кружевные желтые. Маска желтого цвета, с шестью круглыми коричневыми пятнами. Два внешних пятна перекрываются каплевидными светло-фиолетовыми или перламутрово-белыми пятнами. Основной цвет туловища ярко-желтый. Волнистый рисунок на голове, спине и крыльях – светло-коричневый на желтом фоне, маховые и рулевые перья почти белые. Глаза красные со светлой радужиной. Восковица у самца от розового до фиолетового цвета.

12. Кружевные белые. Подобны предыдущим, но желтый цвет заменяется белым.

13. Синие желтолицые волнистые попугайчики. Разделяются на два типа распределения желтого цвета в окраске оперения:

тип А – желтый цвет только на маске и на рулевых перьях;

тип В – желтый цвет на маске и рулевых перьях, а также по всему туловищу, но разной степени интенсивности, что придает оперению птиц различные оттенки, например, бирюзовый, цитроновый и др.

Птицы с опалиновым рисунком могут быть желтоголовыми. Желтолицые и желтоголовые волнистые попугайчики бывают всех расцветок, относящихся к синему ряду, то есть белые, серые, фиолетовые и т. д.

14. Альбино. Чисто-белые птицы, без какого бы то ни было рисунка, с глазами красного цвета. Восковица у самцов розовая, у взрослых самок – коричневая. Лапы цвета сырого мяса.

15. Лютино. Чисто-желтые птицы с красными глазами (как альбино) и перламутровыми каплевидными скуловыми пятнами. Маховые и средние рулевые перья светлее основного окраса (белесые). Восковица у самцов от розового до фиолетового цвета, у взрослых самок коричневая. Лапы цвета сырого мяса.

В заключение описания типов и расцветок волнистых попугайчиков следует упомянуть о хохлатых волнистых попугайчиках – еще одной форме этих замечательных птиц.

Хохлатые волнистые попугайчики. Учитывая довольно высокую требовательность хохлатых волнистых попугайчиков к условиям кормления и содержания, а также всевозможные сложности при их разведении, становится понятно, почему эта разновидность волнистых попугайчиков еще не так многочисленна, как обычная. Хохлатость этих птиц – свойство, наименее исследованное вплоть до настоящего времени, хотя и установлена доминантная способность наследования этого признака.

Именно среди хохлатых волнистых попугайчиков существует много птиц с различными отклонениями от нормы в поведении, в частности при гнездовании, сильно подверженных разным заболеваниям нервной системы (судорогам, психозам и припадкам), а также с пониженной плодовитостью. В кладках волнистых хохлатых попугайчиков семьдесят процентов неоплодотворенных яиц, а в некоторых уже оплодотворенных зародыш погибает на разных стадиях развития. Зачастую гибнут и вылупившиеся птенцы, чаще в первые дни жизни, редко – уже после вылета из гнезда. Ведение селекционной работы с этой интересной формой волнистых попугайчиков сильно затрудняют приведенные выше причины. Но тем не менее в этом направлении работают опытные селекционеры и любители и получают довольно интересные результаты.

В основном селекционеры различают три вида хохолоков у этих птиц, классифицируя их по форме: полукруглые, остроконечные и круглые. Хохлатые волнистые попугайчики имеют все известные основные расцветки, включая доминантных пестрых. Эти попугаи бывают и с промежуточными формами хохолоков или смешанными, а также с двумя и более хохолками. Полученные от хохлатых родителей гладкоголовые птицы зачастую несут в себе признак хохлатости и передают его следующим поколениям, среди которых могут появиться и птицы с одним или даже двумя хохолками.

Любители в зарубежных странах не рекомендуют спаривать двух волнистых хохлатых попугайчиков, лучше гладкоголовой птице подобрать в партнеры хохлатую, но происходящую от пары, где хотя бы один из родителей был хохлатым. Хохлатых птенцов в выводке будет больше именно при таком сочетании, а сами они гораздо жизнеспособнее. При спаривании обыкновенной гладкоголовой птицы, то есть не имеющей хохлатого родителя, с хохлатой количество хохлатых птенцов в выводке будет значительно ниже. Также может дать в итоге различный процент хохлатых птенцов спаривание двух гладкоголовых «хохлатокровных» птиц. И тем весомее и солиднее становятся успехи, достигнутые селекционерами в работе с волнистыми хохлатыми попугайчиками.

Все другие расцветки волнистых попугайчиков, существующие у любителей нашей страны, появляются значительно реже, чем те, что перечислены, а некоторых расцветок, имеющих у селекционеров зарубежных стран, у нас нет вовсе.

Выбираем питомца

Итак, вы, наконец, точно решили купить себе или детям волнистого попугайчика. Лучше всего приобретать молодых птиц. Они легче привыкают к новым условиям, гораздо резвее в движениях и интереснее в поведении, чем старые. Молодых птиц можно быстрее приручить, они более способны к обучению.

Волнистые попугайчики неприхотливы к условиям содержания, более выносливы и намного дешевле других попугаев. Прежде чем приобретать птиц, следует посоветоваться с опытным птицеводом, узнать, как их содержать и чем кормить, прочесть специальную литературу.

Приобретать следует уже умеющего самостоятельно питаться и полностью оперившегося птенца в возрасте 30–35 дней. При выборе птицы нужно обратить внимание на ее оперение. Оно должно быть полным, перья должны плотно прилегать к телу птицы. Что касается цвета оперения, то лучше приобрести птицу естественного зеленого окраса, по статистике среди «говорящих» волнистых попугайчиков больше всего зеленых, хотя это конечно не значит, что не «говорят» попугайчики других цветов. По имеющимся данным, белые «говорящие» попугайчики – большая редкость. Ноздри у волнистого попугайчика должны быть чистыми и сухими. Перо вокруг клоаки не должно слипаться, оно должно быть сухим и чистым. Клюв должен быть правильной «попугайской» формы, обратите внимание также и на лапы, на каждом пальце должен быть коготок. Если к тому же у птицы живой взгляд и она сосредоточенно вас разглядывает, то значит, что она здорова и обладает потенциальными возможностями научиться «говорить».

Признаком отличия самца от самки, то есть признаком полового диморфизма, у волнистых попугайчиков является окраска восковицы, расположенной над клювом и окружающей ноздри.

У молодых самок восковица беловато-серая, а главное, как бы белая пена окружает ноздри, то есть окраска восковицы не затрагивает непосредственного пространства вокруг ноздрей. С возрастом восковица из буровато-серой превращается в коричневатую, а еще позднее приобретает настоящий коричневый рисунок. Примерно в трехмесячном возрасте у птицы появляется «взрослый цвет» восковицы. У взрослых самок во время размножения восковица может стать голубой.

У молодых самцов нет белых пятен вокруг ноздрей, их восковица окрашена ровно красновато-лиловым цветом. У взрослеющего самца она становится голубой, затем почти ярко-синей. Исключения могут быть у белых (альбиносов), желтых (лутинусов) и желто-пестрых самцов, однако

они мало интересны в качестве объекта для обучения «говорению».

Молодую птицу от взрослой можно отличить по большим черным глазам, сплошному волнистому рисунку от восковицы по всей голове до спины, короткому хвосту и темному клюву. У молодой птицы, кроме того, несколько матовый, менее блестящий оттенок оперения. У взрослых птиц вокруг зрачка белое кольцо, нет волнистого рисунка от восковицы до середины головы, блестящее оперение, красивый длинный хвост и светлый клюв. Хвост полностью отрастает примерно в возрасте двух месяцев.

Приобретая птицу, необходимо обратить внимание на ее внешний вид и поведение. Здоровая птица очень подвижна, оперение у нее плотно прилегающее, блестящее, глаза живые. Вялых и нахохлившихся птиц с тусклыми серозными глазами, морщинистой с наслоениями восковицей и клювом лучше не покупать – они слишком старые или больные.

Не рекомендуем приобретать птиц с плохим оперением (оголенные места на груди, спине, животе). Эти попугаи при плохом содержании (малая клетка, неполноценный корм и т. д.) привыкли ощипывать себя и их почти невозможно от этого отучить. Выщипывать оперение попугаи могут научиться друг от друга.

Случается, что у молодых птиц недостает перьев в хвосте и на крыльях – видны только пеньки. Это результат близкородственного спаривания или неправильного выкармливания. Надо также обратить внимание на частоту дыхания, кашель, хрипы в легких и воздухоносных мешках.

Транспортировка

Для перевозки попугаев из зоомагазина домой используют специальные переносные клетки. Они обычно бывают небольшого размера (18х7х9 см) и выполнены из тонких досок или фанеры, с выдвижной решеткой. Они продаются в зоомагазинах. В такой клетке можно перевозить одного-двух попугайчиков на небольшое расстояние в течение 1–2 часов. В холодное время года переносную клетку с птицей следует поместить в закрытую сумку или саквояж, чтобы она не простудилась.

Ни в коем случае не перевозите его в той клетке, в которой он потом будет жить. Клетка очень большая, попугайчик будет сильно метаться по ней и что-нибудь может себе повредить. Лучше перевозить в картонной коробочке или в плоском ящичке для перевозки. К тому же, клетка будет ассоциироваться у птицы со стрессом, который она пережила при поимке и транспортировке, естественно ей будет страшно и она долго будет привыкать к своему новому дому. Лучше, если она сразу воспримет клетку

как свое новое жилище. Приобретенную и доставленную домой птицу помещают в отдельную клетку, где выдерживают 2–3 недели на карантине. Даже практически здоровая птица плохо переносит отлов, транспортировку, перемену климата, обстановки, корма.

Первое время за птицами следует особенно тщательно ухаживать, давать полноценный корм, внимательно наблюдать за их поведением и состоянием здоровья. Профессор Б. Бессарабов рекомендует определять степень развития и состояния здоровья птицы по следующим показателям:

- а) общее состояние (соответствующее данному виду), рост и развитие;
- б) питание, прием корма и воды (уменьшенный прием или отказ от корма, сильное истощение или ожирение);
- в) движение (параличи крыльев, ног);
- г) оперение (плохое, без блеска, обломанные перья, поражение оперения паразитами);
- д) состояние открытых участков кожи (оспа, грибки, повреждения, чесотка ног и т. д.);
- е) состояние носовых отверстий и восковицы (загрязнение и серая восковица, склеивание носовых отверстий);
- ж) суставы, связки, кости (опухание, утолщение, ослабленные двигательные функции конечностей, крыльев, шеи, параличи);
- з) дыхание (нормальное, напряженное, сопящее или свистящее с открытым клювом);
- и) глаза, клюв, веки (склеивание), форма зрачка, цвет радужной оболочки;
- к) глотка, ротовая полость (окраска, наличие пленчатых отложений);
- л) область клоаки (загрязненное пометом перо и т. д.);
- м) помет (консистенция, размягченность, цвет и т. д.).

Больная птица отличается от здоровой отсутствием аппетита, частым питьем воды (при лихорадке), вялостью и сонливостью – она больше сидит, чем двигается. Перья бывают взъерошены, теряют свой блеск, сухи и неэластичны, крылья опущены, птица часто сидит нахохлившись. Больная птица щурится, закрывает глаза, прячет голову под крыло. В отличие от нее здоровая птица очень подвижна, щебечет, поет, хорошо поедает корм. Испражнения в виде червячков, твердые, зеленоватого цвета с белыми разводами. Нормальная температура тела попугая 41–42 °С.

Если птица в течение двух-трех недель чувствует себя хорошо, ее можно пускать к другим птицам.

Птичье жилье

О клетках для волнистых попугайчиков много спорят. Одни любители говорят, что клетки желательно побольше, другие же доказывают, что вполне подходят и маленькие, и что они не только держали, но и разводили волнистых попугайчиков в маленьких клетках. Несомненно, что одного или пару волнистых попугайчиков можно содержать в маленькой клетке, получить от них здоровое и крепкое потомство. Но, чтобы сохранить и закрепить в потомстве хорошие качества, маленькой клетки недостаточно. Волнистые попугайчики очень подвижны. Подвижность птиц существенно влияет на обмен веществ и, таким образом, на здоровье.

Клетка для одного волнистого попугайчика или для парочки должна быть достаточно велика, чтобы жильцы могли в ней немного летать, она должна быть не менее чем в 5 раз длиннее самой птицы, например, при длине тела волнистого попугая в 18–20 см клетка должна иметь не менее 90-100 см в длину, соответствующую ширину и быть не ниже 60, а лучше 80 см. Только клетки такой величины можно рассматривать как соответствующее данному виду птиц жилье. Согласно новому закону о защите животных такие габариты клеток для волнистых попугаев считаются минимальными.

Многие клетки, которые еще и сегодня предлагают в зоомагазинах для волнистых попугайчиков, маловаты, а некоторые к тому же и непрактичны. Такая клетка может служить ему только спальней и столовой, а все остальное время он должен иметь возможность свободно летать по комнате. Тот, кто постоянно держит своего волнистого попугая в маленькой клетке и не предоставляет ему возможности свободного полета, сам того не желая, мучает птицу, даже если по ней этого поначалу и незаметно, поскольку высокая приспособляемость волнистого попугайчика позволяет ему долгое время выдерживать существование в таких условиях. Одного или двух волнистых попугайчиков можно содержать в клетках побольше уже с более спокойной совестью. Однако и эти клетки не достаточно просторны для того, чтобы птица оставалась бодрой и здоровой, долгое время живя в такой клетке.

Стандартные клетки с прутьями по всему периметру имеют как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, в такой клетке много света и попугайчик в ней имеет возможность лазать по поперечным прутьям. Птичка, живущая в квартире вместе с людьми, очень ценит прекрасный обзор. Но с другой стороны, обитатель такой клетки доступен сквознякам и не имеет надежного спокойного уголка, где бы он мог при желании уединиться. Этому легко помочь, затемнив какой-нибудь участок

клетки растениями или занавеской. Дело обстоит иначе с так называемыми ящичными клетками. Их предшественником действительно был ящик, закрытый со всех сторон, кроме одной. Открытая сторона забрана решеткой или закрыта проволочной сеткой, внизу имеется стеклянная или плексигласовая задвижная дверца.

Если вы содержите одну птицу или пару в маленькой клетке, совершенно необходимо как можно чаще выпускать их, давая возможность вволю полетать по комнате. Исходя из практики многих любителей, наиболее оптимальный размер клетки для содержания одной пары попугайчиков – 60 см длиной и 40 см шириной и высотой, для двух пар длина клетки должна быть не менее 90-100 см. Если вы содержите одного-двух попугайчиков, форма клетки значения не имеет. При большем количестве птиц желательны клетки прямоугольной формы. Такие клетки можно ставить друг на друга и располагать компактными блоками.

Клетки желательно иметь цельнометаллические, так как деревянные клетки от волнистых попугайчиков страдают, особенно когда птицам не хватает свежих веток. Кроме того, в целях дезинфекции и предотвращения развития паразитов, клетки раз в месяц ошпаривают кипятком. Цельнометаллические клетки в этом отношении более стойки и долговечны.

Очень удобны разборные клетки, состоящие из пластикового (винипласт, текстолит) поддона (высотой не менее 12 см) и вставляемой в него решетки. Такие клетки очень удобны в работе, просты в изготовлении. Их очень легко и удобно мыть. Решетка клеток должна быть вороненой, цинкованной, никелированной или хромированной. Ни в коем случае недопустима обрешетка клетки или наличие в ней медной проволоки – окислы меди ядовиты для птиц. Некоторые вещества и элементы, содержащиеся в красках и лаках, также являются для птиц ядом, поэтому деревянные и металлические части клеток изнутри не окрашивают (допустимо покрытие в несколько слоев масляным лаком). Клетки из органического стекла с металлическим каркасом очень красивы и гигиеничны, пропускают много света, что важно для птиц.

На лицевой стенке каждой клетки должен быть установлен бортик высотой 10–12 см из пластика или оргстекла, в нижней части которого находится щель для поддона шириной 1,5–2 см. Над бортиком расположены 2 дверцы размером 15x10 см. Вверху в боковых стенках также делают дверцы, к которым во время разведения подвешивают гнездовья.

Выдвижные поддоны изготавливают в виде противня с приподнятыми

краями шириной не более 50 см. В одной клетке в зависимости от ее длины может быть 2 и более поддонов. К дну и бортикам через каждые 50 см крепятся промежуточные планки высотой 5–6 см. Планки укрепляют нижнюю конструкцию клетки, между ними удобно двигать поддон. Он должен задвигаться плотно, чтобы на дно не падал мусор. Клетку с двумя поддонами чистить очень удобно: один поддон выдвигают и щеткой выметают мусор. Птицы в это время спокойно сидят в другой стороне клетки. Закончив уборку и задвинув поддон на место, выдвигают второй и убирают вторую половину клетки, а птицы перелетают на чистую. При такой конструкции клетки, последовательности уборки и дачи корма птицы почти не испытывают беспокойства.

В комнате клетку с птицами ставят на стол или на подставку высотой 1–1,2 м на хорошо освещенном месте, но следует предупреждать попадания прямых солнечных лучей, нельзя располагать клетку на сквозняке и вблизи отопительных батарей. В хорошую погоду клетку с птицей выносят на балкон, террасу или подвешивают, не допуская контакта со свободно живущей птицей, во избежание передачи экзопаразитов. При жаркой погоде птицу лучше оставить в комнате. Некоторые любители выпускают птиц из клетки на прогулки по комнате. Клетка в данном случае служит только для приема корма и ночного отдыха. Такое содержание предупреждает нарушение обмена веществ, в особенности при склонности к ожирению. В комнате, где находятся птицы, оконная форточка в любое время года должна быть открыта. Ее надо затянуть мелкой металлической или капроновой сеткой, чтобы попугайчики случайно не вылетели в окно.

Оснащение клетки

В клетке должно быть все необходимое для нормального содержания птиц: насесты, кормушки, поилки и купалка.

Насесты. В клетке обязательно должны быть жердочки, причем лучше не те, которые продаются вместе с клеткой, а сделанные из веток с корой разной толщины, лучше 10 и 20 мм, тогда волнистому попугайчику не нужно будет постоянно держать лапы в одном положении, кроме того птица будет обгладывать кору с жердочек – это и полезно (особенно если на коре будут еще и почки), и занятие для птицы. Лучше для этой цели брать березовые ветки и ветки фруктовых деревьев. Толщина и эластичность насестов способствует постоянным упражнениям пальцев ног. Насесты из твердых пород деревьев (дуб, бук, бамбук и т. п.) или пластмассы хотя и долговечны, их легко мыть и дезинфицировать, но все же непригодны, так как из-за твердости могут вызвать воспаление подошвенного мякиша

птицы (пододерматит).

Насесты крепятся неподвижно, иначе попугай во сне может упасть и, испугавшись, пораниться о прутья клетки. В торце жердочки делают угловой вырез, который при установке заходит за проволоку решетки, чтобы удержать насест от качания.

Число насестов и их длина зависят от размеров клетки. Жердочек должно быть не менее двух и не более трех-четырех. Их укрепляют на разной высоте так, чтобы попугаю было удобно перепрыгнуть с одной на другую, едва взмахнув крыльями, чтобы сидящая на насесте птица не терлась оперением о стенку клетки, не загрязняла корм и воду.

Кормушки. Наиболее удобны и гигиеничны кормушки из пластмассы, фарфора, фаянса или покрытой глазурью керамики. Используют как стандартные кормушки, имеющиеся в продаже, так и маленькие блюдца, мисочки, розетки для варенья, керамические подставки для цветочных горшков.

Поилки бывают двух видов – открытого и закрытого (автоматические). Для них используют стеклянную или фарфоровую посуду. В открытых поилках вода быстро загрязняется и портится. Птичий помет, попадая в воду, разлагается и выделяет аммиак. Такую воду ни в коем случае нельзя оставлять в клетке. В продаже имеются автоматические поилки из стекла и оргстекла различных конструкций. Они удобны в обращении, вода в них не загрязняется и долго сохраняется чистой и свежей.

Вода для питья должна предоставляться в достаточном количестве. Она должна быть чистой, в противном случае она становится источником заболеваний. Менять ее следует не реже одного раза в день. Существенное значение при этом имеет температура, которая должна соответствовать температуре окружающей среды. Температура воды для птиц в любое время года должна быть 15–18 °С. Холодная питьевая вода зимой может стать причиной расстройства пищеварения и простудных заболеваний, а слишком теплая летом не утоляет жажды. Менять ее следует ежедневно, а в жаркое время и в период выкармливания птенцов – 2–3 раза в день.

Мы можем использовать любую безвредную, пригодную с точки зрения гигиены для питья воду, а именно колодезную, родниковую. Менее подходящей является водопроводная вода, которую, тем не менее, дают чаще всего. Водопроводную хлорированную воду, употребление которой в течение длительного времени опасно, особенно для птенцов, для удаления хлора выдерживают 12–15 часов в открытой посуде и лишь после этого дают птицам.

Жесткая вода является хорошим источником минеральных веществ.

Некоторые заводчики рекомендуют также давать птицам минеральную воду. Для этого бутылку с водой открывают и оставляют на сутки для того, чтобы из воды вышел углекислый газ, после чего разливают в поилки.

У волнистых попугайчиков, так же, как и у остальных птиц, мы можем наблюдать привычку к воде определенного состава. Такая привычка может повлечь за собой расстройства при внезапной смене воды. По этой причине уместно, например, вновь приобретенных попугаев поить кипяченой водой, в которую постепенно можно добавлять некипяченую.

Зимой и весной полезно добавлять в воду 2–3 капли (на 1 столовую ложку) лимонного сока. Он дезинфицирует воду, содержит полезные для птицы вещества и способствует укреплению перьевого покрова.

В воду можно также добавлять такие дезинфицирующие средства, как марганцовокислый калий (перманганат калия, в просторечии – марганцовка), хинозол и прочие препараты.

Кроме как водой, волнистых попугайчиков можно также поить ромашковым отваром или чаем. В обоих случаях следует готовить лишь очень слабый отвар и использовать его, по большей части, при лечении различных заболеваний и в карантине.

Любители часто пользуются потребностью птиц в питье для того, чтобы добавить им необходимые минеральные вещества или дать лекарства.

Купалку с чистой водой комнатной температуры нужно обязательно ставить в клетку не реже 1 раза в неделю (в жаркую погоду чаще). Убирать ее необходимо сразу же после того, как птица искупается, чтобы она не пила воду после купания. Размер купалки завит от величины попугая. Купаются практически все волнистые попугайчики, но некоторые предпочитают это делать под струей воды в раковине. В этом случае необходимо следить, чтобы вода не была очень холодной. Что касается игрушек, то ими не надо перегружать клетку, достаточно качелей и колокольчика.

Качели можно сделать самим; кольцо из дерева или легкой жести диаметром 5–6 см подвесить на нитке к потолочному пруту клетки, вместо кольца можно укрепить качающуюся жердочку.

Колокольчик с зеркальцем или без него можно купить в зоомагазине. Что касается зеркала, то здесь мнения владельцев волнистых попугайчиков разделяется. Некоторые считают, что зеркало плохо действует на «психику» птицы, так как стимулирует половой рефлекс, попугайчик пытается кормить «полового партнера» и даже копулировать. Однако это не всегда оправдано, во всяком случае вы можете проэкспериментировать – если

заметите, что зеркало плохо воздействует на птицу, то можно его убрать. Во время обучения «говорению» желательно, чтобы в клетке у птицы не было посторонних предметов. Однако большинство «говорящих» птиц выдает свой словарный репертуар именно перед зеркалом.

Соблюдение чистоты в клетке

Ежедневно в клетке, где находятся птицы, убирается мусор, соскабливают с бортиков прилипшую грязь и помет, мягкой щеткой смахивают пыль и сор, выдвигают поддон, протирают влажной тряпкой, заменяют подстилку. Птичья посуда моется горячей водой с добавлением соды или специальных растворов для мытья посуды, затем вытирается насухо. Кормушки для зерновых смесей тщательно очищают от остатков корма, протирают чистой тряпочкой, засыпают дневную норму корма и ставят на место. Кормушки для влажных смесей и поилки ежедневно промывают горячей водой, а автоматические поилки прополаскивают.

Ежемесячно проводят генеральную уборку клетки. После очистки от мусора и грязи протирают ее влажной губкой, смоченной в настое аптечной ромашки или полыни (это хорошие дезинфицирующие, безвредные для птиц средства), а затем протирают мягкой тряпочкой. Под поддон на дно клетки насыпают сухой ромашки или полыни. Насесты и жердочки извлекают из клетки, тщательно очищают ножом прилипшую к ним грязь, моют и прокаливают в духовом шкафу или заменяют новыми.

Ежеквартально с наступлением нового времени года клетку промывают при помощи губки содовым раствором (2–3 чайные ложки на 1 литр теплой воды), протирают насухо и снова промывают настоем полыни или ромашки и тщательно протирают. Растительные дезинфицирующие средства, в отличие от химических, совершенно безвредны, а потому предпочтительны.

Сильнодействующими химическими препаратами для обработки клеток, оборудования и инвентаря пользоваться не следует. Применяют их лишь в крайних случаях – при обнаружении паразитов (клещей, клопов, блох и т. п.). В этом случае птиц нужно опрыскать из пульверизатора сухим вином или искупать в настое полыни, пересадить в резервную клетку и временно перенести в другое помещение. А помещение, где находилась клетка и птицы, дезинфицируют дихлофосом или другим препаратом от паразитов.

Пол в помещении, где находятся птицы, полезно промывать водой с добавлением полыни (2 стакана настоя на ведро воды).

Если чистку и уборку клеток и помещений производить регулярно и

правильно, в них не заведутся вредные микроорганизмы и насекомые-паразиты, а ваши питомцы будут всегда здоровыми и веселыми.

Кормление

Основные правила кормления

Одно из важнейших условий, обеспечивающих хорошее самочувствие, внешний вид и размножение попугаев в неволе, – это правильно подобранный кормовой рацион, соответствующий потребностям вида ваших попугаев. Грамотный и правильный подбор рациона требует от любителя определенных знаний: что из питательных веществ входит в состав того или другого вида корма, в каком количестве необходимы эти вещества организму птицы, – ведь все кормовые компоненты различны по своему биохимическому составу и содержат различные вещества, необходимые для нормального функционирования организма птицы, в разных дозах.

Бывают случаи, когда попугаев кормят каким-либо однообразным видом корма, например зерном или фруктами, или, перекармливая одним видом корма, другого дают недостаточно. Подобная практика кормления приводит к тому, что через какое-то время у попугаев, содержащихся на ограниченном рационе, проявляются признаки заболевания – вялость, потеря блеска оперения, ломкость и выпадение перьев. Это говорит о том, что организму птицы не хватает каких-либо витаминов или веществ, так как в получаемом ими корме они имеются в малом количестве или отсутствуют совсем. Иногда, выбирая из кормовой смеси какой-то один компонент и не трогая остальные, отдельные птицы сами лишают себя большинства необходимых элементов или веществ. Чаще всего попугаи предпочитают канареечное семя, орехи или семена подсолнечника всем остальным видам корма. Но так как эти кормовые компоненты практически не содержат витаминов и содержат много маслянистых веществ, то злоупотребление ими обычно приводит к дефициту витаминов или к нарушению обмена веществ в организме. Поэтому очень важно, чтобы попугаи получали не только те виды кормов, которые съедают охотно, но и те, которые едят лишь тогда, когда голодны. Допустимо, чтобы оставалось на следующий день лишь очень небольшое количество корма, а вообще дневная норма должна съедаться почти полностью.

Новые корма следует вводить в рацион попугаев осторожно и небольшими порциями. Начинают примерно с одной трети дневного

рациона. Попадают птицы, особенно из ручных, которым свойствен «пищевой консерватизм», то есть абсолютное неприятие нового вида корма. И хотя многие виды попугаев, особенно крупных, при наличии воды могут без особого вреда голодать по несколько дней, допускать этого не следует. Новый вид корма нужно предлагать им или в отдельной посуде, или в кормовой смеси с привычным кормом, но обязательно при наличии обычного корма (в меньшем количестве). В этом случае, большей частью к концу дня, попугайчик начинает пробовать новый корм, съев свой обычный и проголодавшись, если только владелец выдержит и не насыплет своему любимцу новой порции привычного корма. В такой ситуации приучить птицу поедать незнакомый или нелюбимый ею корм очень сложно и для достижения положительных результатов требуется достаточно длительное время. Если же не поддаваться желанию птицы, а выдержать ее полуголодной несколько дней, постоянно давая ей возможность поедать лишь небольшую порцию привычного корма, остальное же заменять новым, то успех обеспечен. После того как попугай съест хотя бы незначительную часть нового вида корма, надо постепенно довести количество этого корма до дневной порции по массе. Когда птица его освоит в полном объеме, данный корм следует вводить в рацион попугая регулярно.

Подобные случаи бывают при введении в рацион попугаев зерна кукурузы, ячменя, гороха, гречихи и риса, поскольку большинство любителей используют для кормления своих питомцев лишь традиционные для попугаев корма – просо, овес, семена подсолнечника и совсем редко пшеницу.

Здесь мы приводим и не совсем традиционные виды кормов, которые много лет используются любителями для кормления попугаев. Применение этих не совсем традиционных кормов значительно разнообразит рацион содержащихся у вас птиц различными питательными веществами, микроэлементами и витаминами. Для того чтобы иметь возможность наблюдать за его съеданием и не вызвать у попугая серьезных отклонений в пищеварительном процессе, не забывайте о том, что любой новый вид корма следует начинать давать птицам с очень небольших порций. Некоторые птицы, если испытывают потребность в каких-то веществах, имеющихся в данном корме, с жадностью набрасываются на отдельные виды корма, которые они давно не получали. В этом случае попугай может съесть слишком много непривычной для организма пищи и нарушить работу желудка или получить отравление (например, пророщенное зерно и зелень могут вызвать стойкое расстройство желудка, а избыток поваренной

соли даже отравление!).

Волнистые попугаи, содержащиеся у селекционеров и любителей, в первые весенние и особенно зимние месяцы испытывают сильный недостаток в различных витаминах, особенно А, В и D, так как в овощах и фруктах в это время года их содержится меньшее количество этих витаминов, чем летом и осенью. Восполнить недостаток можно как скормливанием не совсем традиционных видов кормов, которые содержат витамины (или провитамины) в натуральном виде, так и концентрированными витаминными препаратами, продающимися в аптеках. К примеру, в хвое сосны и ели содержится много каротина, из которого в организме попугаев синтезируется витамин А. Можно полностью обеспечить их потребность в витамине А, включая в рацион попугаев зимой и весной еловые и сосновые ветки (или хвойную муку, применяющуюся для кормления сельскохозяйственных животных).

Этот пример приводится для того, чтобы показать, какое важное значение может иметь применение не совсем традиционных видов кормов для организма попугаев. Наиболее доступным и популярным источником каротина в рационе попугаев служит морковь. Но в конце зимы и начале весны включение в рацион попугаев веток хвойных деревьев вызывает более положительный эффект, чем скормливание моркови, потому что в этот период она содержит в себе столь незначительное количество каротина, что не в состоянии обеспечить норму.

Состав и питательность кормов

Питательность корма – это его свойство удовлетворять природные требования живого организма к пище. Пища же является основным и необходимым условием нормального обмена веществ в организме, поскольку служит источником энергии для жизнедеятельности, источником веществ, участвующих в регуляции обмена и поддержании тканей тела в определенном физико-химическом состоянии.

Состав кормов зависит от географической зоны возделывания, применения удобрений, агротехники, сроков хранения. Каротина содержится (мг на 1 кг корма): в моркови – 83, тыкве – 23, помидорах – 15, луке – 2, ветках ивы – 10, березы – 84, ели – 78, сосны – 25, травяной муке из крапивы – 121, из люцерны – 98, хвойной муке – 115. Питательность корма нельзя выразить каким-то одним показателем, и правильная оценка питательности возможна лишь при совокупности ряда показателей содержания в корме органических и минеральных веществ, которые участвуют в обмене веществ попугая. Любой вид корма состоит из

различных простых и сложных химических соединений, но эти соединения разделяются на две основные формы: твердую (сухое вещество) и жидкую (вода). Сухое вещество состоит из минеральных и органических веществ.

Минеральные вещества содержат кальций, железо, фосфор, медь, йод и другие химические элементы. В состав органических веществ корма входят кислород, углерод, водород и азот. Те химические элементы, которые требуются организму постоянно и в относительно большом количестве, называют макроэлементами. К ним относятся кальций, фосфор, калий и натрий, то есть элементы, формирующие скелет. Микроэлементы – это химические элементы, которые требуются для нормальной жизнедеятельности организма в очень малых количествах, но, однако, играют существенную роль в тех или иных процессах, протекающих в организме. К микроэлементам относятся марганец, цинк, медь, железо, йод, магний и некоторые другие химические элементы.

В органическом веществе корма различают четыре группы веществ: протеины, углеводы, жиры и витамины. Углеводы и жиры не содержат азота, в их состав входят только углерод, водород и кислород, поэтому их называют безазотистыми веществами.

Протеины

В протеинах помимо углерода, водорода и кислорода содержится также и азот, поэтому их называют азотистыми веществами. В состав протеинов входят белки, которые по сравнению с другими группами питательных веществ занимают особое и очень важное место в кормовом рационе, поскольку не могут быть заменены ни жирами, ни углеводами. Белки входят в состав всех органов и тканей в организме птиц и потому являются обязательным питательным веществом. Различают белки растительного и животного происхождения, иначе говоря – растительные и животные белки. Все жизненные процессы связаны с белковым обменом, без белков жизнь невозможна. В состав белков входят азот, углерод, водород, кислород, сера, иногда фосфор и железо, а также различные аминокислоты.

Углеводы

К углеводам относятся клетчатка и безазотистые экстрактивные вещества. Клетчатка – главная составная часть оболочек клеток в тканях организма. Все корма растительного происхождения в большем или меньшем количестве богаты клетчаткой. Под воздействием ферментов пищеварительных соков в кишечнике птицы клетчатка расщепляется на

более простые вещества, которые усваиваются организмом. Безазотистые экстрактивные вещества – крахмал и различные сахара. Эта группа углеводов также хорошо усваивается организмом птиц и имеет высокую питательную ценность (картофель и различные ягоды).

Углеводы, получаемые птицами из корма, дают энергию для различных физиологических процессов, протекающих в организме. Это их основная функция в питании птиц.

Жиры

Жиры входят как обязательные компоненты в состав протоплазмы и играют важную роль в клеточном обмене. Они являются наиболее концентрированными источниками энергии для организма попугаев. Содержание жира в кормах колеблется в очень широких пределах. Например, овес и кукуруза содержат 5–6% жира, а в семенах пшеницы и ржи его всего 1–2%, очень много жира содержится в семенах льна и подсолнечника, 30–40 %.

Жиры дают в два с лишним раза больше энергии, чем белок и углеводы, поэтому служат важным источником резервной энергии и могут накапливаться в организме в значительных количествах (чрезмерное накопление жиров приводит к ожирению и снижению активности птиц).

Витамины

Витамины необходимы для нормальной жизнедеятельности организма птиц. При их недостатке (равно как и при избытке) нарушается обмен веществ в организме, снижается его сопротивляемость к заболеваниям, репродуктивные способности и т. д. Витамины подразделяются на две группы: жирорастворимые и водорастворимые. К жирорастворимым витаминам относятся витамины А, D, Е и К. Водорастворимые – это витамины группы В: В1, В2, В3, В5 (РР), В6, В9, В12, а также витамины Н, С и Р.

В настоящее время известно более 20 витаминов, но для кормления попугаев наиболее важны указанные выше.

Жирорастворимые витамины

Витамин А (ретинол) важен для улучшения роста, репродуктивных функций, нормального функционирования нервной системы, а также зрения. Провитамином витамина А является каротин, из которого в печени птиц синтезируется витамин А. Недостаток в организме витамина А приводит к нарушению пищеварения, замедлению роста. Изменяется

нормальное состояние глаз – опухают веки, глаза слезятся, меняется цвет радужины. Заболевание называют авитаминозом А (по витамину, нехваткой которого оно вызвано), при избытке витамина возможен гипervитаминоз А.

Каротин содержится в основном в кормах растительного происхождения; моркови, различной зелени, травяной и хвойной муке, а также в кормах животного происхождения – рыбьем жире, желтке сваренного вкрутую куриного яйца. Можно применять и витаминные препараты, продающиеся в аптеках, которые содержат ретинол или комплекс витаминов, где витамин А – один из компонентов этого комплекса.

Необходимо учесть, что ветки хвойных деревьев лучше применять в зимнее время, с ноября по март, так как тогда они содержат меньше эфирных масел, избыток которых вреден для организма попугаев. Кроме того, в этот период сложнее обеспечить птиц другими содержащими каротин кормами, где бы он находился в натуральном виде и достаточном количестве.

Весной и осенью обеспечить птиц каротином намного проще, так как он содержится в достаточном количестве в зелени, фруктах, моркови и т. п. Все эти компоненты богаты каротином только в сыром их виде. При длительной термической обработке (варке, сушке) каротин распадается и утрачивает свои свойства.

Витамин D (кальциферол) участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме птиц, обеспечивая нормальный рост и развитие костей, образование скорлупы яиц и хорошее физическое состояние птицы в целом. При недостатке в рационе витамина D у птиц происходит размягчение костей (остеомалация), у птенцов искривляются конечности и грудная кость, самки с трудом разносятся или несут яйца с очень тонкой известковой оболочкой.

Введение в рацион птиц препаратов или кормов, содержащих витамин D, исключает возможность появления у попугаев подобных явлений. Кроме того, витамин D синтезируется в коже птиц при обработке их ультрафиолетовыми лучами, поэтому очень важно хотя бы периодически предоставлять птицам возможность побыть на солнце. Витамин D содержится в рыбьем жире, несколько капель которого полезно давать птицам в корм еженедельно, особенно зимой. Но можно применять и синтетический препарат витамина D (видехол) или комплексные препараты «Тривит» и «Тетравит», представляющие собой масляный раствор витаминов А, D, Е («Тривит») и А, D, Е, F («Тетравит») в физиологически согласованном соотношении. Особенно эффективно воздействуют эти

препараты на яйцекладку и рост птенцов. Витамин Е (токоферол) необходим птицам для нормальной репродуктивной деятельности. При недостатке в корме витамина Е происходят дегенеративные изменения в семенниках у самцов, а у самок нарушается нормальное функционирование яичников, что может быть причиной преждевременной гибели. Витамин Е оказывает влияние и на выводимость птенцов и на дальнейшее их развитие. При недостатке витамина Е резко возрастает процент неоплодотворенных яиц в кладке, птенцы погибают в яйце на разных стадиях развития или сразу после вывода.

Витамин Е содержится в пророщенном зерне, зеленом корме, молоке, вареном яйце. Витаминные препараты «Тривит» и «Тетравит» также содержат в своем составе витамин Е.

Витамин К (филлохинон) играет важную роль для нормального свертывания крови. Недостаток в рационе попугаев витамина К может служить причиной возникновения внутренних кровоизлияний (в пищеварительном тракте, подкожной клетчатке и мышцах). Особенно богаты витамином К шпинат, капуста и крапива, но он содержится также и в зерне, особенно в полужелтом, и в зеленых частях растений. При разнообразном питании организм попугаев обычно не испытывает недостатка в витамине К.

Водорастворимые витамины

Витамин В1 (тиамин) необходим птицам, так как от него зависит нормальный процесс обмена углеводов в организме. Распад углеводов с образованием жира, основного энергетического «топлива», происходит при наличии в организме витамина В. Кроме того, В1 участвует в белковом обмене организма. При недостатке этого витамина белки усваиваются не полностью.

Отсутствие или недостаток в рационе попугаев витамина В1 вызывает у птиц исхудание, потерю аппетита, судороги, паралич, иногда даже смерть. Витамином В1 зерновые корма обычно насыщены в достаточной мере. Повышенное количество его имеется также в пивных дрожжах и молодых ростках растений. Особенно богаты этим витамином зародыши разных зерновых. Витамин В2 (рибофлавин) входит в состав ферментов, регулирующих окислительные процессы в клетках. Как и витамин В1, участвует в углеводном, жировом и белковом обменах. При недостатке этого витамина задерживается рост молодняка, а при отсутствии его в корме происходит угнетение функционирования нервной системы, также нарушаются процессы тканевого дыхания и обмена веществ в целом,

эмбрионального развития и вывода птенцов.

Из кормов витамином В2 наиболее богаты пророщенное зерно и зелень, кормовые и пивные дрожжи, молочные продукты.

Витамин В3 (пантотеновая кислота) участвует в синтезе жиров и белков в организме попугаев. Кроме того, он оказывает влияние на работу нервных клеток, рост, оперение и кожные ткани, а также влияет на результат гнездования.

Содержится витамин В3 в люцерновой муке, дрожжах, пшеничных отрубях и сухом молоке.

Витамин В5 (никотиновая кислота) – воздействующий на общий обмен веществ в организме птиц антипеллагрический витамин. Его недостаток в рационе приводит к заболеваниям слизистых оболочек, кожи, нервным расстройствам и нарушению деятельности пищеварительного тракта. Содержится этот витамин в вареном яйце, пророщенном зерне, печени и отходах мукомольного производства. Небольшое количество витамина В5 имеется в молочных продуктах и молоке.

Витамин В6 (пиридоксин) активно участвует в белковом обмене. Влияет на содержание в крови гемоглобина, а также входит в состав ферментов, участвующих в расщеплении аминокислот. Недостаток в рационе витамина В6 вызывает снижение аппетита, поражения нервной системы, нарушения в работе органов кроветворения и, как следствие, отставание в росте. Содержится витамин В6 в ростках злаковых растений, дрожжах, яйцах, зеленых растениях, молоке.

Витамин В9 (фолиевая кислота) предотвращает малокровие и способствует нормальному развитию перьевого покрова, стимулирует и регулирует процесс кроветворения. В небольшом количестве этот витамин может синтезироваться в организме птиц. Источниками его в рационе служат люцерновая мука, дрожжи, различные виды зерновых кормов. Попугаи, получающие разнообразный зерновой корм, обычно не испытывают острого недостатка в фолиевой кислоте за счет ее внутреннего синтеза.

Витамин В12 (кобаламин), как и фолиевая кислота, участвует в обмене некоторых аминокислот (метионина и тирозина) и играет большую роль в использовании организмом животного белка, также имеет значение антианемического фактора. В состав витамина В12 входит микроэлемент кобальт (Co).

Этот витамин содержится во всех видах кормов животного происхождения – мясе и яйцах, молоке, молочных продуктах, в гниющей древесине. Недостаток в организме витамина В12 может возникать при

хронических нарушениях пищеварения.

Витамины группы В необходимы для нормального функционирования всех органов и систем организма, поэтому должно быть обязательным их наличие в рационе птиц. При разнообразном кормлении кормами животного происхождения и зерновыми кормами организм попугаев обычно не испытывает недостатка в большинстве витаминов группы В. Но содержание некоторых витаминов группы В может оказаться недостаточным в какие-то определенные физиологические моменты в жизни птиц (при линьке, заболевании, кормлении птенцов и т. п.). В подобных случаях следует вводить в рацион попугаев синтетические препараты витаминов этой группы, которые продаются в аптеках. Обычно потребность птиц в этих витаминах можно удовлетворить, если один-два раза в месяц добавлять им в воду или корм измельченные в порошок одну-две таблетки. Следует помнить, что лечение птиц сульфаниламидными препаратами и антибиотиками может вызвать в организме птиц дефицит витаминов этой группы. В таком случае введение в рацион птицы этих витаминов должно быть увеличено в кратности и дозировке.

Витамин Н (биотин) влияет на выводимость птенцов, обмен жиров в организме птиц и нормальное функционирование кожного покрова птиц. Недостаток этого витамина ослабляет обмен жиров и вызывает у птицы ухудшение общего физического состояния. Содержится витамин Н в зернах хлебных злаков, дрожжах, сухом обезжиренном молоке, муке из люцерны и мясокостной муке.

Витамин С (аскорбиновая кислота) может в достаточном количестве синтезироваться в организме птицы, поэтому наличие его в рационе, конечно, желательно, но не так необходимо, как тех витаминов, которые не синтезируются в организме птицы.

Потребность в витамине С возрастает при размножении или во время болезни птицы, а также во время линьки. Введение в рацион витамина С в это время помогает птице быстрее прийти в норму. Этот витамин нужно давать не в чистом виде (аскорбиновая кислота), а в сочетании с другими витаминами (поливитаминными драже или таблетками).

Не следует забывать о том, что организм попугая постоянно нуждается в наличии всех упомянутых витаминов, пусть даже в небольших количествах. Особенно возрастает потребность в витаминах во время линьки и в период гнездования, а также в зимнее и весеннее время. Ведь снесенное самкой яйцо содержит в себе весь комплекс витаминов, необходимых для дальнейшего роста и развития птенца. Если в яйце будет недостаточное количество витаминов и других питательных веществ, то

птенец или гибнет на какой-то стадии развития, или вырастает ослабленным, предрасположенным к различного рода заболеваниям. Организм самки, израсходовавшей определенный запас витаминов на образование яйца, также нуждается в пополнении этого запаса для следующей яйцекладки и нормального функционирования в дальнейшем. Некоторые витамины способны накапливаться в тканях и органах (например, витамин А – в печени) и использоваться организмом из этих резервов, а некоторые, особенно те из витаминов, что не могут синтезироваться в организме птицы, должны поступать регулярно с кормом.

Минеральные вещества

Минеральные вещества, за счет которых функционируют все органы и клетки организма птиц, – необходимые компоненты для нормальной жизнедеятельности организма, так как входят в состав всех питательных веществ. Минеральные вещества даются в виде минеральных добавок к основным компонентам рациона попугаев, а также в корме, где входят в состав зольных элементов. Микроэлементы обычно содержатся в кормах растительного происхождения в достаточных количествах, ибо потребность организма птиц в них ничтожно мала, порядка 0,015 %.

Макроэлементы, особенно фосфор и кальций, требуются птицам в значительно больших количествах. Поэтому для нормального соотношения их в организме требуется вводить в рацион птицы корма животного происхождения с высоким содержанием кальция и фосфора, а также включать минеральные добавки типа мела и поваренной соли, глины, яичной скорлупы. Далее приводятся наиболее важные минеральные вещества, а также указано, в каком виде корма они содержатся.

Фосфор (Р) – второй по значимости компонент, входящий в состав костной ткани наряду с кальцием. Фосфор имеется и в составе некоторых кислот в клеточном ядре, а также в составе ряда ферментов и гормонов.

Наличие витамина D, который способствует фосфорно-кальциевому обмену, необходимо для лучшего усвоения фосфора (как и кальция) организмом птицы. Помимо количества фосфора в рационе птиц следует соблюдать пропорцию по отношению к кальцию, например, две части кальция на одну часть фосфора. Это соотношение приблизительно соответствует соотношению этих веществ в костной ткани птиц. В растительных кормах фосфор обычно связан с фитином, который птицы усваивают очень плохо, так как не имеют ферментов, расщепляющих фитин. Поэтому очень важно включать в рацион попугаев препараты с

повышенным содержанием фосфора: мясокостную, костную и рыбную муку, кормовые дрожжи и глицерофосфат кальция или корма животного происхождения.

Кальций (Ca) – важнейший компонент костной ткани скелета птиц. Для птенцов и молодых птиц, скелет которых еще не достиг полного развития, особенно важно наличие достаточного количества кальция. Кроме того, кальций входит в состав нервных клеток мышечной ткани, а также крови. Присутствие в организме витамина D необходимо для улучшения усвояемости кальция. В противном случае усвоение кальция происходит в недостаточном количестве, и организм, испытывая в нем потребность, перерабатывает кальций, входящий в состав костей скелета птицы. В связи с этим скелет размягчается, что ведет к появлению рахита.

В большинстве случаев попугаи, содержащиеся на зерновом корме, испытывают систематическую нехватку кальция, а фрукты и зелень содержат его еще меньше, чем зерно. Поэтому необходимо включать в рацион попугаев минеральные добавки или медицинские препараты с высоким содержанием кальция. Наиболее распространенные добавки – яичная скорлупа, старая известковая штукатурка, мел, мясокостная и костная мука. Включая в рацион птиц молоко и молочные продукты (творог, сыворотку), а также кормовые дрожжи, можно повысить в нем процент содержания кальция. Из медицинских препаратов наиболее применимы для этой цели глюконат и глицерофосфат кальция, таблетки, которые измельчают в порошок и ставят в отдельной посуде с другими минеральными добавками (яичной скорлупой, костной мукой, песком и т. д.) или посыпают этим порошком мягкие влажные корма, например яичную смесь.

Магний (Mg) входит в состав костной ткани скелета птиц вместе с кальцием и фосфором, но в значительно меньшем количестве. Соли магния нейтрализуют избыток некоторых кислот, активизируют обмен фосфатов (например, образующийся при белковом обмене), мочевой кислоты.

При разнообразном и сбалансированном рационе попугаи обычно не испытывают недостатка в солях магния, поэтому вводить искусственные добавки с этим элементом не следует.

Калий (K) регулирует содержание воды в тканях, участвует в белковом обмене, входит в состав клеточной жидкости. При недостатке калия птицы плохо растут, у них наблюдаются повышенная возбудимость и расстройство сердечно-сосудистой системы. Ведет к тяжелым необратимым последствиям, заканчивающимся гибелью птицы, длительное отсутствие солей калия в рационе попугаев. Чтобы предотвратить

подобные явления, необходим разнообразный корм, в основном растительного происхождения. Большой процент калия содержат стручки бобовых, кормовые дрожжи и пшеничные отруби.

Натрий (Na) и хлор (Cl) чаще всего даются в виде поваренной соли (NaCl). Это вещество способствует поддержанию осмотического давления в клетках и тканях организма и входит в состав крови. При высокой концентрации соли в корме происходит выделение воды из тканей тела для снижения ее концентрации, а это чревато сильным расстройством пищеварения. Иногда может наступить полное обезвоживание организма, что приводит к гибели птицы, если пища очень соленая.

Натрий и хлор входят в состав яйца, таким образом обеспечивая будущий организм наличием этих элементов. Соляная кислота (HCl), одним из компонентов которой является хлор, входит в состав желудочного сока птиц. Ввиду того, что избыток соли в рационе попугаев ведет к нежелательным последствиям, а организм птиц все же нуждается в ней, наиболее приемлемым способом введения поваренной соли следует считать ее растворение в питьевой воде регулярно один-два раза в неделю, но в очень малых дозах, буквально несколько кристаллов. Для хорошего самочувствия попугаев такого количества поваренной соли будет вполне достаточно.

Медь (Cu), как и железо, участвует в окислительно-восстановительных процессах тканей, а также в образовании гемоглобина крови. Если в рационе мало кормов с содержанием этого элемента, то можно прибегнуть к введению его с питьевой водой. Для этого растворяют в ней 2–3 кристаллика медного купороса. Давать попугаям такой раствор следует не чаще чем один раз в месяц, а для профилактических целей достаточно и одного раза в полтора-два месяца. Недостаток солей меди плохо переносится организмом птиц.

Железо (Fe) представляет собой вещество, жизненно необходимое для организма птиц. Железо принимает участие в синтезе гемоглобина – красных кровяных телец крови, цвет которой обуславливается присутствием именно солей железа, в защитных функциях организма, в окислительно-восстановительных процессах обмена. Поскольку оно содержится во многих зерновых компонентах корма, попугаи редко страдают от недостатка железа в рационе. Повышенное содержание железа имеется в пшеничных отрубях, мясокостной и рыбной муке.

Сера (S) входит в состав многих органических соединений (таких как белки и некоторые аминокислоты), жизненно важных для нормального функционирования организма птиц. Сера входит в состав клюва и когтей, а

также пера птиц, поэтому особенно важно наличие серы в рационе попугаев во время линьки и при выкармливании птенцов, то есть при росте молодого пера. Потребность организма птиц в сере покрывается за счет распада аминокислот цистина и метионина, содержащих серу. Вводятся эти аминокислоты в рацион птиц с кормами. Названными аминокислотами наиболее богаты горох, обезжиренное сухое молоко, мясокостная мука и др. Почти все зерновые корма содержат различное количество аминокислот, поэтому попугаи, питающиеся разнообразными кормами растительного и животного происхождения, получают достаточное количество разных аминокислот (включая незаменимые, то есть не синтезирующиеся в организме птиц).

Йод (I) входит в состав гормона тироксина, вырабатываемого щитовидной железой. При недостатке в пище йода у попугаев нарушается работа щитовидной железы.

В незначительных количествах йод содержится во многих видах кормов, поэтому при достаточном разнообразии рациона попугаи обычно не испытывают недостатка в этом элементе.

Молибден и селен (Mo) и (Se) входят в состав некоторых важных ферментов.

Потребность организма птиц в этих элементах очень невелика, а так как они содержатся во многих зерновых культурах, то недостатка их в корме почти не бывает.

Неразлучники

На протяжении многих столетий почти во всех странах мира люди увлекаются содержанием и разведением попугаев. У нас в России любителей попугаев также много. Лица самых различных профессий в часы досуга с большим интересом занимаются этими птицами: обучают попугаев «разговору», различным фокусам, выводят новые цветные разновидности. Такое увлечение вполне понятно. Для многих горожан, лишенных близкого общения с природой, содержание в домашних условиях попугаев является насущной потребностью. Эти люди не могут обходиться без той радости, которую дают им эти птицы, содержащиеся в клетках. Неразлучные попугайчики особенно удобны для содержания в домашних условиях, так как они не требуют очень больших помещений, неприхотливы к условиям содержания, очень подвижны и жизнерадостны. Неразлучники являются украшением комнаты, а их разведение расширяет кругозор знаний о природе и дает огромное эмоциональное наслаждение.

Главная цель этого раздела – познакомить читателя с основными научно обоснованными методами содержания и разведения неразлучников.

Характеристика рода

Очень популярными комнатными птицами являются неразлучные попугайчики, или неразлучники (*Agapornis*), образующие отдельный род в отряде попугаеобразных.

Неразлучные попугайчики (9 видов) имеют коренастое тело, плотное, окрашенное преимущественно в яркий травянистый цвет оперение. Клюв толстый, сильно загнутый, в зависимости от вида попугайчика, окрашенный в соломенный или ярко-красный цвета. Величиной эти попугайчики с воробья или снегиря. Их название свидетельствует о том, что птицы одной пары отличаются особой привязанностью друг к другу и всегда находятся вместе. Однако широко распространенное мнение, что при гибели одного из попугаев другой погибает от тоски, ошибочно. Если же такое произошло, то причина их гибели совершенно другая – следует искать недостатки в содержании, кормлении или уходе за попугайчиками.

Образ жизни

На своей родине (Африка и Мадагаскар) неразлучники обычно держатся небольшими стайками, никогда не улетаю далеко от воды. Летают

быстро, издавая при полете резкий крик. Питаются различными ягодами и мелкими семенами, которые отыскивают на земле, в кустарнике и на деревьях. По-видимому, в их рационе присутствуют также животные корма (насекомые и их личинки), так как при содержании в клетках они поедают мучных червей и куколок мучного хрущака.

Неразлучные попугайчики живут в лесах или саваннах, гнездятся в дуплах, трещинах и между корнями деревьев, в гнездах крупных птиц (цапель, аистов и др.), устраивая в их основаниях отдельные «квартиры». Гнездо из веток или из их кусочков строит самка, она же насиживает яйца. Материал для гнезда одни виды носят в клюве, другие – записывают в оперение и таким образом транспортируют к месту постройки гнезда. Самцы лишь берут на себя заботу по кормлению самок и птенцов. В кладке 4–6 яиц, из которых после насиживания в течение 19–21 дня вылупляются птенцы; с момента вылупления первого птенца и до вылета всего выводка из гнезда проходит около 2 месяцев.

Голос неразлучников довольно резкий и громкий, поэтому летящая стая этих попугайчиков всегда дает о себе знать. При лазании по веткам они так же, как и другие попугаи пользуются клювом и ногами, хорошо бегают по земле и быстро летают, но не используют ноги для удержания пищи.

В клетке неразлучные попугайчики живут долго, до 20 лет и более, они неприхотливы к условиям содержания и к составу кормов. Их жизнерадостность, бодрый вид, большая подвижность и приятная внешность подкупают любителей птиц, поэтому эти попугаи завоевывают все большее признание.

Неразлучники хорошо разводятся в клетках и еще успешнее в вольере. Разводить их лучше весной и осенью, когда еще не жарко, но продолжительность светлого времени суток достаточна и имеются незрелые зерна злаков и свежая зелень. Поздней осенью, зимой и в середине лета гнездовые ящики рекомендуется снимать, чтобы прекратить откладку яиц и насиживание птенцов. В жаркое время года и при пониженной влажности воздуха эмбрионы в яйцах сильно перегреваются и гибнут, а зимой от недостатка витаминов птенцы вырастают слабыми, хилыми и с уродствами. В клетке разводятся почти все неразлучники за исключением оранжевоголовых и зеленоголовых неразлучников, разведение которых отмечалось всего несколько раз.

В клетках с другими птицами неразлучников содержать не рекомендуется, особенно розовощеких, так как они очень агрессивны и могут погубить более крупных птиц.

Виды неразлучников

Род неразлучных попугайчиков четко подразделяется на две подгруппы: неразлучники с белым окологлазничным кольцом и без окологлазничного кольца. Несмотря на довольно значительные различия в окраске оперения, «очковых» неразлучников иногда рассматривают в качестве подвидов одного вида, хотя некоторые систематики относят их к самостоятельным видам. Объединение «очковых» неразлучников в один вид прежде всего связано с тем, что они населяют тесно соседствующие области, в которых взаимно исключают друг друга. В клетках «очковые» неразлучники соединяются в пары и подвиды, дают гибридное потомство, которое достаточно плодовито. К «очковым» неразлучникам относятся подвиды: масковые неразлучники, ньясские неразлучники, неразлучники Фишера и черношейные неразлучники.

Ниже дается описание различных видов неразлучников, а также мутаций, полученных при разведении этих птиц в неволе.

Розовощекий неразлучник (Ag. roseicollis) чаще других неразлучников разводится в клетках. Оперение у него травянисто-зеленого цвета: лоб ярко-красный, щеки и горло апельсинового цвета, верхние кроющие хвоста яркой голубой окраски. Самец от самки по окраске не отличается. Самка немного крупнее самца. Клюв у взрослых птиц соломенно-желтого цвета. Молодые птицы, только что вылетевшие из гнезда, не имеют в окраске оперения ярко-красного и апельсинового цветов, а клюв у них коричневаточерный со светлым кончиком. Окраску взрослых птиц они получают на 7-9-м месяце жизни. Длина неразлучника 16–18 см. Распространен в Юго-Западной Африке, от Южной Анголы до реки Оранжевой. Кормом для розовощеких неразлучников служат мелкие семена и ягоды диких растений, но если вблизи мест их обитания есть посевы культурных растений, неразлучники поедают их семена, нанося тем самым существенный вред. Они постоянно перелетают с места на место и никогда не удаляются далеко от воды. При перемене места кормления розовощекие неразлучники летают небольшими стайками и проносятся очень быстро, издавая в полете резкие крики. Гнездятся они в гористых местностях недалеко от водоемов, на опушках леса. Эти попугайчики строят настоящие гнезда в дуплах, трещинах стволов деревьев, в отставшей коре, а также часто селятся в гнездах крупных птиц или общественного ткача, устраивая между прутьев свои отдельные «квартиры».

В Европу розовощекие неразлучники впервые были привезены в Берлинский зоопарк в 1860 году Карлом Гагенбеком, и уже в 1869 году был

получен первый выводок этих попугайчиков. В настоящее время в клетках они размножаются так же успешно, как и волнистые попугайчики. Лучше всего размножение протекает при содержании в садовом вольере или в отдельном садке после его предварительного облучения солнцем или эритемной лампой. В вольере можно содержать розовощеких неразлучников небольшой стайкой, так как в естественных условиях эти попугайчики нередко гнездятся колониально; в клетке – парами; лишь в достаточно просторном помещении молодняк может быть в относительной безопасности, в тесном – птицы иногда травмируются о железную решетку.

Гнездо строит только самка. Она всовывает в оперение спины и надхвостья полосы коры и лубяных волокон и таким образом транспортирует материал в гнездовой ящик. Гнездо имеет вид мешочка, отверстие которого направлено не в сторону летка, а к задней стенке. Однако не все самки полностью достраивают гнездо, и нередко они откладывают яйца (в среднем 4–6 яиц) в недостроенное гнездо. Насиживание яиц начинается с первого яйца и продолжается около 20 дней. Вылетают птенцы из гнезда в возрасте 35–40 дней и еще около двух недель подкармливаются родителями. Как только молодняк начнет поедать корм самостоятельно, их нужно отсадить от родителей в другую клетку, чтобы взрослые птицы приступили к следующему выводу птенцов. Если же неразлучники содержатся в вольере, то отсаживать их в другое помещение не обязательно. При содержании розовощеких неразлучников небольшой стайкой можно наблюдать за их поведением и отношением друг к другу. Неразлучник перебирает соседу перышки, а если это уже пара, то самец кормит самку, они дружно и в одно и то же время летят к кормушке или пьют воду. При содержании молодняка в одной стае со взрослыми птицами они перенимают от них манеру поведения, и образование пар у молодняка в этом случае происходит заранее, в возрасте 65–90 дней, когда они имеют птенцовый наряд и, значит, еще не достигли половозрелого возраста. Эти пары постоянны и не меняют супругов в течение всей жизни. С наступлением половозрелости самец ухаживает только за своей самкой, не обращая внимания на других. Половозрелость у розовощеких неразлучников наступает примерно в возрасте 7–9 месяцев, но гнездовые ящики им следует подвешивать к садку лишь в возрасте более года. В противном случае раннее гнездование отрицательно скажется на здоровье попугайчиков, их поведении и воспроизводстве потомства. Путем искусственного отбора выведены несколько цветных вариаций розовощеких неразлучников: желтая, канареечная, голубая, белая, желтовато-зеленая, светло-голубая и др. При совместном содержании

розовощеких неразлучников с другими видами и подвидами неразлучников может быть получено гибридное потомство.

Чернокрылый неразлучник, или таранта (*Ag. taranta*). Оперение в основном также зеленое. Лоб, узкое кольцо вокруг глаз и клюв ярко-красные; край крыла черного цвета. Первостепенные маховые перья темно-коричневые. Хвост, как и у всех неразлучников, короткий, закругленный. Он желтоватый с широкой черной предвершинной полосой, конец хвоста зеленый. Глаза коричневые. Ноги бурые. У самки вся голова зеленая. Молодые птицы по окраске оперения схожи с самкой, имеют коричневый клюв. Длина птицы 16 см, хвоста – 4 см. Распространен в северной, центральной и восточной частях Эфиопии, где населяет горные леса на высоте 1300–3200 м над уровнем моря, за что его также называют горным неразлучником. Благодаря обитанию в сравнительно суровых условиях горного климата эти попугайчики лучше переносят низкую температуру воздуха, чем другие виды из этого рода. На равнины чернокрылый неразлучник спускается редко и держится вдали от человеческого жилья. Летают они обычно высоко, небольшими стайками, издавая в полете резкий свист, а лазят по ветвям деревьев с большой ловкостью. В Европу этот вид впервые привезли только в 1906 году. В клетке эти очень приятные, неприхотливые птицы более спокойны. Они не так шумливы, как розовощекие неразлучники, могут содержаться в одном садке с певчими птицами. В клетках они содержатся редко, так как привоз их ограничен, а размножаются они не всегда, так как подбор пар представляет определенные трудности. Если же пара подобрана удачно, то самка приступает к постройке гнезда, материалом для которого служат полосы луба, свежая кора, стебли сухих трав. В кладке бывает 4–5 яиц, которые насиживаются в течение 24–25 дней, молодые птицы вылетают из гнезда в возрасте 47–51-го дня. Молодняк половозрелым становится в возрасте одного года.

Оранжевоголовый неразлучник (*Ag. pullaria*) также травянисто-зеленый. Лоб, передняя часть щек и горло оранжевые, у самки с желтоватым оттенком. Поясница голубая. Маховые перья черно-коричневые с зеленым наружным краем, последние второстепенные маховые зеленые; нижние кроющие крыла черные, сгиб крыла также черный, край крыла синий; остальные перья у основания на внутренней стороне опахала желтые, в середине несут по красному пятну и широкий черный перевязи перед желто-зеленой вершиной. Глаз темно-коричневый; восковица мясного цвета; надклювье красное, подклювье розовое. Ноги

серые. Самка в целом несколько бледнее окрашена, зеленый цвет у нее с желтизной, красный цвет на голове с желтоватым оттенком и меньше занимает места. Длина оранжевоголового неразлучника 13–15 см, хвоста – 5 см. Распространен в Западной и Центральной Африке: от Сьерра-Леоне на восток и до юга Судана и Уганды, к югу до Анголы. Населяет он саванны, избегая сплошных лесных массивов. Стаи собираются на ночлег на низких деревьях или кустарнике с большим гамом и суетой. Однажды выбранное место для ночевки постоянно посещается. Пища оранжевоголового неразлучника состоит из зерен диких и культурных растений. Наряду с этим они охотно поедают инжир.

Гнездятся оранжевоголовые неразлучники в земляных и древесных постройках термитов. Самка прогрызает в боковой стенке термитника плотный наружный слой и делает тоннель, в конце которого устраивает гнездовую камеру. Иногда тоннель поднимается вверх, поэтому гнездовая камера оказывается выше входа в тоннель. Самец, хотя и присутствует при гнездостроении, никакого участия в высиживании кладки не принимает. Дно гнездовой камеры самка выстилает кусочками разгрызенных листьев и другого растительного материала, который она приносит в оперении груди, брюшка и надхвостья. В кладке 4–5 яиц; насиживание продолжается 21–23 дня. Молодняк вылетает из гнезда в возрасте 40 дней.

В садках и вольере оранжевоголовые неразлучники живут долго, миролюбивы к певчим птицам, но редко размножаются. Однако эти попугайчики, хотя и являются очень приятными комнатными птицами, в неволе содержатся редко, так как привозят их в Россию нечасто. В последние годы в Англии добились неплохих результатов в разведении этих птиц, так как учли особенности их размножения в естественных условиях. В природе оранжевоголовые неразлучники гнездятся не колониями, как другие виды этого рода, а отдельными парами, поэтому для каждой пары необходим отдельный садок и искусственная нора, в которой самка и сделает гнездо. Для устройства гнезда им ставят на небольшом холмике в вольере или на дне клетки в горизонтальном положении гнездовой ящик в виде деревянной четырехгранной «трубы» длиной 50–60 см, высотой и шириной по 20 см, плотно набитой смесью торфа с древесными опилками или просто крупными кусками торфа. Самка вырывает в таком гнездовом ящике нору и в конце ее устраивает гнездовую камеру, в которую и откладывает яйца. Эти неразлучники очень теплолюбивы и чувствительны к холоду, поэтому следует учитывать это при их содержании в домашних условиях. В период выкармливания птенцов оранжевоголовые неразлучники, помимо зерновой смеси и зелени,

также поедают личинок и куколок мучного хрущака.

Масковый неразлучник (Ag. personata). Он имеет очень яркую окраску оперения. Голова у него черная с коричневым оттенком, который у самки выражен сильнее; крылья, спина, живот и короткий закругленный хвост темно-зеленые; остальное оперение яркого желтого цвета, часто с оранжевым оттенком. Вокруг глаз широкое белое кольцо, так называемые «очки», которые представляют собой участок голой белой кожи. Клюв красный. Самец от самки отличается размерами незначительно. Длина попугайчика – 15–16 см, хвоста – 4 см. Распространен в Танзании, Замбии и Северо-Западном Мозамбике. Населяет сухие травянистые степи с отдельными рощицами акаций. Попугайчики держатся небольшими стаями, полет их быстрый и волнообразный. Гнездятся в дуплах акаций, где из кусочков веток самка свивает плотное шарообразное гнездо. Гнездовой материал она носит в клюве, а не в оперении, как это делают другие неразлучники. В еще недостроенном гнезде самка откладывает 4–5 яиц и насиживает их около 21 дня. Родители хорошо заботятся о своих птенцах, но те, даже сытые, ведут себя очень шумно и постоянно извещают о своем присутствии криками. В возрасте 35–40 дней они впервые вылетают из гнезда, но еще около двух недель возвращаются на ночлег в него и опекаются родителями. По истечении этого срока они становятся самостоятельными и летают в стае с другими неразлучниками.

Масковый неразлучник впервые был описан Рейхеновым в 1887 году и завезен в Европу в 1927 году. В неволе эти неразлучники содержатся довольно часто, но они более капризны, чем розовощекий неразлучник, и потомство от них получить сложнее. Более успешно они размножаются при содержании в вольере небольшой стайкой. В остальном их содержание и разведение ничем не отличается от содержания и разведения предыдущих видов.

Неразлучник Фишера (Ag. fischeri). Основная окраска оперения темно-зеленая; лоб ярко-красный, остальная часть головы и шея оранжево-красные; верхние кроющие перья хвоста (надхвостье) ультрамариново-синие. Внутренняя сторона опахала маховых перьев черная, верхняя их сторона зеленая. Вокруг глаз широкое чисто белое «кольцо», сам глаз коричневый. Восковица цвета слоновой кости; клюв блестяще-красный. Ноги серые. Самки отличаются от самцов размерами. Длина попугайчика 15–16 см, хвоста – 4 см. Распространен на северо-западе Танзании (озеро Виктория), населяет сухие саванны с небольшими рощицами из акаций.

Держатся птицы небольшими стайками, перелетая с места на место в поисках пищи и воды. Гнездятся в дуплах, гнездо делают из кусочков веток, которые переносят в клюве. В кладке 4–5 яиц, которые самка насиживает в течение 20–21 дня.

В клетке неразлучники Фишера легче приступают к размножению, чем масковые неразлучники, поэтому на рынке они стоят немного дешевле. Содержание, уход и разведение общие для всех неразлучников.

Чернощекий неразлучник (*Ag. nigrigenis*). Основная окраска оперения темно-зеленая. Верх головы темно-оранжевый, бока головы и горло черно-коричневые, область зоба светло-красная, иногда с оранжевым оттенком; задняя часть головы, затылок и бока шеи оливково-зеленые. Вокруг глаза «очки», глаза коричневые. Восковица светло-мясного цвета, клюв красный, надклювье у основания рогового цвета. Ноги мясного цвета, иногда серого. Длина попугайчика 15–16 см, хвоста – 5 см. Распространен в Замбии по северному притоку реки Замбези у до водопада Виктория.

Чернощекий неразлучник был описан в 1906 году и в том же году привезен в Европу. Считается, что этот неразлучник легче всех других «очковых» неразлучников размножается в неволе. Кормление, условия содержания и разведение его такое же, как и других неразлучников. В просторном садке или вольере можно держать по несколько пар вместе.

Клубничноголовый, или ньясский неразлучник (*Ag. lilianae*). Основная окраска оперения темно-зеленая; лоб карминно-красный, бока головы и горло также красные с легким желтоватым оттенком. Шея земляничного цвета, затылок и бока шеи оливково-зеленые. Вокруг глаза широкое, чисто белое голое «кольцо». Восковица светлого мясного цвета. Клюв красный, надклювье у основания розовое. Ноги мясного или светло-серого цвета. Самка незначительно отличается от самца. В большинстве случаев лишь красная окраска у них немного бледнее. Это самый мелкий неразлучник из «очковых» неразлучников, и этим он отличается от схожего по окраске неразлучника Фишера. Кроме того, надежным отличительным признаком является зеленое надхвостье, которое у Фишера – ультрамариновое. Распространен на северо-востоке Замбии, от верхнего течения реки Шире и до реки Замбези. Населяет открытые пространства с небольшими зарослями акации и мимозы, держится мелкими стаями, полет стремителен и проходит с пронзительным криком. Гнездятся эти попугайчики колониями.

Клубничноголовый неразлучник не очень часто попадает на птичьи рынки Европы ввиду запрета на вывоз этих попугайчиков из Замбии.

Условия его содержания и кормления обычные, как для всех неразлучников. Особенно они любят сладкие яблоки и свежую зелень, а в период кормления птенцов охотно поедают намоченный в чае белый хлеб. Этот вид неплохо размножается в неволе, особенно в вольере, но очень боится холода.

Сероголовый, или мадагаскарский неразлучник (Ag. cana). Оперение травянисто-зеленое. Голова, шея и верх груди серого цвета с жемчужным отливом; низ груди, брюхо и подхвостье желтовато-зеленое. Хвост широкий со светлой перевязью перед зеленой вершиной. Восковица и клюв светло-серые. Ноги серые, иногда с синеватым отливом. Самка имеет полностью зеленое оперение. Распространен этот неразлучник на острове Мадагаскар, держится стаями, в которых отдельные пары постоянно находятся рядом. На ночлег птицы собираются на лесные опушки; они сидят плотно прижавшись друг к другу на финиковых пальмах, летают на рисовые поля кормиться, нанося им тем самым значительный вред. Во время размножения каждая пара гнездится вдали от других сероголовых неразлучников. С 1872 года сероголовые неразлучники стали импортироваться в Европу, но они редко встречаются в клетках.

Для содержания в домашних условиях эти попугайчики малопригодны из-за своей врожденной пугливости, особенно в первое время после прибытия на новое место. Со временем они становятся немного спокойнее и даже иногда приносят приплод в неволе, но не всегда выращивают его благополучно. Сероголовые неразлучники очень любят купаться. Поэтому им следует ставить сосуды с чистой водой комнатной температуры (около 20 °C). Этих неразлучников лучше держать парами, так как в естественных условиях они гнездятся одиночными парами. Самка берет клювом кусочек коры, свежих листьев или древесных волокон и транспортирует в гнездовой домик, на дне которого строит гнездо. Гнездовой ящик для сероголового неразлучника должен быть более просторным, чем для других неразлучников. В кладке 4–8 яиц, продолжительность насиживания составляет около 22 дней. Впервые птенцы вылетают из гнездовья в возрасте около 35 дней, а после вылета из гнезда они должны еще две недели подкармливаться родителями.

Зеленоголовый неразлучник (Ag. swinderniana). Окраска оперения зеленая; на груди желтоватая; на шее черное и оранжевое ожерелье, поэтому их иногда также называют ожереловыми неразлучниками; нижняя часть спины, поясница и надхвостье ультрамариново-синие. Маховые перья

и кроющие кисти черные с зелеными наружными каемками. Надклювье черное, подклювье – рогового цвета. Ноги серые. Полы окрашены одинаково. У молодых птиц отсутствует черная перевязь на затылке и клюв светлее. Распространен в Либерии, Камеруне, Центральной Африке, Конго и Заире. Зеленоголовый неразлучник обитает в тропических лесах. В Либерии они чаще встречаются в рощах диких финниковых деревьев, плодами которых они главным образом и питаются. Держатся небольшими стайками, кочуя по лесу в поисках пищи, издавая в полете громкий крик, похожий на звук несмазанной маслом ржавой дверной петли. В желудках этих неразлучников находят преимущественно плоды дикого инжира и семена риса. После насыщения пищей птицы летят на водоем и возвращаются в лес на отдых. Полет их очень быстрый, по земле передвигаются проворно, семена ножками.

В клетках любителей экзотических птиц зеленоголовый неразлучник не встречается, что объясняется трудностью его отлова в местах обитания. Эти неразлучники практически все время находятся в кронах старых деревьев, имеющих несколько десятков метров высоты.



Волнистые попугайчики:

1 – белый; 2 – зеленый; 3 – синий; 4 – желтый; 5 – арлекин

