



ТЕОРІЯ СРАВНЕНІЙ.

СОЧИНЕНІЕ

П. Чебышева.



ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 лин., № 12.

1901.

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Это изданіе принадлежит Обществу вспомошествованія студентамъ С.-Петербургскаго Университета.

Оно исполнено, съ разрѣшенія Академіи Наукъ, на средства пожертвованныя братомъ покойнаго П. Л. Чебышева генераломъ отъ артиллеріи В. Л. Чебышевымъ.

Корректуры просматривались приватъ - доцентомъ С.-Петербургскаго Университета И. И. Ивановымъ и мною.

Особенное вниманіе было обращено на таблицы, при повѣркѣ которыхъ было обнаружено и исправлено нѣсколько ошибокъ перваго изданія.

21 Сентября 1901 года.

А. Марковъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Не слѣдуя вполнѣ въ изложеніи Теоріи сравненій сочиненіямъ Лежандра: *Théorie des nombres* и Гаусса: *Disquisitiones arithmeticae*, я считаю необходимымъ объяснить причины, заставившія меня сдѣлать отступленія отъ этихъ превосходныхъ сочиненій двухъ великихъ Геометровъ. Для этого я войду въ нѣкоторыя подробности объ этихъ сочиненіяхъ и о современномъ имъ состояніи Теоріи чиселъ.

Ейлеромъ положено начало всѣхъ изысканій, составляющихъ общую часть Теоріи чиселъ. Въ этихъ изысканіяхъ Ейлеру предшествовалъ Ферматъ; онъ первый началъ заниматься изслѣдованіемъ свойствъ чиселъ въ отношеніи ихъ способности удовлетворять неопредѣленнымъ уравненіямъ того или другаго вида, и результатомъ его изысканій было открытіе многихъ общихъ теоремъ Теоріи чиселъ. Но изысканія этого Геометра не имѣли непосредственнаго вліянія на развитіе науки: его предложенія остались безъ доказательствъ и безъ приложений. Въ этомъ состояніи открытія Фермата служили только

вызывомъ Геометровъ на изысканія въ Теоріи чиселъ. Но не смотря на весь интересъ этихъ изысканій, до Ейлера никто не вызывался. И это понятно: эти изысканія требовали не новыхъ приложений приѣмовъ уже извѣстныхъ и не новыхъ развитій приѣмовъ, прежде употреблявшихся; эти изысканія требовали созданія новыхъ приѣмовъ, открытія новыхъ началъ, однимъ словомъ, основанія новой науки. Это сдѣлано было Ейлеромъ.

Между многими изысканіями Ейлера въ Теоріи чиселъ наиболѣе имѣли вліянія на успѣхъ этой науки изысканія его по слѣдующимъ двумъ предметамъ: 1) о степеняхъ чиселъ въ отношеніи остатковъ, получаемыхъ при дѣленіи ихъ на данное число и 2) о числахъ, представляющихъ сумму двухъ чиселъ, изъ которыхъ одно есть квадратъ, а другое произведеніе квадрата на данное число. Первые положили основаніе теоріи указателей, сравненій двучленныхъ вообще и въ особенности теоріи квадратичныхъ вычетовъ; вторыя были началомъ теоріи квадратичныхъ формъ.

Основаніе теоріи указателей Ейлеръ положилъ мемуаромъ своимъ: *Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia*, напечатаннымъ въ запискахъ нашей Академіи за 1773 годъ. Въ этомъ мемуарѣ онъ раскрылъ свойства указателей и первообразныхъ корней, показалъ высшій предѣлъ числа рѣшеній, допускаемыхъ сравненіями двучленными съ простымъ модулемъ, и приложеніе теоріи указателей къ теоріи квадратичныхъ вычетовъ и квадратичныхъ формъ. Для совершенства теоріи указателей оставалось найти способъ опредѣленія первообразныхъ корней, не испытывая различныхъ чиселъ. Всѣ старанія Ейлера въ изысканіи этого были тщетны; онъ говоритъ: „*Via quidem adhuc non patet, tales radices primitivas pro quovis divisore primo inveniendo, neque etiam demonstratio, qua tales radices primitivas semper dari evici, methodum eas inveniendo declarat*“ *). Но при всемъ успѣхѣ

*) Op. min. col. томъ I, стр. 523.

Теоріи чиселъ, мы до сихъ поръ находимъ первообразные корни, испытывая различныя числа, и теоремы, изложенныя мною во второмъ прибавленіи, едва ли не первый опытъ находить первообразные корни безъ предварительныхъ испытаній.

Изслѣдованія Ейлера о дѣлителяхъ чиселъ вида $a^n \pm b^n$ положили начало теоріи сравненій двучленныхъ. Эти изслѣдованія мы находимъ во многихъ мемуарахъ Ейлера; изъ нихъ особеннаго вниманія заслуживаетъ мемуаръ: *Theoremata circa divisores numerorum*. Здѣсь онъ показываетъ, что возможность удовлетворить сравненію $x^n - a \equiv 0 \pmod{mn+1}$, при $mn+1$ простымъ числѣ, предполагаетъ дѣлимость $a^m - 1$ на это число, и доказываетъ обратное, предполагая m и n простыми между собою. За исключеніемъ лишняго ограниченія m и n простыми между собою, эти теоремы суть основанія современной теоріи сравненій двучленныхъ вообще и въ особенности теоріи квадратичныхъ вычетовъ. Впрочемъ, разсматривая у Ейлера доказательство послѣдней теоремы, легко замѣтить распространеніе ея на случай m и n какихъ-нибудь. Въ мемуарѣ: *De quibusdam eximiiis proprietatibus circa divisores potestatum occurrentibus* онъ особенно доказываетъ это для случая $m=2$, не дѣлая никакихъ ограниченій относительно n , и показываетъ, что дѣлимость $a^n - 1$ на $2n+1$ есть необходимое и достаточное условіе того, чтобы a было квадратичнымъ вычетомъ числа $2n+1$. Кромѣ того Ейлеръ, въ другихъ мемуарахъ, много занимался квадратичными вычетами, и въ *Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos*, разсматривая остатки, получаемые при дѣленіи квадратовъ на простые числа, онъ вывелъ такое заключеніе:

Existente s numero quocunque primo, dividantur tantum quadrata imparia 1, 9, 25, 49, etc, per divisorem 4s, notenturque residua, quae omnia erunt formae 4q+1, quorum quodvis littera α indicetur, reliquorum autem numerorum, formae 4q+1, qui inter residua non occurrunt quilibet littera α indicetur, quo facto si fuerit

<i>divisor numerus</i> <i>primus formae</i>	<i>tum est</i>
$4ns + \alpha$	$+ s \text{ residuum et } - s \text{ residuum}$
$4ns - \alpha$	$+ s \text{ residuum et } - s \text{ non-residuum}$
$4ns + 2$	$+ s \text{ non-residuum et } - s \text{ non-residuum}$
$4ns - 2$	$+ s \text{ non-residuum et } - s \text{ residuum}$

Это открытіе мы находимъ у Ейлера въ 1-мъ томѣ *Opuscula Analytica*, 1772 года. Не трудно въ немъ узнать законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ, обнародованный Лежандромъ въ 1785 годѣ и положенный имъ въ основаніе теоріи квадратичныхъ вычетовъ.

Въ теоріи квадратичныхъ формъ Эйлеръ началъ свои изысканія съ суммы двухъ квадратовъ, и въ мемуарѣ: *De numeris, qui sunt aggregata duorum quadratorum* доказалъ, что дѣлители суммы двухъ квадратовъ простыхъ между собою должны представлять подобную сумму, и вывелъ линейную форму этихъ дѣлителей. Такимъ образомъ онъ дошелъ до знаменитой теоремы Фермата о разложеніи простыхъ чиселъ вида $4m + 1$ на два квадрата. Подобнымъ образомъ Эйлеръ нашелъ квадратичныхъ и линейныхъ дѣлителей для квадрата, сложеннаго съ удвоеннымъ или утроеннымъ квадратомъ, и предложилъ безъ доказательства линейныя формы дѣлителей многихъ квадратичныхъ формъ. Такъ положилъ Эйлеръ основаніе теоріи дѣлителей квадратичныхъ формъ. Геніальныя открытія, сдѣланныя Лагранжемъ въ этой части Теоріи чиселъ, открыли путь Эйлеру къ новымъ изысканіямъ. Слѣдствіемъ ихъ было новое развитіе теоріи квадратичныхъ формъ со многими приложеніями ея къ изслѣдованію, что данное число простое или нѣтъ, и какъ можно найти простыя числа чрезвычайно большія.

Ейлеръ не ограничивался въ изысканіяхъ своихъ однѣми конечными формулами; онъ показалъ также, какимъ образомъ употребленіемъ рядовъ можно дойти до различныхъ предложеній Теоріи чиселъ.

Сюда относятся изысканія его *de partitione numerorum* и о суммах дѣлителей различныхъ чиселъ.

Имѣя въ виду развитіе общей части Теоріи чиселъ, мы не будемъ останавливаться на изысканіяхъ Ейлера въ анализѣ Діофанта, результатомъ которыхъ было рѣшеніе уравненій вида $ax^2 + by^2 = cz^2$, доказательство невозможности нѣкоторыхъ уравненій съ двумя и тремя неизвѣстными и рѣшеніе многихъ неопредѣленныхъ уравненій весьма сложныхъ, и перейдемъ къ изысканіямъ Лагранжа, которымъ сдѣланы весьма важныя развитія въ общихъ началахъ Теоріи чиселъ. Сюда относятся изысканія его о числѣ рѣшеній, допускаемыхъ сравненіями съ простымъ модулемъ, и изслѣдованія свойствъ квадратичныхъ формъ. Мы видѣли, что Ейлеромъ найдены высшій предѣлъ числа рѣшеній двучленныхъ сравненій; Лагранжъ доказалъ, что этотъ же предѣлъ будетъ при всякомъ числѣ членовъ. Этимъ открытіемъ Лагранжъ далъ возможность доказать многія предложенія Теоріи чиселъ, которыхъ доказательства прежде представляли непреодолимые затрудненія. Къ числу такихъ предложеній должно отнести существованіе первообразныхъ корней для всѣхъ простыхъ чиселъ; доказательство, предложенное на это Эйлеромъ, основывается на свойствахъ двучленныхъ сравненій, которое могло быть строго доказано только послѣ открытія Лагранжа. Но изъ всѣхъ трудовъ Лагранжа въ Теоріи чиселъ наиболѣе имѣли вліянія на успѣхъ этой науки его изысканія о квадратичныхъ формахъ. Онъ далъ общія начала для тѣхъ изысканій, которыя были сдѣланы Ейлеромъ для немногихъ простѣйшихъ формъ, и эти начала, развиты Лежандромъ, составили полную теорію дѣлителей квадратичныхъ формъ, одну изъ самыхъ главныхъ въ Теоріи чиселъ и особенно важную по своимъ приложеніямъ къ опредѣленію дѣлителей даннаго числа.

Развитіе теоріи квадратичныхъ формъ, сдѣланное Лежандромъ, было слѣдствіемъ открытій его въ теоріи квадратичныхъ вычетовъ. Заключение, приведенное нами выше изъ сочиненія Ейлера: *Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos* содер-

жить ту теорему, которая нынѣ извѣстна подъ именемъ закона взаимности двухъ простыхъ чиселъ и которой обязана своимъ успѣхомъ теорія квадратичныхъ вычетовъ. Въ запискахъ Парижской Академіи Наукъ за 1785 годъ Лежандръ доказалъ ее на основаніи признаковъ возможности уравненія $ax^2 + by^2 = cz^2$, имъ же открытыхъ, и показалъ приложенія ея къ изслѣдованію сравненій второй степени и опредѣленію дѣлителей квадратичныхъ формъ.

Въ такомъ состояніи находились различныя части Теоріи чиселъ, когда Лежандръ написалъ сочиненіе свое: *Essai sur la Théorie des nombres*, изданное послѣ со многими прибавленіями, но безъ существенныхъ измѣненій въ системѣ изложенія главныхъ частей, подъ названіемъ *Théorie des nombres*. При всемъ развитіи отдѣльныхъ частей Теоріи чиселъ, систематическое изложеніе этой науки представляло непреодолимыя трудности. Мы видѣли, что законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ, служащій основаніемъ теоріи квадратичныхъ вычетовъ и вслѣдствіе того необходимый для теоріи квадратичныхъ формъ, выведенъ былъ Лежандромъ изъ свойствъ уравненій второй степени. Поэтому теорія квадратичныхъ вычетовъ и формъ могла быть изложена только послѣ предварительнаго изложенія теоріи неопредѣленныхъ уравненій второй степени, теоріи по предмету своему гораздо вышней и съ своей стороны представляющей приложеніе теоріи квадратичныхъ вычетовъ. Вслѣдствіе этого въ сочиненіи своемъ Лежандръ, послѣ предварительнаго изложенія различныхъ предложеній относительно чиселъ, начинается съ рѣшенія неопредѣленныхъ уравненій, и только по изложеніи полной теоріи уравненій второй степени онъ приступаетъ къ *общимъ свойствамъ чиселъ*, гдѣ находимъ у него главныя предложенія Теоріи сравненій и полную теорію квадратичныхъ вычетовъ и квадратичныхъ формъ. Такой порядокъ въ изложеніи главныхъ частей Теоріи чиселъ, лишившій ее системы, оставался необходимымъ только до тѣхъ поръ, пока Гауссъ не показалъ, какимъ образомъ законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ можетъ быть выведенъ непосредственно изъ разсматриванія сравненій.

Такъ открылась возможность, не нарушая естественнаго порядка въ главныхъ частяхъ Теоріи чиселъ, изложить сравненія второй степени вмѣстѣ съ другими сравненіями прежде уравненій второй степени, и потомъ на основаніи результатовъ Теоріи сравненій упростить изслѣдованіе уравненій высшихъ степеней.

Обращаемся теперь къ сочиненію Гаусса. Мы видѣли, какія развитія сдѣланы были въ различныхъ частяхъ Теоріи чиселъ трудами Ейлера, Лагранжа и Лежандра. Но Гауссъ въ сочиненіи своемъ: *Disquisitiones arithmeticae* не пользовался изысканіями этихъ Геометровъ. Онъ независимо отъ нихъ развилъ главныя части Теоріи чиселъ, обогативъ ее новыми приѣмами, многими открытіями и весьма важными приложеніями къ рѣшенію двучленныхъ уравненій. Но при всемъ достоинствѣ сочиненія Гаусса мы не можемъ не признать, что большая часть его выводовъ лишена той простоты, которою отличаются приѣмы Ейлера, Лагранжа и Лежандра. Въ этомъ отношеніи его изложеніе отдѣльныхъ частей Теоріи чиселъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, нельзя предпочесть изложенію Лежандра.

Изъ этого видно, что ни сочиненіе Лежандра, ни сочиненіе Гаусса не представляютъ Теоріи чиселъ въ томъ совершенномъ видѣ, въ которомъ она можетъ быть изложена послѣ развитій, сдѣланныхъ въ ней трудами этихъ Геометровъ, а тѣмъ болѣе послѣ изысканій Геометровъ позднѣйшихъ. Поэтому въ изложеніи Теоріи сравненій я долженъ былъ руководствоваться не однимъ Лежандромъ и не однимъ Гауссомъ, но вмѣстѣ и Лежандромъ и Гауссомъ и многими другими, занимавшимися этою частью Теоріи чиселъ. Но чтобы привести въ систему изысканія Геометровъ, употреблявшихъ приѣмы весьма разнообразныя, я долженъ былъ измѣнить большую часть ихъ выводовъ. Кромѣ того для полноты системы я нашелъ необходимымъ развить нѣкоторыя статьи. Такъ въ теоріи сравненій 1-й степени я разсматриваю отдѣльно три случая, когда это сравненіе имѣетъ одно рѣшеніе, нѣсколько и не имѣетъ ни одного. Излагая свойства сравненій высшихъ степеней, предлагаю относительно ихъ нѣсколько общихъ

теоремъ, кромѣ теоремы Лагранжа. Въ теоріи квадратичныхъ формъ показываю средство узнавать, когда двѣ квадратичныя формы дѣлителей приводятся къ однѣмъ линейнымъ формамъ. Кромѣ того въ сочиненіи моемъ находится три прибавленія. Въ первомъ я излагаю распространеніе знакоположенія Лежандра, сдѣланное Якоби, и показываю приложеніе этого къ изслѣдованію квадратичныхъ вычетовъ; во второмъ я доказываю теоремы, опредѣляющія первообразный корень нѣкоторыхъ чиселъ по ихъ виду; въ третьемъ я предлагаю результаты своихъ изысканій относительно свойствъ функціи, опредѣляющей сколько простыхъ чиселъ не превосходятъ данной величины.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ.

§§.	Стран.
1. Предметъ Теоріи чиселъ и Теоріи сравненій	1
2. О числахъ абсолютно простыхъ	2
3. О числахъ относительно простыхъ	3
4. Свойства чиселъ относительно простыхъ	—
5. О разложеніи чиселъ на простые множители	5
6. Теоремы на этомъ основанныя	8
7. О числахъ, составляющихъ арифметическую прогрессію	12

Глава I.

О сравненіи вообще.

8. Понятіе о сравненіи	19
9. О свойствахъ сравненія чиселъ между собою	21
10. О рѣшеніи сравненій	25
11. О наименьшихъ вычетахъ	25
12. О числѣ рѣшеній сравненія	29

Глава II.

О сравненіи первой степени.

13. Рѣшеніе этихъ сравненій при модулѣ простомъ съ коэффициентомъ неизвѣстнаго	31
14. Теоремы Фермата и Ейлера	33
15. Приложение этихъ теоремъ къ рѣшенію сравненій 1-й степени	37
16. О сравненіяхъ, въ которыхъ модуль и коэффициентъ неизвѣстнаго имѣютъ общаго дѣлителя	39

Глава III.

О сравненіяхъ высшихъ степеней вообще.

§§	Стран.
17. Освобожденіе отъ коэффициента высшей степени неизвѣстнаго.	43
18. Высшій предѣлъ числа рѣшеній	45
19. Приложение этого къ доказательству теоремы Вильсона и другихъ свойствъ чиселъ	49
20. Приведеніе сравненій къ виду, въ которомъ степень его меньше модуля	53
21. Признакъ, по которому узнаемъ, что сравненіе имѣетъ столько рѣшеній, сколько единицъ въ показателѣ его	55

Глава IV.

О сравненіяхъ второй степени.

22. Приведеніе полныхъ сравненій второй степени къ сравненію вида $x^2 \equiv q \pmod{p}$	59
23. О числѣ рѣшеній сравненія $x^2 \equiv q \pmod{p}$	63
24. О символѣ $\left(\frac{q}{p}\right)$	64
25. Свойства этого символа	67
26. Выраженія его опредѣляющія; слѣдствія ихъ: 1) значеніе $\left(\frac{2}{p}\right)$, 2) законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ	71
27. Способъ находить значеніе $\left(\frac{q}{p}\right)$	83
28. Рѣшеніе уравненій $\left(\frac{x}{p}\right) = 1, \left(\frac{x}{p}\right) = -1$	85
29. Рѣшенія сравненія $x^2 \equiv q \pmod{p}$, при p простомъ вида $4n+3$.	89
30. О сравненіи $x^2 \equiv q \pmod{p}$, при p составномъ	90

Глава V.

О сравненіяхъ двучленныхъ.

31. О сравненіи $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, при p простомъ	95
32. О сравненіи $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, при p простомъ	100
33. О сравненіи $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, при p составномъ	106

Глава VI.

О сравненіяхъ вида $a^x \equiv A \pmod{p}$.

§§	Стран.
34. О сравненіи $a^x \equiv A \pmod{p}$ вообще и въ особенности о сравненіи $a^x \equiv 1 \pmod{p}$	110
35. О рѣшеніяхъ сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$	114
36. Объ указателяхъ	116
37. О рѣшеніи двучленныхъ сравненій помощію таблицъ указателей	120
38. Теоремы для опредѣленія первообразныхъ корней	126
39. Опредѣленіе первообразныхъ корней	127
40. Другой способъ опредѣленія первообразныхъ корней	129
41. О числѣ первообразныхъ корней	134

Глава VII.

О сравненіяхъ второй степени съ двумя неизвѣстными.

42. О сравненіи $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p}$	137
43. О дѣлителяхъ $x^2 \pm Ay^2$	139
44. Опредѣленіе дѣлителей $x^2 \pm Ay^2$ при A простомъ	147
45. О свойствахъ квадратичныхъ формъ	155
46. О выраженіи ими дѣлителей $x^2 \pm ay^2$	160
47. Опредѣленіе линейныхъ дѣлителей помощію квадратичныхъ формъ	166

Глава VIII.

Приложеніе Теоріи сравненій къ разложенію чиселъ на простые множители.

48. Разложеніе чиселъ на простые множители приводятся къ опредѣленію дѣлителей	178
49. Опредѣленіе дѣлителей чиселъ вида $a^m \pm 1$	179
50. Опредѣленіе дѣлителей чиселъ на основаніи теоріи дѣлителей $x^2 \pm ay^2$	183

ПРИБАВЛЕНІЯ.

I. О квадратичныхъ вычетахъ	193
II. Объ опредѣленіи первообразныхъ корней	203
III. Объ опредѣленіи числа простыхъ чиселъ, не превосходящихъ данной величины	209

ТАБЛИЦЫ.

§§.	Стран.
1) Простых чиселъ до 6000	231
2) Указателей и первообразныхъ корней для простыхъ модулей, не превосходящихъ 200.....	235
3) Линейныхъ дѣлителей $x^2 - ay^2$ отъ $a = 1$ до $a = 101$	265
4) Линейныхъ дѣлителей $x^2 - ay^2$ отъ $a = 1$ до $a = 101$	273

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ.

§ 1. Теорія чиселъ, иначе называемая Трансцендентною Ариометикою, есть наука о рѣшеніи неопредѣленныхъ уравненій въ числахъ цѣлыхъ. Заимствуя понятія о числахъ изъ Ариометики и объ уравненіяхъ изъ Алгебры и Трансцендентнаго Анализа, она въ тоже время существенно отлична отъ этихъ наукъ. Она отличается отъ Ариометики тѣмъ, что разсматриваетъ числа только въ отношеніи ихъ способности удовлетворять неопредѣленнымъ уравненіямъ того или другаго вида, и слѣд. остается независимою отъ системы нумераціи, на которой основываются дѣйствія Ариометики. Она отличается отъ Алгебры и другихъ частей опредѣленнаго анализа тѣмъ, что, разсматривая уравненія, она ограничивается только цѣлыми значеніями неизвѣстныхъ.

Разсматривая такимъ образомъ и числа и уравненія съ особенной точки зрѣнія, Теорія чиселъ доходитъ до результатовъ совершенно новыхъ и весьма важныхъ для Ариометики и Теоріи опредѣленныхъ уравненій. Первой она облегчаетъ выкладки, по огромности своей невыполнимыя безъ ея помощи; второй она открываетъ путь къ рѣшенію вопросовъ, безъ помощи ея не разрѣшимыхъ.

Всякое уравненіе, заключающее нѣсколько переменныхъ, подлежитъ изслѣдованію Теоріи чиселъ. Но не всѣ они одинаково доступны изслѣдованію и не всѣ они имѣютъ одинаковую важность

по приложеніямъ своимъ. Теорія чиселъ до сихъ поръ ограничивается только разсмотрѣніемъ уравненій наиболѣе простыхъ и въ тоже время имѣющихъ наиболѣе важныя приложенія. Изъ этихъ уравненій особеннаго вниманія заслуживаютъ тѣ, которыя заключаютъ одно изъ неизвѣстныхъ въ первой степени; они замѣчательны какъ по свойствамъ своимъ, такъ и по приложеніямъ къ упрощенію дѣйствій Ариѳметики и рѣшенію вопросовъ, касающихся опредѣленнаго анализа. Эти то уравненія составляютъ предметъ изслѣдованія Теоріи сравненій.

§ 2. Прежде чѣмъ приступимъ къ изслѣдованію этихъ уравненій, мы остановимся на свойствахъ чиселъ, извѣстныхъ намъ частію изъ Ариѳметики и изложимъ ихъ съ надлежащею подробностію.

Всѣ числа раздѣляются на два рода: простыя и составныя. Простымъ называется такое число, которое можетъ дѣлиться только на 1 и самого себя. Составнымъ называется такое число, которое можетъ дѣлиться на другое число, болѣе 1. Такъ 2, 3, 5, 7, 11 и проч. суть числа простыя, а 4, 6, 8, 9, 10 и проч. суть числа составныя.

Не трудно убѣдиться въ томъ, что простыхъ чиселъ безконечное множество. Въ самомъ дѣлѣ, допустивши противное и называя черезъ N наибольшее изъ простыхъ чиселъ, мы должны допустить, что всѣ числа болѣе N суть составныя и слѣд. происходятъ отъ перемноженія 2, 3, 5, 7, 11, . . . N , взятыхъ въ нѣкоторыхъ степеняхъ. Но несправедливость этого обнаруживается числомъ 1. 2. 3. 4. 5 . . . ($N-1$). $N+1$, которое, очевидно, не дѣлится на числа 2, 3, 5, 7, 11, . . . N и слѣд. перемноженіемъ ихъ степеней не можетъ быть составлено. И такъ нельзя допустить, чтобы простыхъ чиселъ было не безконечное множество.

Для опредѣленія всѣхъ простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла N , способъ самый простой состоитъ въ томъ, чтобы въ рядѣ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, . . . $N-1$, N

выкидывать послѣдовательно числа кратныя 2, 3, 5, 7, . . . и т. д. А это, очевидно, можетъ быть выполнено зачеркиваніемъ въ рядѣ

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, . . . $N-1$, N чиселъ чрезъ 1, считая отъ 2, чрезъ 2 считая отъ 3, чрезъ 4 считая отъ 5, и вообще черезъ $n-1$ чиселъ считая отъ числа n . Такимъ образомъ въ этомъ рядѣ исключатся всѣ числа составныя и останутся одни лишь простые числа.

§ 3. Два или нѣсколько чиселъ называются относительно простыми, если они не имѣютъ общаго множителя. Такъ числа 10 и 21 суть относительно простые. Изъ сказаннаго нами о числахъ относительно простыхъ слѣдуетъ, какъ частный случай, что если A , будучи само по себѣ простымъ числомъ, не дѣлится B , то A и B , суть числа относительно другъ друга простые. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ числа A и B не могутъ имѣть общимъ дѣлителемъ 1-е) ни числа отличнаго отъ A ; ибо A будучи простымъ числомъ не можетъ дѣлиться на другое число, 2-е) ни самого A ; ибо B по положенію на A не дѣлится. Замѣчая, что если B меньше A , то B на A дѣлиться не можетъ, мы по предыдущему заключаемъ, что при B меньшемъ A и A простымъ числа B и A будутъ относительно другъ друга простые. Это свойство чиселъ можетъ быть выражено такъ: «всякое число, мѣньшее даннаго простаго числа, есть относительно его простое число». Такъ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, суть простые относительно 11.

Отсюда не трудно вывести такое заключеніе:

Два числа не равныя между собою и само по себѣ простые суть относительно другъ друга простые.

§ 4. Мы теперь займемся изложеніемъ свойствъ чиселъ относительно простыхъ.

1. ТЕОРЕМА.

Если A и B суть числа простые относительно S ; то и произведеніе ихъ AB есть число простое относительно S .

Доказательство. Для доказательства этой теоремы ищем общего наибольшего дѣлителя чиселъ A и S . Для этого, какъ извѣстно изъ Ариометики, должны A дѣлить на S , полученнымъ при этомъ остаткомъ должны дѣлить S , новымъ остаткомъ дѣлить первый остатокъ и т. д. Послѣдній остатокъ будетъ 1; ибо A и S , какъ числа относительно простыя, общего дѣлителя имѣть не могутъ. Если же мы изобразимъ черезъ $q, q_1, q_2, \dots, q_n$ частныя, получаемыя при этихъ дѣленіяхъ, а черезъ $r, r_1, r_2, \dots, r_{n-2}, r_{n-1}, r_n$ остатки; то приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ и замѣчая, что послѣдній остатокъ r_n равенъ 1, получаемъ такія уравненія:

$$A = Sq + r, \quad S = rq_1 + r_1, \quad r = r_1 q_2 + r_2, \dots, \quad r_{n-2} = r_{n-1} q_n + 1,$$

которыя по умноженіи на B дадутъ

$$\left. \begin{aligned} AB &= BSq + Br, & BS &= Brq_1 + Br_1, \\ Br &= Br_1 q_2 + Br_2, & \dots, & Br_{n-2} = Br_{n-1} q_n + B \end{aligned} \right\} (1).$$

Первое изъ этихъ уравненій показываетъ, что общій дѣлитель AB и S будетъ дѣлить Br , второе, что этотъ дѣлитель будетъ дѣлить Br_1 , третье, что онъ будетъ дѣлить Br_2 , и т. д., наконецъ послѣднее, что общій дѣлитель AB и S будетъ дѣлить B . Но B и S , по положенію, не имѣютъ общаго дѣлителя; слѣд. не имѣютъ его AB и S , что и слѣдовало доказать.

Распространяя эту теорему на нѣсколько простыхъ чиселъ относительно $S_0, S_1, S_2, \dots$, мы убѣждаемся, что числа $ABCD \dots$ и $S_0 S_1 S_2 \dots$ суть относительно другъ друга простыя, если $A, B, C, D, \dots$ всѣ суть числа простыя относительно каждаго изъ чиселъ $S_0, S_1, S_2, \dots$.

2. ТЕОРЕМА.

Если S , будучи простымъ числомъ относительно A , дѣлитъ произведеніе AB ; то оно дѣлитъ и B .

Доказательство. Для доказательства этой теоремы мы выводимъ уравненія (1) и изъ этихъ уравненій замѣчаемъ, что дѣлимость AB на S предполагаетъ дѣлимость на S чиселъ Br , Br_1 , $Br_2, \dots$ и наконецъ дѣлимость B , что и слѣдовало доказать.

3. ТЕОРЕМА.

Если изъ двухъ чиселъ A и B , простыхъ между собою, каждое дѣлится S ; то и произведение ихъ AB дѣлится S .

Доказательство. Называя черезъ L частное отъ дѣленія S на A , мы для опредѣленія величины S будемъ имѣть

$$S = AL;$$

откуда слѣдуетъ дѣлимость AL на B ; ибо по положенію S дѣлится на B . Но по предыдущей теоремѣ дѣлимость AL на B , гдѣ B число простое съ A , предполагаетъ дѣлимость L на B . Называя же черезъ M число, получаемое при этомъ дѣленіи, мы будемъ имѣть

$$L = BM;$$

вслѣдствіе чего предыдущее уравненіе дастъ

$$S = ABM;$$

откуда ясно видна дѣлимость S на AB , что и слѣдовало доказать.

Распространяя эту теорему на нѣсколько чиселъ, мы заключаемъ, что S дѣлится на $ABCD \dots$, если оно дѣлится на каждое изъ чиселъ A , B , C , $D, \dots$ и числа A , B , C , $D, \dots$ простые между собою.

§ 5. Мы приступимъ теперь къ разсмотрѣнію свойствъ чиселъ, обнаруживающихся при ихъ разложеніи на простые множители.

Извѣстно изъ Ариѳметики, что всякое число можетъ быть разложено на произведеніе простыхъ чиселъ. Означая черезъ α , β , $\gamma, \dots$ различныя простые числа, входящія въ составъ

N и через $m, n, p, \dots$ степени ихъ, мы будемъ имѣть

$$N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$$

Изъ этого уравненія, на основаніи 1-й теоремы мы заключаемъ, что N есть простое число относительно всѣхъ чиселъ простыхъ само по себѣ и отличныхъ отъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$. Въ самомъ дѣлѣ, по § 3 всякое простое число, отличное отъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ будетъ также простымъ относительно $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ и слѣд. относительно его будетъ простымъ числомъ произведение $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$. Отсюда мы можемъ заключить вообще, что всякое число не можетъ дѣлиться на простое число, въ составъ его не входящее. Что же касается до дѣлимости N , которое мы предположили равнымъ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$, на степени чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ въ составъ его входящихъ, то также не трудно убѣдиться, что оно не можетъ дѣлиться на $\alpha^{m'}$ при $m' > m$, на $\beta^{n'}$ при $n' > n$ и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ $N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$; то частное отъ дѣленія N на $\alpha^{m'}$ представится дробью

$$\frac{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots}{\alpha^{m'}}, \text{ или } \frac{\beta^n \gamma^p \dots}{\alpha^{m'-m}},$$

что при $m' > m$ не можетъ быть числомъ цѣлымъ; ибо α , будучи числомъ простымъ отличнымъ отъ $\beta, \gamma, \dots$, по замѣченному нами, дѣлится $\beta^n \gamma^p \dots$ не можетъ. Итакъ N можетъ дѣлиться только на степени $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, не превосходящія $m, n, p, \dots$ и слѣд. число N можетъ дѣлиться только на числа, въ составъ которыхъ входятъ одни простые числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ и въ степеняхъ непревосходящихъ $m, n, p, \dots$. Такимъ образомъ доходимъ мы до слѣдующей теоремы:

4. ТЕОРЕМА.

Число N можетъ дѣлиться на число P только въ томъ случаѣ, когда всѣ простые множители числа P входятъ въ составъ N и въ N степени ихъ не ниже чѣмъ въ P .

На основаніи этой теоремы не трудно доказать слѣдующую:

5. Т Е О Р Е М А.

Для числа N возможно одно только разложеніе на простые множители.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, если мы допустимъ для числа N два разложенія на простые множители, такъ:

$$N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots, \quad N = \alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots;$$

то, дѣля эти уравненія одно на другое, найдемъ

$$\frac{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots}{\alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots} = 1, \quad \frac{\alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots}{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots} = 1.$$

Первое изъ этихъ уравненій по предыдущей теоремѣ предполагаетъ, что всѣ числа $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \dots$ находятся въ рядѣ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, а второе обратно, что всѣ числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ находятся въ рядѣ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \dots$; откуда слѣдуетъ, что числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ и $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \dots$ суть однѣ и тѣ-же. Принимая же $\alpha = \alpha_1, \beta = \beta_1, \gamma = \gamma_1, \dots$, мы по предыдущей теоремѣ изъ уравненія

$$\frac{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots}{\alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots} = 1$$

имѣемъ

$$m' \text{ не } > m, \quad n' \text{ не } > n, \quad p' \text{ не } > p, \dots;$$

Подобнымъ образомъ уравненіе

$$\frac{\alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots}{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots} = 1$$

предполагаетъ $m \text{ не } > m', \quad n \text{ не } > n', \quad p \text{ не } > p', \dots$

Изъ соединенія же этихъ неравенствъ съ предыдущими находимъ

$$m = m', \quad n = n', \quad p = p', \dots$$

Итакъ разсматриваемыя нами два разложенія числа N не

разнятся между собою ни простыми числами ни степенями ихъ; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

§ 6. Разложеніемъ чиселъ на простые множители легко доказать слѣдующія теоремы:

6. Т Е О Р Е М А.

Если N дѣлится квадратъ числа M и не можетъ дѣлиться на квадратъ какого-либо числа; то N дѣлится также M .

Доказательство. Разложеніемъ числа N на простые множители мы находимъ

$$N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$$

Но такъ какъ N по положенію не можетъ дѣлиться на квадратъ какого либо числа, то здѣсь показатели $m, n, p, \dots$ не могутъ превосходить 1; ибо въ противномъ случаѣ при $m \geq 2$ число N , очевидно, дѣлилось бы на α^2 , при $n \geq 2$ оно дѣлилось бы на β^2 , и т. д. Слѣд. въ предыдущемъ уравненіи всѣ показатели $m, n, p, \dots$ равны 1; а потому

$$N = \alpha\beta\gamma\dots,$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ простыя числа, различныя между собою. Убѣдясь въ этомъ, разлагаемъ M на простые множители; это даетъ намъ

$$M = \alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots \dots \dots (2),$$

гдѣ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \dots$ различныя простыя числа. Изъ этого уравненія мы выводимъ

$$M^2 = \alpha_1^{2m'} \beta_1^{2n'} \gamma_1^{2p'} \dots,$$

и замѣчая, что по положенію, M^2 дѣлится на N , гдѣ $N = \alpha\beta\gamma\dots$, мы по теоремѣ 4-й заключаемъ, что въ рядѣ $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \dots$ заключаются всѣ числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ и что степени ихъ въ составѣ M^2 не суть 0. Слѣд. всѣ числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ входятъ въ составъ M и слѣд. M дѣлится на $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ и вмѣстѣ съ тѣмъ (см.

теорему 3) дѣлится и на произведеніе ихъ, равное N , что и слѣдовало доказать.

Такъ замѣчая, что 15 не можетъ дѣлиться на квадратъ какого либо числа и что оно дѣлится 45^2 , равное 2025, мы заключаемъ, что 15 будетъ также дѣлится 45.

7. ТЕОРЕМА.

Корень h -й степени числа N только въ томъ случаѣ есть число цѣлое, когда степени простыхъ множителей его суть числа кратныя h .

Доказательство. Разложениемъ числа N и корня его h -й степени на простые множители находимъ

$$N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots, \sqrt[h]{N} = \alpha_1^{m'} \beta_1^{n'} \gamma_1^{p'} \dots$$

Первое изъ этихъ уравненій и второе по возведеніи его въ степень h даютъ слѣдующія два разложенія числа N на простые множители:

$$N = \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots, N = \alpha_1^{hm'} \beta_1^{hn'} \gamma_1^{hp'} \dots$$

Но по теоремѣ 5-й эти разложенія должны быть тождественны. А потому числа α , β , γ , должны быть равны числамъ α_1 , β_1 , γ_1 , и числа m , n , p , должны имѣть равныхъ въ рядѣ hm' , hn' , hp' , ; послѣднее ясно обнаруживаетъ, что m , n , p , суть числа кратныя h , въ чемъ и заключается предложенная теорема.

Такъ находя число 576 равнымъ $2^6 3^2$ и замѣчая, что здѣсь показатели 6 и 2 имѣютъ общимъ дѣлителемъ только 2, мы заключаемъ, что изъ всѣхъ корней числа 576 только корень квадратный имѣетъ значеніе цѣлое.

8. ТЕОРЕМА.

Если N разложениемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$; то сумма различныхъ дѣлителей N есть

$\frac{\alpha^{m+1}-1}{\alpha-1} \cdot \frac{\beta^{n+1}-1}{\beta-1} \cdot \frac{\gamma^{p+1}-1}{\gamma-1} \dots$, а число ихъ есть
 $(m+1)(n+1)(p+1) \dots$

Доказательство. По 4-й теоремѣ число N , какъ равное $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$, можетъ дѣлиться только на числа равныя $\alpha^{m'} \beta^{n'} \gamma^{p'} \dots$, гдѣ $m' \leq m$, $n' \leq n$, $p' \leq p$, $\dots$. Поэтому всѣ дѣлители числа N опредѣлятся значеніями $\alpha^{m'} \beta^{n'} \gamma^{p'} \dots$, соотвѣствующими

$$\begin{aligned} m' &= 0, 1, 2, \dots, m-1, m, \\ n' &= 0, 1, 2, \dots, n-1, n, \\ p' &= 0, 1, 2, \dots, p-1, p, \\ &\dots \end{aligned}$$

и слѣд. найдутся въ рядѣ членовъ, получаемыхъ перемноженіемъ выраженій

$$\begin{aligned} &\alpha^0 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1} + \alpha^m, \\ &\beta^0 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^{n-1} + \beta^n, \\ &\gamma^0 + \gamma + \gamma^2 + \dots + \gamma^{p-1} + \gamma^p, \\ &\dots \end{aligned}$$

А поэтому сумма дѣлителей числа N опредѣлится произведеніемъ $(\alpha^0 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1} + \alpha^m)(\beta^0 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^{n-1} + \beta^n) \times$
 $(\gamma^0 + \gamma + \gamma^2 + \dots + \gamma^{p-1} + \gamma^p) \dots$,
 которое равно

$$\frac{\alpha^{m+1}-1}{\alpha-1} \cdot \frac{\beta^{n+1}-1}{\beta-1} \cdot \frac{\gamma^{p+1}-1}{\gamma-1} \dots;$$

ибо

$$\begin{aligned} \alpha^0 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1} + \alpha^m &= \frac{\alpha^{m+1}-1}{\alpha-1}, \\ \beta^0 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^{n-1} + \beta^n &= \frac{\beta^{n+1}-1}{\beta-1}, \\ \gamma^0 + \gamma + \gamma^2 + \dots + \gamma^{p-1} + \gamma^p &= \frac{\gamma^{p+1}-1}{\gamma-1}, \\ &\dots \end{aligned}$$

Число же дѣлителей N опредѣлится числомъ членовъ произведенія

$$(\alpha^0 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1} + \alpha^m) (\beta^0 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^{n-1} + \beta^n)$$

$$(\gamma^0 + \gamma + \gamma^2 + \dots + \gamma^{p-1} + \gamma^p) \dots \dots \dots ,$$

или, что одно и тоже, значеніемъ этого выраженія при $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$, Слѣд. число дѣлителей N есть

$$(m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots$$

Такъ для числа 72, равнаго $2^3 \cdot 3^2$, сумма дѣлителей опредѣлится выраженіемъ $\frac{2^4 - 1}{2 - 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3 - 1}$, что равняется 195, а число дѣлителей 72 будетъ $(3 + 1) \times (2 + 1)$, или 12. Въ справедливости этихъ заключеній мы убѣждаемся, замѣтивъ, что дѣлители 72 суть

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72,$$

которыхъ сумма равна 195, а число ихъ 12.

9. ТЕОРЕМА.

Если N разложениемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$, и въ по крайней мѣрѣ одно изъ чиселъ m , n , p , есть нечетное; то для числа N возможно $\frac{1}{2} (m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots$ различныхъ разложеній на два множителя.

Если же всѣ показатели m , n , p , числа четныя; то для N возможно $\frac{1}{2} (m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots + \frac{1}{2}$ такихъ разложеній.

Доказательство. Въ первомъ случаѣ по 7-ой теоремѣ нѣтъ числа, котораго бы квадратъ равнялся N , а потому число N не можетъ разлагаться на произведеніе двухъ множителей равныхъ между собою и слѣд. всякое разложеніе числа N на два множителя опредѣлитъ два дѣлителя его. Откуда ясно, что число разложеній N на два множителя равно половинѣ числа его дѣлите-

лей и слѣд. по предыдущей теоремѣ оно равно

$$\frac{1}{2} (m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots$$

Во второмъ случаѣ, — въ случаѣ $m, n, p, \dots$ четныхъ, въ числѣ разложеній N на два множителя будетъ между прочимъ такое, въ которомъ оба множителя равны и которымъ слѣдовательно опредѣлится одинъ дѣлитель числа N ; затѣмъ всѣ остальные разложенія, какъ и въ первомъ случаѣ, дадутъ по два дѣлителя. Итакъ, называя черезъ K искомое число разложеній N на два множителя, мы найдемъ $1 + 2 (K - 1)$ для числа дѣлителей N . Но по предыдущей теоремѣ число дѣлителей N есть $(m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots$. Слѣдовательно

$$1 + 2 (K - 1) = (m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots;$$

откуда для величины K находимъ

$$K = \frac{1}{2} (m + 1) (n + 1) (p + 1) \dots + \frac{1}{2},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ для числа 72, равнаго $2^3 \cdot 3^2$, число разложеній на два множителя должно быть $\frac{1}{2} (3 + 1) (2 + 1)$, или 6. Дѣйствительно находимъ мы, что для 72 возможны только слѣдующія 6 разложеній на два множителя

$$1 \cdot 72, 2 \cdot 36, 3 \cdot 24, 4 \cdot 18, 6 \cdot 12, 8 \cdot 9.$$

Для числа же 36, равнаго $2^2 \cdot 3^2$, число различныхъ разложеній на два множителя будетъ $\frac{1}{2} (2 + 1) \times (2 + 1) + \frac{1}{2}$, или 5. Дѣйствительно для 36 возможны только слѣдующія разложенія на два множителя

$$1 \cdot 36, 2 \cdot 18, 3 \cdot 12, 4 \cdot 9, 6 \cdot 6.$$

§ 7. Прежде чѣмъ пойдемъ далѣе, мы докажемъ относительно дѣлимости чиселъ, составляющихъ арифметическую прогрессию, слѣдующую теорему, которая намъ будетъ нужна теперь и впослѣдствіи.

одинъ изъ нихъ необходимо будетъ нулемъ; ибо предполагая противное и замѣчая, что кромѣ нуля относительно остатковъ отъ дѣленія чиселъ на p можно сдѣлать только $p - 1$ предположеній

$$1, 2, 3, \dots, p-1,$$

мы должны бы были допустить, что въ числѣ p остатковъ отъ дѣленія

$$a + npd, a + npd + d, a + npd + 2d, \dots, a + np + (p-1)d$$

есть два по крайней мѣрѣ равные, что по доказанному нами невозможно.

Убѣдясь такимъ образомъ, что въ рядѣ

$$a + npd, a + npd + d, a + npd + 2d, \dots, a + npd + (n-1)d$$

и слѣд. въ каждомъ изъ (3) число членовъ дѣлящихся на p есть 1, мы заключаемъ, что во всѣхъ m рядахъ (3) число членовъ дѣлящихся на p есть m . Но совокупность всѣхъ этихъ рядовъ, какъ видѣли, составляетъ разсматриваемую нами прогрессию

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + (mp-2)d, a + (mp-1)d;$$

откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Изъ этой теоремы не трудно вывести слѣдующую:

11. ТЕОРЕМА.

Если a число простое само по себѣ и A простое съ a ; то въ рядѣ $1, 2, 3, \dots, aAN-1, aAN$ число членовъ простыхъ съ A къ числу членовъ простыхъ съ A и a относится какъ a къ $a-1$.

Доказательство. Въ Арифметикѣ доказано, что общій наибольшій дѣлитель чиселъ X и A есть также общій наибольшій дѣлитель числа A и остатка отъ дѣленія X на A . Отсюда слѣдуетъ, что если X и A не имѣютъ общаго дѣлителя, то и остатокъ отъ дѣленія X на A будетъ число простое съ A и обратно,

если остатокъ отъ дѣленія X на A есть число простое съ A , то X также число простое съ A . Но такъ какъ остатокъ отъ дѣленія на A будетъ всегда менѣе A , то при X простомъ съ A остатокъ отъ дѣленія X на A будетъ всегда одно изъ чиселъ менѣе A и простыхъ съ A . Пусть же

$$\alpha', \alpha'', \alpha''', \dots \alpha^{(n)}$$

будутъ числа простыя съ A и меньшія A ; нетрудно опредѣлить видъ числа X , для котораго остатокъ отъ дѣленія на A былъ бы равенъ одному изъ чиселъ $\alpha', \alpha'', \alpha''', \dots \alpha^{(n)}$. Такъ, чтобы найти X , которое при дѣленіи на A даетъ остатокъ α' , пусть будетъ m' частное отъ дѣленія X на A ; приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное сложенному съ остаткомъ, мы находимъ для выраженія X слѣдующую формулу:

$$X = \alpha' + m' A.$$

Также находимъ слѣдующія формулы для чиселъ, которыхъ остатки отъ дѣленія на A суть $\alpha', \alpha'', \alpha''', \dots \alpha^{(n)}$:

$$X = \alpha' + m' A; X = \alpha'' + m'' A, \dots X = \alpha^{(n)} + m^{(n)} A.$$

Итакъ всѣ числа, которыя при дѣленіи на A даютъ остатки равные $\alpha', \alpha'', \alpha''' \dots \alpha^{(n)}$ и слѣд. по замѣченному нами, суть числа простыя съ A , выразятся такимъ образомъ

$$X = \alpha' + m' A, X = \alpha'' + m'' A, X = \alpha''' + m''' A, \dots X = \alpha^{(n)} + m^{(n)} A.$$

Такъ выражаются всѣ числа простыя съ A . На основаніи этихъ формулъ легко доказать предложенную нами теорему.

Съ этою цѣлію мы опредѣляемъ по этимъ формуламъ всѣ числа простыя съ A и меньшія aAN , давая въ нихъ буквамъ $m', m'', m''', \dots m^{(n)}$ значенія 0, 1, 2, 3, и т. д. до тѣхъ поръ, пока числа, опредѣляемые этими формулами, не будутъ болѣе aAN .

Такъ находимъ, что всѣ числа простыя съ A и меньшія aAN

суть

$$\begin{aligned} \alpha', \alpha' + A, \alpha' + 2A, \dots, \alpha' + (aN - 1)A, \\ \alpha'', \alpha'' + A, \alpha'' + 2A, \dots, \alpha'' + (aN - 1)A, \\ \alpha''', \alpha''' + A, \alpha''' + 2A, \dots, \alpha''' + (aN - 1)A, \\ \dots \dots \dots \alpha^{(n)}, \alpha^{(n)} + A, \alpha^{(n)} + 2A, \dots, \alpha^{(n)} + (aN - 1)A. \end{aligned}$$

и всѣхъ ихъ, какъ не трудно замѣтить, счетомъ есть aNn .

Теперь не трудно показать число простыхъ чиселъ съ A и a и въ тоже время меньшихъ aAN . Для этого стоитъ только въ найденныхъ нами числахъ, простыхъ съ A , выкинуть числа кратныя a ; ибо a число само по себѣ простое и слѣд. по § 3 всѣ числа, не дѣлящіяся на него, будутъ простыя съ нимъ. Но по предыдущей теоремѣ въ рядѣ

$$\alpha', \alpha' + A, \alpha' + 2A, \alpha' + 3A, \dots, \alpha' + (aN - 1)A$$

число членовъ дѣлящихся на a есть N ; слѣд. простыхъ съ a здѣсь $aN - N$, или $(a - 1)N$. Также замѣчаемъ о прочихъ рядахъ

$$\begin{aligned} \alpha'', \alpha'' + A, \alpha'' + 2A, \dots, \alpha'' + (aN - 1)A, \\ \alpha''', \alpha''' + A, \alpha''' + 2A, \dots, \alpha''' + (aN - 1)A, \\ \dots \dots \dots \alpha^{(n)}, \alpha^{(n)} + A, \alpha^{(n)} + 2A, \dots, \alpha^{(n)} + (aN - 1)A. \end{aligned}$$

Откуда слѣдуетъ, что чиселъ меньшихъ aAN и простыхъ съ A и a будетъ $(a - 1)Nn$. Но это число къ числу всѣхъ чиселъ меньшихъ aAN и простыхъ съ A , которое, какъ видѣли, есть aNn , относится какъ $a - 1$ къ a , что и слѣдовало доказать.

На основаніи теоремъ изложенныхъ нами не трудно будетъ доказать слѣдующую теорему:

12. ТЕОРЕМА.

Если N разложеніемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$; то число чиселъ простыхъ съ N и меньшихъ N есть $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \dots \frac{\pi-1}{\pi}$.

Доказательство. На основаніи предыдущихъ теоремъ не трудно показать сколько чиселъ простыхъ съ $\alpha, \beta, \gamma \dots \pi$, въ рядѣ

$$1, 2, 3, \dots, \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r.$$

Для этого мы пишемъ этотъ рядъ въ видѣ арифметической прогрессіи съ разностию равною 1 такимъ образомъ:

$$1, 1 + 1, 1 + 2, 1, \dots, 1 + (\alpha \cdot \alpha^{m-1} \beta^n \gamma^p \dots \pi^r - 1).$$

На основаніи 10-й теоремы мы заключаемъ, что здѣсь членовъ дѣлящихся на α есть $\alpha^{m-1} \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$; затѣмъ остальные, числомъ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r - \alpha^{m-1} \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$, или $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha}$, будутъ простые съ α (см. § 3). Итакъ въ рядѣ

$$1, 2, 3, \dots, \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$$

число членовъ простыхъ съ α есть $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha}$.

Отсюда по 11-й теоремѣ мы заключаемъ, что число членовъ простыхъ съ α и β , или, что одно и тоже, простыхъ съ произведеніемъ $\alpha\beta$ есть $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta}$; далѣе по той же теоремѣ, зная, что число членовъ въ рядѣ

$$1, 2, 3, \dots, \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$$

простыхъ съ $\alpha\beta$ есть $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta}$, мы находимъ, что здѣсь число членовъ простыхъ съ $\alpha\beta\gamma$ есть

$$\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma}, \text{ и т. д.}$$

Наконецъ найдемъ такимъ образомъ, что число членовъ простыхъ съ $\alpha\beta\gamma\dots\pi$ есть

$$\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \dots \frac{\pi-1}{\pi}.$$

Такъ опредѣляется число чиселъ простыхъ съ $\alpha\beta\gamma\dots\pi$ и меньшихъ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$. Но это все равно, какъ бы мы разсматривали числа простые съ N , или $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$; ибо всѣ числа простые относительно $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$ суть простые относительно $\alpha\beta\gamma\dots\pi$ и обратно. Въ этомъ мы убѣждаемся тѣмъ, что относительно $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$, также какъ относительно $\alpha\beta\gamma\dots\pi$, всякое число будетъ простое, если въ составъ его нѣтъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \pi$; въ противномъ же случаѣ оно не будетъ простымъ ни относительно $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$, ни относительно $\alpha\beta\gamma\dots\pi$.

Итакъ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \dots \frac{\pi-1}{\pi}$ есть число членовъ въ рядѣ

$$1, 2, 3, \dots, \alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$$

простыхъ съ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \pi^r$, что и слѣдовало доказать.

Такъ для опредѣленія сколько чиселъ простыхъ съ 36 и меньшихъ 36, мы разлагаемъ 36 на простые множители. Находя, что 36 равно $2^2 \cdot 3^2$, мы по доказанной нами теоремѣ заключаемъ, что всѣхъ чиселъ простыхъ съ 36 и меньшихъ 36 есть $2^2 \cdot 3^2 \frac{2-1}{2} \cdot \frac{3-1}{3}$, или 12. Дѣйствительно, между всѣми числами отъ 1 до 36 мы находимъ 12 чиселъ

$$1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35$$

простыхъ съ 36; всѣ же прочія

$$2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,$$

$$20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34$$

суть не простые съ 36.

Этимъ мы оканчиваемъ изложеніе свойствъ чиселъ, необходимыхъ намъ въ послѣдствіе, и переходимъ къ изслѣдованію сравненій.

ГЛАВА I.

О сравненіяхъ вообще.

§ 8. Теорія сравненій имѣетъ предметомъ изслѣдованіе неопредѣленныхъ уравненій, въ которыя одна изъ неизвѣстныхъ входитъ въ первой степени. Общій видъ этихъ уравненій есть

$$F(x, y, z, \dots) = Au + B,$$

гдѣ F данная функція, A и B извѣстныя числа. Такъ какъ эти уравненія очень часто употребляются, то для нихъ введено особенное знакоположеніе. Не трудно замѣтить, что при неопредѣленномъ значеніи числа u уравненіе

$$F(x, y, z, \dots) = Au + B,$$

приводясь къ равенству

$$\frac{F(x, y, z, \dots) - B}{A} = u,$$

есть ни что иное, какъ выраженіе дѣлимости разности

$$F(x, y, z, \dots) - B$$

на A . А потому мы можемъ представить это уравненіе такъ

$$F(x, y, z, \dots) \equiv B \pmod{A},$$

означая вообще знакомъ $\equiv$, поставленнымъ между двумя числами, дѣлимость разности ихъ на третье число, которое съ словами *мод.* поставляемъ въ скобкахъ.

Такъ для означенія, что разность $17 - 5$ дѣлится на 3 будемъ писать

$$17 \equiv 5 \pmod{3}.$$

Выраженія вида

$$M \equiv N \pmod{A}$$

извѣстны подѣ названіемъ сравненій, числа M и N называются сравнимыми по модулю A , число A модулемъ сравненія. Сравнимыя числа M , N могутъ имѣть значенія и положительныя и отрицательныя; во всякомъ случаѣ выраженіе

$$M \equiv N \pmod{A}$$

будетъ означать дѣлимость алгебраической разности $M - N$ на A . Число же A , модуль сравненія, мы будемъ всегда предполагать числомъ положительнымъ.

Замѣтимъ, что по сказанному нами знакоположенію будетъ всегда

$$M \equiv r \pmod{A},$$

если r есть остатокъ отъ дѣленія M на A ; ибо называя черезъ q частное при дѣленіи M на A и приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$M = Aq + r,$$

откуда ясно, что разность M и r дѣлится на A .

Не трудно также убѣдиться въ обратномъ, что если при M и r положительныхъ число r меньше A и сравнимо съ M по модулю A ; то r есть остатокъ отъ дѣленія M на A ; ибо изъ сравненія $M \equiv r \pmod{A}$ выходитъ $\frac{M-r}{A} = q$; откуда $M = Aq + r$, а это уравненіе при $r < A$ и $r = > 0$ обнаруживаетъ въ r остатокъ отъ дѣленія M на A .

Изъ того, что дѣлимое сравнимо съ остаткомъ, если дѣлитель принять за модуль, какъ частный случай, мы выводимъ, что если M дѣлится на A безъ остатка; то

$$M \equiv 0 \pmod{A}.$$

На основаніи этого мы будемъ говорить часто, что число

сравнимо съ 0 по модулю A , вмѣсто того, чтобы говорить, что оно дѣлится на A .

§ 9. Изъ понятія, составленнаго нами о сравненіяхъ, не трудно обнаружить въ нихъ слѣдующія свойства:

1) *Два числа, сравнимыя съ однимъ и тѣмъ же числомъ по какому либо модулю, сравнимы и между собою по тому же модулю.* Въ самомъ дѣлѣ, если $M \equiv N \pmod{A}$, $M' \equiv N \pmod{A}$; то и $M \equiv M' \pmod{A}$; ибо сравненія $M \equiv N \pmod{A}$, $M' \equiv N \pmod{A}$ предполагаютъ, что A дѣлитъ разности $M - N$, $M' - N$ и слѣд. дѣлитъ разность этихъ разностей. Но эта послѣдняя разность есть $M - M'$ и дѣлимость ея на A выражается сравненіемъ $M \equiv M' \pmod{A}$.

2) *Въ сравненіяхъ, подобно уравненіямъ, члены могутъ быть переносимы изъ одной части въ другую.* Такъ если $M + M' \equiv N \pmod{A}$; то $M \equiv N - M' \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе $M + M' \equiv N \pmod{A}$ выражаетъ дѣлимость $M + M' - N$ на A ; но $M + M' - N$ равно $M - (N - M')$; дѣлимость же этого на A выражается сравненіемъ $M \equiv N - M' \pmod{A}$.

3) *Два или нѣсколько сравненій съ однимъ и тѣмъ же модулемъ могутъ быть почленно складываемы и вычитаемы.* Такъ если $M \equiv N \pmod{A}$, $M' \equiv N' \pmod{A}$; то $M \pm M' \equiv N \pm N' \pmod{A}$. Въ этомъ не трудно убѣдиться, замѣтивъ, что сравненія $M \equiv N \pmod{A}$, $M' \equiv N' \pmod{A}$ предполагаютъ дѣлимость разностей $M - N$, $M' - N'$ на A . Откуда слѣдуетъ дѣлимость на A числа равнаго $M - N \pm (M' - N')$, или $M \pm M' - (N \pm N')$; а это выражается сравненіемъ $M \pm M' \equiv (N \pm N') \pmod{A}$, что и слѣдовало доказать. Отъ соединенія двухъ сравненій не трудно перейти къ соединенію трехъ, четырехъ и т. д.

4) *Члены сравненія могутъ быть умножены на одно число.*

Такъ, если $M \equiv N \pmod{A}$; то $kM \equiv kN \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, по предыдущему свойству, сложивши почленно k одинакихъ сравненій $M \equiv N \pmod{A}$, найдемъ $kM \equiv kN \pmod{A}$. Такъ докажется возможность умножать члены сравненія на всякое цѣлое, положительное число. Чтоже касается до умноженія

на число отрицательное, то мы замѣчаемъ, что если $kM \equiv kN \pmod{A}$; то также $-kM \equiv -kN \pmod{A}$; ибо первое сравненіе предполагаетъ дѣлимость числа $kM - kN$ на A , а это число съ знакомъ $-$ будетъ $-kM + kN$ и дѣлимость его на A выражается сравненіемъ $-kM \equiv -kN \pmod{A}$.

5) *Два или нѣсколько сравненій съ однимъ и тѣмъ же модулемъ могутъ быть почленно перемножены.*

Не трудно убѣдиться, что если $M \equiv N \pmod{A}$ и $M' \equiv N' \pmod{A}$; то $MM' \equiv NN' \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, сравненія $M \equiv N$, $M' \equiv N' \pmod{A}$ выражаютъ дѣлимость чиселъ $M - N$, $M' - N'$ на A . Называя же черезъ q , q' , частныя получаемыя при этихъ дѣленіяхъ, находимъ

$$\frac{M - N}{A} = q, \quad \frac{M' - N'}{A} = q',$$

откуда выходитъ

$$M = Aq + N, \quad M' = Aq' + N'.$$

Эти уравненія по перемноженіи даютъ

$$MM' = A^2 qq' + A(qN' + q'N) + NN',$$

что обнаруживаетъ дѣлимость $MM' - NN'$ на A , и слѣд. сравненіе $MM' \equiv NN' \pmod{A}$.

Если мы перемножимъ такимъ образомъ сравненія $M \equiv N$, $M' \equiv N' \pmod{A}$ между собою, произведеніе ихъ перемножимъ съ $M'' \equiv N'' \pmod{A}$ и т. д.; то мы дойдемъ до сравненія $MM'M'' \dots \equiv NN'N'' \dots \pmod{A}$. Предполагая же здѣсь $M = M' = M'' = \dots$, $N = N' = N'' = \dots$ и называя черезъ k число равныхъ чиселъ M , M' , M'' , $\dots$ N , N' , N'' , $\dots$ найдемъ $M^k \equiv N^k \pmod{A}$. На основаніи этого легко доказать слѣдующее предложеніе:

6) *Значенія цѣлой функціи съ цѣлыми коэффициентами отъ двухъ чиселъ сравнимыхъ по какому нибудь модулю сравнимы по тому же модулю.*

Такъ, если $M \equiv N \pmod{A}$, $fx = ax^m + bx^{m-1} + cx^{m-2} + \dots$,

гдѣ $a, b, c, \dots$ числа цѣлыя; то $f(M) \equiv f(N) \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, изъ сравненія $M \equiv N \pmod{A}$ по доказанному нами сейчасъ выходитъ

$$M^m \equiv N^m, M^{m-1} \equiv N^{m-1}, M^{m-2} \equiv N^{m-2}, \dots \pmod{A};$$

умножая эти сравненія на $a, b, c, \dots$, выводимъ

$$aM^m \equiv aN^m, bM^{m-1} \equiv bN^{m-1}, cM^{m-2} \equiv cN^{m-2}, \dots \pmod{A}.$$

Эти же сравненія, будучи сложены почленно, даютъ

$$aM^m + bM^{m-1} + cM^{m-2} + \dots \equiv aN^m + bN^{m-1} + \\ + cN^{m-2} + \dots \pmod{A},$$

гдѣ замѣняя

$$aM^m + bM^{m-1} + cM^{m-2} + \dots, \\ aN^m + bN^{m-1} + cN^{m-2} + \dots$$

черезъ $f(M), f(N)$, имѣемъ $f(M) \equiv f(N) \pmod{A}$, что и слѣдовало доказать.

7) Члены сравненія могутъ быть сокращены на ихъ общаго множителя, если этотъ множитель число простое съ модулемъ.

Такъ, если $kM \equiv kN \pmod{A}$, гдѣ k число простое съ A ; то $M \equiv N \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе $kM \equiv kN \pmod{A}$ предполагаетъ дѣлимость $kM - kN$, или $k(M - N)$ на A . Но при k простомъ съ A по 2-й теоремѣ это предполагаетъ дѣлимость $M - N$ на A , а это выражается сравненіемъ $M \equiv N \pmod{A}$.

8) Если одна часть сравненія и модуль дѣлятся на какое нибудь число; то на то же число должна дѣлиться и другая часть сравненія; иначе сравненіе не возможно.

Такъ, если $M \equiv kN \pmod{kA}$, то M дѣлится на k . Въ самомъ дѣлѣ, это сравненіе предполагаетъ, что разность $M - kN$ дѣлится на kA . Называя же черезъ q частное отъ этого дѣленія, имѣемъ $\frac{M - kN}{kA} = q$. Откуда выходитъ $M = k(N + Aq)$, что обнаруживаетъ дѣлимость M на k .

9) *Общій множитель членовъ сравненія и модуля можетъ быть сокращенъ.* Такъ если $kM \equiv kN \pmod{kA}$; то $M \equiv N \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе $kM \equiv kN \pmod{kA}$ предполагаетъ дѣлимость $kM - kN$ на kA ; но $\frac{kM - kN}{kA}$ приводится къ $\frac{M - N}{A}$; дѣлимость же $M - N$ на A выражается сравненіемъ $M \equiv N \pmod{A}$.

10) *Два числа, сравнимыя по двумъ или нѣсколькимъ модулямъ простымъ между собою, сравнимы и по произведенію ихъ.* Такъ, если $M \equiv N \pmod{A}$, $M \equiv N \pmod{A'}$, гдѣ A, A' числа простыя между собою; то $M \equiv N \pmod{AA'}$. Въ самомъ дѣлѣ, сравненія $M \equiv N \pmod{A}$, $M \equiv N \pmod{A'}$ предполагаютъ дѣлимость $M - N$ на A и A' . Но при A и A' простыхъ между собою эта дѣлимость (теор. 3) предполагаетъ дѣлимость $M - N$ на произведеніе AA' , что выражается сравненіемъ $M \equiv N \pmod{AA'}$. На основаніи этого, имѣя нѣсколько сравненій $M \equiv N \pmod{A}$, $M \equiv N \pmod{A'}$, $M \equiv N \pmod{A''}$, гдѣ всѣ числа $A, A', A'', \dots$ суть простыя относительно другъ друга, мы изъ соединенія двухъ первыхъ находимъ $M \equiv N \pmod{AA'}$; соединяя же это сравненіе съ $M \equiv N \pmod{A''}$, получаемъ $M \equiv N \pmod{AA' A''}$ и такъ далѣе, въ чемъ и заключается предложенная нами теорема.

11) *Не нарушая сравненія модуль можетъ быть замѣненъ числомъ, на которое онъ дѣлится.* Такъ, если $M \equiv N \pmod{AA'}$; то $M \equiv N \pmod{A}$. Въ самомъ дѣлѣ, умножая члены этого сравненія на A' , найдемъ $A' M \equiv A' N \pmod{AA'}$. Но по замѣченному нами свойству сравненій (см. n^o 9) общій множитель членовъ сравненія и модуля можетъ быть сокращенъ. Сокращая же въ сравненіи $A' M \equiv A' N \pmod{AA'}$ множитель A' , находимъ $M \equiv N \pmod{A}$, что и слѣдовало доказать.

Вотъ главные свойства сравненій двухъ чиселъ между собою; эти свойства послужатъ намъ для рѣшенія сравненій, заключающихъ одно или нѣсколько неизвѣстныхъ. Къ этому мы теперь и приступимъ.

§ 10. Мы видѣли, что въ сравненіи члены могутъ быть переносимы изъ одной части въ другую. Предполагая же всѣ члены перенесенными въ одну часть сравненія, мы приведемъ его къ виду

$$f(x, y, z, \dots) \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ f какая нибудь функція, p данное число, принимаемое за модуль, $x, y, z, \dots$ числа неизвѣстныя.

Исслѣдованія наши мы начнемъ съ простѣйшихъ сравненій, съ сравненій, заключающихъ одно неизвѣстное и сначала рассмотримъ тотъ случай, когда функція, входящая въ сравненіе, есть цѣлая съ цѣлыми коэффициентами.

Ограничиваясь сравненіями этого вида, мы докажемъ для нихъ слѣдующую теорему:

13. ТЕОРЕМА.

*Если сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$ удовлетворяетъ $x = a$; то ему удовлетворяютъ и всѣ числа сравнимыя съ a по модулю p *).*

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, по свойствамъ сравненій, замѣченнымъ нами въ предыдущемъ параграфѣ (см. тамъ n^0 6), изъ сравненія $X \equiv a \pmod{p}$ выходитъ $fX \equiv fa \pmod{p}$. Но a по положенію удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, слѣд. $fa \equiv 0 \pmod{p}$, а въ этомъ случаѣ по n^0 1 предыдущаго параграфа изъ сравненія $fX \equiv fa \pmod{p}$ выходитъ $fX \equiv 0 \pmod{p}$, что и слѣдовало доказать.

§ 11. Мы видѣли, что если a есть число удовлетворяющее сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$; то ему удовлетворяютъ и всѣ числа, сравнимыя съ a по модулю p . Посмотримъ теперь какія же числа будутъ сравнимы съ a по модулю p . Для этого мы припомнимъ, что числа, сравнимыя между собою по модулю p , суть

*) Здѣсь и вездѣ въслѣдствіе подъ знаками $fx, Fx, \phi x, \dots$ мы будемъ разумѣть цѣлыя функціи съ цѣлыми коэффициентами.

тѣ, которыхъ разность дѣлится на p безъ остатка; поэтому X будетъ числомъ сравнимымъ съ a по модулю p , если разность ихъ дѣлится на p . Называя же частное отъ дѣленія $a - X$ на p черезъ N , мы найдемъ $\frac{a-X}{p} = N$; откуда $X = a - pN$. Вотъ общая формула всѣхъ чиселъ сравнимыхъ съ a по модулю p . Давая здѣсь числу N различныя величины какъ положительныя, такъ и отрицательныя, мы найдемъ безконечное множество чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p . Но изъ всѣхъ чиселъ сравнимыхъ съ a по модулю p особеннаго вниманія заслуживаютъ два числа: 1-е) число положительное наименьшее изъ всѣхъ чиселъ сравнимыхъ съ a по модулю p ; оно извѣстно подъ названіемъ *наименьшаго положительнаго вычета числа a по модулю p* ; 2-е) число отрицательное, котораго численная величина менѣе численной величины всѣхъ отрицательныхъ чиселъ, сравнимыхъ съ a по модулю p ; такое число извѣстно подъ названіемъ *наименьшаго отрицательнаго вычета числа a по модулю p* . Кромѣ того мы будемъ отличать особеннымъ именемъ *абсолютно малаго вычета числа a по модулю p* тотъ изъ наименьшихъ вычетовъ положительный или отрицательный, который имѣетъ наименьшую численную величину. Въ случаѣ равенства численныхъ величинъ наименьшаго положительнаго вычета числа a по модулю p и наименьшаго отрицательнаго вычета его мы за абсолютно малый вычетъ числа a по модулю p можемъ безъ различія принимать тотъ или другой изъ наименьшихъ вычетовъ и мы будемъ говорить, что въ этомъ случаѣ абсолютно малый вычетъ числа a по модулю p имѣетъ двѣ величины.

По формулѣ $X = a - pN$, опредѣляющей всѣ числа сравнимыя съ a по модулю p , не трудно найти и наименьшій положительный вычетъ a по модулю p и наименьшій отрицательный вычетъ его. Для этого мы уравненіе $X = a - pN$ пишемъ такъ $X = p \left(\frac{a}{p} - N \right)$; откуда видно, что наименьшая численная величина X соотвѣтствуетъ значеніямъ N наиблизе подходящимъ къ $\frac{a}{p}$; притомъ видно также, что X будетъ имѣть зна-

ченіе положительное или отрицательное, смотря по тому будет ли N менѣе или болѣе чѣмъ $\frac{a}{p}$.

Итакъ наименьшій положительный вычетъ числа a по модулю p опредѣлится по формулѣ $a - Np$, когда за N мы возьмемъ число наиближе подходящее къ $\frac{a}{p}$, но не превосходящее $\frac{a}{p}$; такое число, очевидно, при a положительномъ мы найдемъ въ частномъ, дѣля a на p и пренебрегая остаткомъ. Откуда ясно, что наименьшій положительный вычетъ по модулю p числа положительнаго мы найдемъ въ остаткѣ отъ дѣленія его на p . Такъ для опредѣленія наименьшаго положительнаго вычета 23 по модулю 7, мы будемъ имѣть формулу $23 - 7N$, гдѣ за N должны будемъ взять цѣлое число, получаемое при дѣленіи 23 на 7. Выполняя это дѣленіе находимъ, что здѣсь $N = 3$. Дѣлая $N = 3$ въ формулѣ $23 - 7N$, находимъ, что 2 есть наименьшій положительный вычетъ 23 по модулю 7.

Также для наименьшаго положительнаго вычета — 2 по модулю 5 находимъ формулу $-2 - 5N$, гдѣ за N должны взять число наиближе подходящее къ $-\frac{2}{5}$, но не превосходящее $-\frac{2}{5}$. Такое число есть — 1; слѣд. искомый вычетъ есть $-2 - 5 = 3$.

Не трудно убѣдиться, что всегда наименьшій положительный вычетъ a по модулю p меньше p . Это слѣдуетъ изъ сказаннаго нами объ опредѣленіи его. Мы видѣли, что онъ опредѣляется формулою $a - Np$, гдѣ N есть цѣлое число наиближе подходящее къ $\frac{a}{p}$; а потому $\frac{a}{p} - N < 1$ и слѣд.

$$a - pN = p \left(\frac{a}{p} - N \right) < p.$$

Для опредѣленія наименьшаго отрицательнаго вычета числа a по модулю p , мы должны въ формулѣ $a - pN$, или $p \left(\frac{a}{p} - N \right)$ принять за N число, которое бы было больше $\frac{a}{p}$ и наиближе подходило къ $\frac{a}{p}$; такое число при a положительномъ, очевидно, мы получимъ, если, дѣля a на p , дробь частнаго замѣнимъ

единицею. Такъ наименьшій отрицательный вычетъ числа 23 по модулю 7 опредѣлится формулою $23 - 7N$, гдѣ за N должны взять частное $\frac{23}{7} = 3 + \frac{2}{7}$, замѣнивъ единицею дробь $\frac{2}{7}$; это дастъ намъ $N = 4$ и по формулѣ $23 - 7N$ находимъ, что наименьшій отрицательный вычетъ числа 23 по модулю 7 есть $23 - 7 \cdot 4$, или — 5.

Опредѣливши наименьшій положительный вычетъ и наименьшій отрицательный, мы легко узнаемъ тотъ изъ нихъ, который долженъ быть принятъ за абсолютно малый вычетъ. Но его также можно опредѣлить непосредственно на основаніи формулы $a - Nr$, или $p \left(\frac{a}{p} - N \right)$. Для этого стоитъ только выбрать значеніе N такъ, чтобы $\frac{a}{p} - N$ имѣло наименьшую численную величину; такое значеніе N мы, очевидно, найдемъ, опредѣляя частное $\frac{a}{p}$ и откидывая въ немъ дробную часть, когда она меньше $\frac{1}{2}$ или замѣняя ее единицею, если она болѣе $\frac{1}{2}$. Если же дробная часть $\frac{a}{p}$ не больше $\frac{1}{2}$ и не меньше $\frac{1}{2}$; то мы ее по произволу можемъ или откинуть или замѣнить единицею; въ томъ и другомъ случаѣ численная величина $\frac{a}{p} - N$ будетъ равна $\frac{1}{2}$. Такъ для опредѣленія абсолютно малаго вычета 23 по модулю 7, мы должны въ формулѣ $23 - 7N$ принять за N частное $\frac{23}{7} = 3 + \frac{2}{7}$, откинувши дробь $\frac{2}{7}$. Это даетъ намъ $N = 3$ и слѣдовательно искомый абсолютно малый вычетъ будетъ $23 - 7 \cdot 3 = 2$.

Напротивъ при опредѣленіи абсолютно малаго вычета 25 по модулю 7, мы возьмемъ въ формулѣ $25 - 7N$ за N частное $\frac{25}{7} = 3 + \frac{4}{7}$, замѣнивъ единицею дробь $\frac{4}{7}$. Это дастъ намъ $N = 4$ и для величины искомага вычета найдемъ $25 - 7 \cdot 4 = -3$.

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что при опредѣленіи абсолютно малаго вычета по формулѣ $a - Nr$, мы за N принимаемъ число, котораго разность съ $\frac{a}{p}$ будетъ имѣть численную величину не болѣе $\frac{1}{2}$. А потому абсолютно малый вычетъ числа

a по модулю p , опредѣляясь формулою $a - Nr$, или $p \left(\frac{a}{p} - N \right)$ будетъ имѣть численную величину не превосходящую $\frac{p}{2}$.

§ 12. Разсмотрѣвши числа, сравнимыя съ a по модулю p , обращаемся къ рѣшенію сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$.

Мы видѣли, что если этому сравненію удовлетворяетъ a , то ему удовлетворяетъ и всякое число X , для котораго имѣетъ мѣсто сравненіе $X \equiv a \pmod{p}$. Этихъ чиселъ безконечное множество; но всѣ они, сравнимыя съ однимъ и тѣмъ же числомъ a и слѣдоват. между собою по модулю p , принимаются за одно рѣшеніе сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$. По этому мы будемъ говорить, что сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ одно только рѣшеніе, если ему удовлетворяютъ только числа, для которыхъ $x \equiv a \pmod{p}$; мы будемъ говорить, что сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ два рѣшенія, если ему кромѣ чиселъ, опредѣляемыхъ сравненіемъ

$$x \equiv a \pmod{p},$$

удовлетворяютъ другія, получаемыя изъ сравненія

$$x \equiv a_1 \pmod{p},$$

гдѣ a не $\equiv a_1 \pmod{p}$. И вообще мы будемъ говорить, что сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ n рѣшеній; если ему удовлетворяютъ только числа, опредѣляемыя сравненіями

$$x \equiv a, x \equiv a_1, x \equiv a_2, \dots x \equiv a_{n-1} \pmod{p},$$

гдѣ $a, a_1, a_2, \dots a_{n-1}$ суть числа не сравнимыя между собою по модулю p . На основаніи этого мы докажемъ слѣдующую теорему.

14. ТЕОРЕМА.

Сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ столько рѣшеній, сколько чиселъ въ рядѣ, $0, 1, 2, \dots p - 1$ ему удовлетворяетъ и если эти числа суть $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots \alpha_n$; то $x \equiv \alpha_1, x \equiv \alpha_2, x \equiv \alpha_3, \dots, x \equiv \alpha_n \pmod{p}$ суть рѣшенія сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$.

Доказательство. Въ § 10 видѣли, что если $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ удовлетворяютъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$; то ему удовлетворяютъ и всѣ числа, опредѣляемые сравненіями

$$x \equiv \alpha_1, x \equiv \alpha_2, x \equiv \alpha_3, \dots, x \equiv \alpha_n \pmod{p}.$$

Но не трудно доказать съ одной стороны, что кромѣ этихъ чиселъ нѣтъ ни одного удовлетворяющаго сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, а съ другой, что числа $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ не сравнимы между собою по модулю p ; откуда по сказанному нами о числѣ рѣшеній сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$ и будетъ слѣдовать предложенная теорема.

Для доказательства перваго предположимъ, что какое либо число A удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$, не удовлетворяя ни одному изъ слѣдующихъ:

$$x \equiv \alpha_1, x \equiv \alpha_2, x \equiv \alpha_3, \dots, x \equiv \alpha_n \pmod{p}.$$

Если A удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$; то по § 10 будетъ удовлетворять ему и всякое число, сравнимое съ нимъ по модулю p , и слѣд. наименьшій положительный вычетъ его. Называя этотъ вычетъ черезъ α , мы будемъ имѣть

$$A \equiv \alpha, f(\alpha) \equiv 0 \pmod{p}. \dots \dots \dots (4)$$

и α , какъ наименьшій положительный вычетъ A по модулю p , будетъ заключаться въ рядѣ $0, 1, 2, \dots, p-1$. Но если α заключается въ этомъ рядѣ и удовлетворяетъ сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$; то α есть одно изъ чиселъ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$; ибо по положенію $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ суть единственные числа ряда $0, 1, 2, \dots, p-1$, удовлетворяющія сравненію $fx \equiv 0 \pmod{p}$. Но это невозможно; ибо по (4) A удовлетворяетъ сравненію $x \equiv \alpha \pmod{p}$, между тѣмъ какъ по положенію оно не удовлетворяетъ ни одному изъ сравненій

$$x \equiv \alpha_1, x \equiv \alpha_2, \dots, x \equiv \alpha_n \pmod{p}.$$

Переходимъ теперь къ доказательству, что числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

не сравнимы между собою по модулю p . Для этого допустимъ противное; пусть будетъ $\alpha_1 \equiv \alpha_2 \pmod{p}$. Изъ этого сравненія слѣдуетъ дѣлимость $\alpha_1 - \alpha_2$ на p , что не возможно; ибо α_1, α_2 числа положительныя и каждое изъ нихъ меньше p , вслѣдствіе чего разность ихъ будетъ имѣть численную величину меньше p и слѣдовательно не дѣлимую на p .

Такъ убѣждаемся мы въ справедливости теоремы, нами предложенной.

Чтобы показать приложеніе этой теоремы, возьмемъ сравненіе $x^3 - x - 1 \equiv 0 \pmod{5}$. Внося сюда вмѣсто x числа 0, 1, 2, 3, 4, мы убѣждаемся, что только 2 удовлетворяетъ разсматриваемому сравненію. Откуда заключаемъ, что это сравненіе имѣетъ одно рѣшеніе $x \equiv 2 \pmod{5}$.

Такимъ же образомъ для сравненія $x^2 - 3 \equiv 0 \pmod{11}$ находимъ два рѣшенія $x \equiv 5, x \equiv 6 \pmod{11}$; разсматривая же сравненіе $x^2 - 11 \equiv 0 \pmod{3}$ убѣждаемся, что оно не имѣетъ ни одного рѣшенія.

ГЛАВА II.

О сравненіи первой степени.

§ 13. Общій видъ сравненій первой степени есть

$$ax - b \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ a, b какія нибудь числа положительныя или отрицательныя; p число положительное. Сравненія этого вида представляютъ два случая существенно отличные одинъ отъ другаго; ихъ мы разсмотримъ отдѣльно. Первый случай это, когда a и p числа относительно другъ друга простыя; второй, когда они имѣютъ общаго множителя. Мы начнемъ съ перваго случая, a и p простыхъ между собою, и докажемъ слѣдующую теорему:

15. ТЕОРЕМА.

Сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ при a простомъ съ p имѣетъ всегда одно рѣшеніе.

Доказательство. Изъ доказаннаго нами въ параграфѣ 12 о числѣ рѣшеній сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$ слѣдуетъ, что сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ столько рѣшеній, сколько находится въ рядѣ $0, 1, 2, \dots, p-1$ чиселъ, ему удовлетворяющихъ, или, что одно и тоже, сколько въ рядѣ $a \cdot 0 - b, a \cdot 1 - b, a \cdot 2 - b, \dots, a(p-1) - b$ чиселъ дѣлящихся на p . Но какъ эти числа составляютъ арифметическую прогрессию, которой разность есть a , число простое съ p по положенію, число же членовъ равно p ; то по 10-й теоремѣ здѣсь будетъ одинъ членъ дѣлящійся на p . Слѣд. въ сдѣланномъ нами предположеніи сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ одно рѣшеніе, что и слѣдовало доказать.

Убѣдившись такимъ образомъ, что въ разсматриваемомъ нами случаѣ сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ одно рѣшеніе, мы покажемъ теперь, какъ найдется оно. Въ настоящее время извѣстно нѣсколько способовъ рѣшать сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$; замѣчательнѣйшіе изъ нихъ мы предложимъ впослѣдствіе, говоря о свойствахъ чиселъ, на которыхъ они основываются. Здѣсь же замѣтимъ, что сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ можетъ быть рѣшено по способу предлагаемому въ Алгебрѣ для рѣшенія неопредѣленнаго уравненія $ax - pz = b$, отъ котораго сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ отлится только знакомъ положеніемъ. Дѣйствительно, сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ есть ничто иное, какъ выраженіе дѣлимости $ax - b$ на p , что можетъ быть представлено уравненіемъ $\frac{ax - b}{p} = z$, предполагая z произвольнымъ цѣлымъ числомъ. Откуда для опредѣленія x и z получаемъ уравненіе $ax - pz = b$.

Итакъ рѣшеніемъ уравненія $ax - pz = b$ опредѣлятся зна-

ченія x , удовлетворяющія сравненію $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$. Эти значенія x , какъ извѣстно, выражаются такъ: $x = \alpha + np$, гдѣ α одна изъ величинъ x , способная удовлетворить уравненію $ax - px = b$, n число произвольное. По принятому нами знакоположенію мы вмѣсто того, чтобы писать $x = \alpha + np$, предполагая n произвольнымъ числомъ, можемъ написать $x \equiv \alpha \pmod{p}$ и въ этомъ видѣ мы будемъ всегда представлять рѣшеніе сравненія $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$.

Напримѣръ, имѣя для рѣшенія сравненіе $7x - 3 \equiv 0 \pmod{10}$, мы возьмемъ уравненіе $7x - 10z = 3$. Рѣшая это уравненіе, мы найдемъ для значенія x и z такія выраженія $x = 9 + 10n$, $z = 6 + 7n$; откуда для рѣшенія сравненія $7x - 3 \equiv 0 \pmod{10}$ получаемъ

$$x \equiv 9 \pmod{10}.$$

§ 14. На основаніи доказанныхъ нами теоремъ относительно сравненій вообще и въ особенности относительно сравненій вида $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ могутъ быть доказаны двѣ любопытныя теоремы относительно чиселъ, которыя послужатъ намъ также для рѣшенія сравненій первой степени. Этими-то свойствами чиселъ мы теперь и займемся.

16. ТЕОРЕМА.

Если p число простое и не дѣлитъ a ; то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Доказательство. Пусть будутъ $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}$ наименьшіе положительные вычеты чиселъ $1a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ по модулю p ; они будутъ удовлетворять сравненіямъ

$$1a \equiv r_1, 2a \equiv r_2, 3a \equiv r_3, \dots, (p-1)a \equiv r_{p-1} \pmod{p} \quad (5).$$

Перемножая эти сравненія между собою, мы найдемъ

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-1) a^{p-1} \equiv r_1 r_2 r_3 \cdot \dots \cdot r_{p-1} \pmod{p} \quad (6).$$

Но нетрудно убѣдиться, что произведенія

$$1.2.3 \dots (p-1), r_1 r_2 r_3 \dots r_{p-1}$$

равны между собою.

Для этого мы замѣчаемъ, что $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}$, какъ наименьшіе положительные вычеты чиселъ $1a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ по модулю p , могутъ имѣть только значенія

$$0, 1, 2, \dots, p-1.$$

Притомъ ни одно изъ нихъ не можетъ быть нулемъ; ибо въ противномъ случаѣ сравненіе (6) предполагало бы дѣлимость

$$1.2.3 \dots (p-1) a^{p-1}$$

на p , между тѣмъ какъ $1, 2, 3, \dots, p-1$ и a числа простыя съ p .

Итакъ числа $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}$ могутъ имѣть только значенія

$$1, 2, 3, \dots, p-1.$$

Но между числами $r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}$ не можетъ быть двухъ имѣющихъ одну и ту-же величину; ибо, предполагая $r_m = r_\mu = b$, мы по (5) имѣли бы

$$ma \equiv b, \mu a \equiv b \pmod{p},$$

гдѣ m и μ два числа изъ ряда $1, 2, 3, \dots, p-1$, и слѣд. для сравненія $ax \equiv b \pmod{p}$ нашли бы два рѣшенія

$$x \equiv m, x \equiv \mu \pmod{p},$$

что не возможно.

Отсюда слѣдуетъ, что въ составъ ряда

$$r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}$$

могутъ входить только числа

$$1, 2, 3, \dots, p-1$$

и каждое только по одному разу.

Но такъ какъ въ рядахъ

$$r_1, r_2, r_3, \dots, r_{p-1}$$

$$1, 2, 3, \dots, p-1$$

одинакое число членовъ; то въ первый должны входить всѣ вторые, слѣд. эти ряды составлены изъ однихъ и тѣхъ-же чиселъ и при томъ взятыхъ по одному разу; а потому произведение членовъ перваго ряда равно произведенію членовъ втораго. Убѣдясь въ этомъ, мы можемъ въ (6) замѣнить произведение $r_1 r_2 r_3 \dots r_{p-1}$ произведеніемъ $1.2.3 \dots (p-1)$.

Такимъ образомъ находимъ

$$1.2.3 \dots (p-1) a^{p-1} \equiv 1.2.3 \dots (p-1) \pmod{p}.$$

Но члены этого сравненія могутъ быть сокращены на 2, 3, $\dots, p-1$; ибо всѣ эти числа, будучи меньше p , будутъ относительно его простыя. Выполнивъ же эти сокращенія, найдемъ

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ для $p=7$, $a=2$ будетъ $2^{7-1} \equiv 1 \pmod{7}$, въ справедливости чего мы убѣждаемся, замѣтивъ, что 2^6 равно 64 и $64 \equiv 1 \pmod{7}$.

Эта теорема есть одна изъ замѣчательнѣйшихъ въ Теоріи чиселъ и имѣетъ весьма важныя приложенія. Она открыта Ферматомъ; но предложена имъ была безъ доказательства. Первый, успѣвшій ее доказать, былъ Ейлеръ; онъ же далъ слѣдующую теорему болѣе общую.

17. ТЕОРЕМА.

Если n означаетъ сколько чиселъ простыхъ съ N и меньшихъ N и a число простое съ N ; то $a^n \equiv 1 \pmod{N}$.

Доказательство. Называя черезъ $N_1, N_2, \dots, N_n$ числа простыя съ N и меньшія N , чрезъ $r_1, r_2, \dots, r_n$ наименьшіе положи-

тельные вычеты чиселъ $aN_1, aN_2, \dots, aN_n$ по модулю N , имѣемъ

$$aN_1 \equiv r_1, aN_2 \equiv r_2, \dots, aN_n \equiv r_n \pmod{N} \quad (7),$$

что по перемноженій даетъ

$$N_1 N_2 \dots N_n a^n \equiv r_1 r_2 r_3 \dots r_n \pmod{N} \quad (8).$$

Но не трудно убѣдиться, что произведенія $N_1 N_2 \dots N_n, r_1 r_2 \dots r_n$ равны.

Такъ какъ $r_1, r_2, \dots, r_n$ суть наименьшіе положительные вычеты чиселъ $aN_1, aN_2, \dots, aN_n$ по модулю N ; то они могутъ имѣть только значенія

$$0, 1, 2, \dots, N-1$$

и изъ этихъ значеній для $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ возможны только тѣ, которыя не имѣютъ общаго множителя съ N ; ибо сравненіе (8), котораго первая часть состоитъ изъ произведенія простыхъ чиселъ съ N , предполагаетъ, что N и $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ не имѣютъ общаго дѣлителя.

Отсюда слѣдуетъ, что для $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ возможны только значенія

$$N_1, N_2, \dots, N_n.$$

При томъ между числами $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ не можетъ быть двухъ равныхъ между собою; ибо при равенствѣ $r_m = r_\mu = b$ мы по (7) имѣли бы

$$a\mu \equiv b, \quad a\mu \equiv b \pmod{N},$$

гдѣ m, μ два какія нибудь числа изъ ряда $1, 2, \dots, p-1$ и слѣд. для сравненія $ax \equiv b \pmod{N}$ мы нашли бы два рѣшенія, что не возможно.

Отсюда слѣдуетъ, что въ составъ ряда

$$r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$$

входятъ одни лишь числа

$$N_1, N_2, \dots, N_n$$

и каждое только по одному разу. Но какъ въ этихъ рядахъ одинакое число членовъ; то въ первый должны войти всѣ числа втораго и слѣд. эти ряды составлены изъ однихъ и тѣхъ же чиселъ, при томъ взятыхъ по одному разу, а потому произведеніе чиселъ перваго ряда равно произведенію чиселъ втораго.

Убѣдясь въ этомъ, мы можемъ въ (8) произведеніе $r_1 r_2 \dots r_n$ замѣнить произведеніемъ $N_1 N_2 \dots N_n$. Такимъ образомъ находимъ

$$N_1 N_2 \dots N_n a^n \equiv N_1 N_2 \dots N_n \pmod{N}.$$

Но здѣсь члены сравненія могутъ быть сокращены на общихъ множителей $N_1, N_2, \dots, N_n$; ибо числа эти суть простые съ N . Выполнивъ же эти сокращенія, найдемъ

$$a^n \equiv 1 \pmod{N},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ если $N = 20$, $a = 3$; то по 12-й теоремѣ для величины n , означающаго сколько простыхъ чиселъ съ 20 и меньшихъ 20, находимъ 8 и по доказанной нами теоремѣ будетъ $3^8 \equiv 1 \pmod{20}$. Въ справедливости этого сравненія мы убѣждаемся, находя, что $3^8 = 6561$ и $6561 \equiv 1 \pmod{20}$.

§ 15. На основаніи этихъ теоремъ не трудно найти рѣшеніе сравненія $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ a по прежнему предполагаемъ простымъ съ p .

Начнемъ съ частнаго случая p простаго. Такъ какъ a по положенію число простое съ p и p само по себѣ простое; то a не дѣлится на p (§ 3) и по теоремѣ 16-й, которую вездѣ впослѣдствіи будемъ употреблять подъ именемъ теоремы Ферматовой, будетъ имѣть мѣсто сравненіе $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, что по умноженіи на b можетъ быть такъ представлено

$$a \cdot ba^{p-2} - b \equiv 0 \pmod{p}.$$

Сличая же это сравненіе съ даннымъ для рѣшенія $ax - b \equiv 0$ (mod. p), мы замѣчаемъ, что послѣднему удовлетворяетъ $x \equiv ba^{p-2}$; а потому рѣшеніе его представится формулою

$$x \equiv ba^{p-2} \pmod{p}.$$

Такъ опредѣляются рѣшенія сравненія

$$ax - b \equiv 0 \pmod{p}$$

при p простомъ и недѣлящемъ a .

Напримѣръ для рѣшенія сравненія $3x - 8 \equiv 0$ (mod. 5) найдемъ

$$x \equiv 8 \cdot 3^{5-2} \pmod{5},$$

или

$$x \equiv 216 \pmod{5}.$$

Это рѣшеніе сравненія $3x - 8 \equiv 0$ (mod. 5) мы можемъ представить проще, замѣняя 216 его наименьшимъ положительнымъ вычетомъ по модулю 5. Такъ находимъ

$$x \equiv 1 \pmod{5}$$

для рѣшенія сравненія $3x - 8 \equiv 0$ (mod. 5).

Переходимъ теперь къ рѣшеніямъ сравненій, которыхъ модуль число составное. Пусть дано будетъ сравненіе $ax - b \equiv 0$ (mod. N), гдѣ N какое нибудь число, число же a , какъ предполагали, простое съ N . По теоремѣ Ейлера (теорема 17) мы будемъ имѣть

$$a^n \equiv 1 \pmod{N},$$

означая черезъ n сколько чиселъ меньшихъ N и простыхъ съ N .

Это сравненіе по умноженіи на b можетъ быть такъ представлено

$$a \cdot b \cdot a^{n-1} - b \equiv 0 \pmod{N}.$$

Сличая это сравненіе съ даннымъ для рѣшенія $ax - b \equiv 0$ (mod. N), находимъ, что ему удовлетворяетъ

$$x \equiv ba^{n-1} \pmod{N}.$$

Что касается до значенія n , опредѣляющаго сколько чиселъ простыхъ съ N и меньшихъ N , то по 12-й теоремѣ мы его легко найдемъ. На основаніи этой теоремы мы находимъ, что n равно

$$\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \dots,$$

если N разложеніемъ на простые множители приводится къ $\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots$. Такимъ образомъ мы убѣждаемся, что вообще рѣшеніе сравненія

$$ax - b \equiv 0 \pmod{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots},$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ различныя простыя числа, опредѣляется слѣдующею формулою

$$x \equiv ba^{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots \frac{\alpha-1}{\alpha} \cdot \frac{\beta-1}{\beta} \cdot \frac{\gamma-1}{\gamma} \dots - 1} \pmod{\alpha^m \beta^n \gamma^p \dots}.$$

Такъ для рѣшенія сравненія $2x - 7 \equiv 0 \pmod{15}$, гдѣ $15 = 3 \cdot 5$, находимъ

$$x \equiv 7 \cdot 2^{3 \cdot 5 \cdot \frac{3-1}{3} \cdot \frac{5-1}{5} - 1} \pmod{15},$$

или

$$x \equiv 896 \pmod{15}.$$

Замѣняя же здѣсь 896 его наименьшимъ положительнымъ вычетомъ по модулю 15, мы это сравненіе представимъ такъ

$$x \equiv 11 \pmod{15}.$$

Этимъ мы оканчиваемъ изслѣдованія сравненій первой степени, въ которыхъ модуль и коэффициентъ неизвѣстнаго суть числа относительно другъ друга простыя, и переходимъ къ тому случаю, когда эти числа имѣютъ общаго множителя.

§ 16. По свойству сравненій, показанному нами въ § 10, сравненіе $ax \equiv b \pmod{p}$ не возможно, если a и p имѣютъ общаго множителя, который не дѣлитъ b . Откуда слѣдуетъ такая теорема:

18. ТЕОРЕМА.

Сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ не имѣетъ рѣшенія, если общій множитель a и p не дѣлитъ b .

Такъ убѣждаемся, что сравненія $20x - 7 \equiv 0 \pmod{15}$, $6x - 5 \equiv 0 \pmod{9}$ не имѣютъ рѣшенія.

Обращаемся теперь къ сравненіямъ вида $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$, когда общіе множители a и p дѣлятъ b . Для этихъ сравненій докажется слѣдующая теорема:

19. ТЕОРЕМА.

Если a и p имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ d и d дѣлитъ b , то сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ d рѣшеній, которыя могутъ быть такъ представлены: $x \equiv \alpha$, $x \equiv \alpha + \frac{p}{d}$, $x \equiv \alpha + \frac{2p}{d}, \dots$, $x \equiv \alpha + \frac{(d-1)p}{d} \pmod{p}$, гдѣ есть α число $< \frac{p}{d}$ и не < 0 , удовлетворяющее сравненію $\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \pmod{\frac{p}{d}}$.

Доказательство. Если d есть общій наибольшій дѣлитель чиселъ a и p и на него дѣлится b ; то сравненіе

$$ax - b \equiv 0 \pmod{p},$$

по сокращеніи его членовъ и модуля на d , будетъ

$$\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \pmod{\frac{p}{d}},$$

гдѣ $\frac{a}{d}$, $\frac{p}{d}$, $\frac{b}{d}$ числа цѣлыя; при томъ, какъ нетрудно убѣдиться, числа $\frac{a}{d}$, $\frac{p}{d}$ будутъ простыя относительно другъ друга; ибо въ противномъ случаѣ d не было бы общимъ наибольшимъ дѣлителемъ a и p . Но при $\frac{a}{d}$, $\frac{p}{d}$ простыхъ между собою, какъ видѣли, сравненіе

$$\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \pmod{\frac{p}{d}}$$

имѣть всегда рѣшеніе, которое по пріемамъ, показаннымъ нами, легко найдется. Пусть же будетъ α число, заключающееся въ рядѣ $0, 1, 2, \dots, \frac{p}{d} - 1$ и удовлетворяющее сравненію

$$\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \left(\text{мод. } \frac{p}{d} \right);$$

всѣ числа, удовлетворяющія этому сравненію, найдутся изъ слѣдующаго

$$x \equiv \alpha \left(\text{мод. } \frac{p}{d} \right).$$

Эти же числа будутъ удовлетворять и сравненію

$$ax - b \equiv 0 \left(\text{мод. } p \right),$$

которое отъ

$$\frac{a}{d}x - \frac{b}{d} \equiv 0 \left(\text{мод. } \frac{p}{d} \right)$$

отличается только множителемъ d , общимъ модулю и членамъ сравненія.

Итакъ всѣ числа, удовлетворяющія сравненію

$$ax - b \equiv 0 \left(\text{мод. } p \right),$$

опредѣляются такъ

$$x \equiv \alpha \left(\text{мод. } \frac{p}{d} \right).$$

На основаніи этого не трудно показать сколько въ рядѣ

$$0, 1, 2, \dots, p-1$$

чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію $ax - b \equiv 0 \left(\text{мод. } p \right)$, чѣмъ и опредѣлится число рѣшеній этого сравненія. Для этого мы находимъ общую формулу чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію

$$x \equiv \alpha \left(\text{мод. } \frac{p}{d} \right).$$

По сказанному нами въ § 11 находимъ, что формула, опредѣляющая эти числа, есть

$$x = \alpha - N \frac{p}{d}.$$

Но эта формула, гдѣ, какъ видѣли, α не < 0 и $< \frac{p}{d}$, даетъ для x значенія не выходящія изъ предѣловъ 0 и $p - 1$ только при $N = 0, -1, -2, \dots, -(d - 2), -(d - 1)$, поэтому въ рядѣ 0, 1, 2, $\dots, p - 1$ числа, удовлетворяющія сравненію $x \equiv \alpha \pmod{\frac{p}{d}}$ и слѣд. сравненію $ax - b \equiv \pmod{p}$, суть

$$\alpha, \alpha + \frac{p}{d}, \alpha + \frac{2p}{d}, \alpha + \frac{3p}{d}, \dots, \alpha + \frac{(d-1)p}{d}.$$

А такъ какъ ихъ числомъ d ; то по 14-й теоремѣ сравненіе $ax - b \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ d рѣшеній, которыя суть

$$x \equiv \alpha, x \equiv \alpha + \frac{p}{d}, x \equiv \alpha + \frac{2p}{d}, \dots, x \equiv \alpha + \frac{(d-1)p}{d} \pmod{p},$$

откуда и слѣдуетъ предложенная теорема.

Такъ сравненіе $15x - 9 \equiv 0 \pmod{12}$, въ которомъ коэффициентъ x и модуль имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ 3 и членъ не содержащій x дѣлится на 3, имѣетъ три рѣшенія. Чтобы найти ихъ, мы сокращаемъ въ данномъ сравненіи и члены и модуль на 3; такимъ образомъ получаемъ сравненіе

$$5x - 3 \equiv 0 \pmod{4}.$$

На основаніи сказаннаго нами въ предыдущемъ параграфѣ мы находимъ, что рѣшеніе его есть

$$x \equiv 3 \cdot 5^{2^2 \frac{2-1}{2}} - 1 \pmod{4},$$

или

$$x \equiv 15 \pmod{4}.$$

Замѣняя здѣсь 15 его наименьшимъ положительнымъ вычетомъ по модулю 4, находимъ

$$x \equiv 3 \pmod{4}.$$

Отсюда для рѣшенія предложеннаго сравненія получаемъ

$$x \equiv 3, x \equiv 7, x \equiv 11 \pmod{12}.$$

ГЛАВА III.

О сравненіяхъ высшихъ степеней вообще.

§ 17. Въ этой статьѣ мы ограничимся разсмотрѣніемъ сравненій съ простыми модулями. По этому общій видъ сравненій, которыми будемъ заниматься, представится такъ

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ p простое число, $A, B, C, \dots, H, S$ какія нибудь числа. Прежде чѣмъ приступимъ къ изслѣдованію ихъ рѣшеній, замѣтимъ, что въ нихъ коэффициентъ высшей степени x можетъ быть сдѣланъ единицею. Въ самомъ дѣлѣ, въ сравненіи

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть откинутъ всякій членъ, котораго коэффициентъ дѣлится на p . Такъ если C дѣлится на p ; то по нашему знакоположенію будетъ

$$C \equiv 0 \pmod{p},$$

что по умноженіи на x^{m-2} даетъ

$$Cx^{m-2} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Вычитая же это сравненіе изъ

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p},$$

мы освободимъ послѣднее отъ члена Cx^{m-2} . Тоже можетъ быть сдѣлано со всякимъ другимъ членомъ, если коэффициентъ его дѣлится на p . Предположимъ теперь, что сравненіе

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

освобождено отъ членовъ, которыхъ коэффициенты дѣлятся на p , и Ax^m есть членъ съ высшею степенью x . Въ этомъ случаѣ A , не будучи кратнымъ p , будетъ простое относительно его; а по-

тому найдется число α , для котораго будетъ

$$A\alpha - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Умножая это сравненіе послѣдовательно на

$$Bx^{m-1}, Cx^{m-2}, \dots Hx, S,$$

найдемъ

$$AB\alpha x^{m-1} - Bx^{m-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

$$AC\alpha x^{m-2} - Cx^{m-2} \equiv 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$AH\alpha x - Hx \equiv 0,$$

$$AS\alpha - S \equiv 0.$$

Эти сравненія по сложеніи съ разсматриваемымъ нами

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

даютъ

$$Ax^m + AB\alpha x^{m-1} + AC\alpha x^{m-2} + \dots + AH\alpha x + AS\alpha \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но такъ какъ A число простое съ p ; то это сравненіе можетъ быть сокращено на A ; въ слѣдствіе чего оно приведется къ слѣдующему

$$x^m + B\alpha x^{m-1} + C\alpha x^{m-2} + \dots + H\alpha x + S\alpha \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ коэффициентъ высшей степени x есть 1, что и слѣдовало сдѣлать.

Такъ для преобразованія сравненія $2x^3 + 3x + 7 \equiv 0 \pmod{11}$ въ другое, въ которомъ бы коэффициентъ высшей степени x былъ равенъ единицѣ, мы должны найти число α , для котораго $2\alpha - 1 \equiv 0 \pmod{11}$. Такое число есть 6. Послѣ того мы къ данному сравненію должны приложить слѣдующія:

$$2 \cdot 3 \cdot 6 \ x - 3x \equiv 0 \pmod{11},$$

$$2 \cdot 7 \cdot 6 - 7 \equiv 0.$$

Сложивши эти сравненія съ

$$2x^3 + 3x + 7 \equiv 0 \pmod{11}$$

и сдѣлавъ приведеніе, находимъ

$$2x^3 + 2 \cdot 3 \cdot 6x + 2 \cdot 6 \cdot 7 \equiv 0 \pmod{10};$$

откуда по сокращеніи на 2 получаемъ сравненіе

$$x^3 + 18x + 42 \equiv 0 \pmod{11},$$

гдѣ коэффициентъ высшей степени x есть 1.

§ 18. Относительно сравненій высшихъ степеней докажется слѣдующая теорема:

20. ТЕОРЕМА.

При p простомъ сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

не можетъ имѣть болѣе m рѣшеній.

Доказательство. Для доказательства этой теоремы мы замѣчаемъ, что по § 13-му она справедлива для $m = 1$ т. е. для сравненій первой степени. Чтобы доказать справедливость ея для всякой другой степени, докажемъ, что она должна быть справедлива для сравненій степени m , если справедлива она для сравненій степени $m - 1$.

Чтобы убѣдиться въ этомъ мы допустимъ противное; допустимъ, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ болѣе m рѣшеній, между тѣмъ какъ сравненіе такого же вида степени $m - 1$ болѣе $m - 1$ рѣшеній имѣть не можетъ, и докажемъ несообразность этого.

Мы видѣли, что число рѣшеній всякаго сравненія съ моду-

лемъ p опредѣляется числомъ чиселъ въ рядѣ

$$0, 1, 2, \dots, p-1,$$

удовлетворяющихъ сравненію. Поэтому сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ имѣть болѣе m рѣшеній только въ томъ случаѣ, когда ему удовлетворяетъ $m+1$ чиселъ изъ ряда

$$0, 1, 2, \dots, p-1.$$

Пусть эти числа будутъ

$$a, a_1, a_2, \dots, a_m.$$

Возьмемъ одно изъ нихъ, напримѣръ a , и разностию $x - a$ будемъ дѣлить

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S;$$

частное, очевидно, будетъ вида

$$x^{m-1} + B_1x^{m-2} + C_1x^{m-3} + \dots + H_1x + S_1;$$

въ остаткѣ будетъ нѣкоторое число R . Приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S =$$

$$(x - a)(x^{m-1} + B_1x^{m-2} + C_1x^{m-3} + \dots + H_1x + S_1) + R.$$

Въ слѣдствіе чего сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

представится такъ

$$(x-a)(x^{m-1} + B_1x^{m-2} + C_1x^{m-3} + \dots + H_1x + S_1) + R \equiv 0 \pmod{p}.$$

Дѣлая здѣсь $x = a$, гдѣ a , по положенію, есть одно изъ

чиселъ, удовлетворяющихъ разсматриваемому нами сравненію, найдемъ

$$R \equiv 0 \pmod{p};$$

вычитая же это сравненіе изъ предыдущаго, получаемъ

$$(x-a)(x^{m-1} + B_1 x^{m-2} + C_1 x^{m-3} + \dots + H_1 x + S_1) \equiv 0 \pmod{p} \quad (9).$$

Вотъ къ какому виду приводится разсматриваемое нами сравненіе.

Посмотримъ теперь могутъ ли ему удовлетворять всѣ $m+1$ чиселъ

$$a, a_1, a_2, \dots a_m,$$

если сравненіе

$$x^{m-1} + B_1 x^{m-2} + C_1 x^{m-3} + \dots + H_1 x + S_1 \equiv 0 \pmod{p},$$

степени $m-1$, не имѣетъ болѣе $m-1$ рѣшеній. Если это сравненіе не имѣетъ болѣе $m-1$ рѣшеній; то всѣ m чиселъ

$$a_1, a_2, \dots a_m,$$

взятыя нами изъ ряда $0, 1, 2, \dots p-1$, не могутъ ему удовлетворять. Пусть будетъ a_1 то число, которое ему не удовлетворяетъ; въ этомъ случаѣ

$$a_1^{m-1} + B_1 a_1^{m-2} + C_1 a_1^{m-3} + \dots + H_1 a_1 + S_1,$$

не будучи сравнимо съ нулемъ по модулю p , представить число недѣлящееся на p и слѣд. простое съ p ; ибо p число само по себѣ простое. То-же имѣетъ мѣсто относительно разности $a_1 - a$; ибо числа a_1 и a , будучи не болѣе $p-1$ и не менѣе 0 , въ разности не могутъ дать число, дѣлящееся на p .

Итакъ числа

$$a_1 - a, a_1^{m-1} + B_1 a_1^{m-2} + C_1 a_1^{m-3} + \dots + H_1 a_1 + S_1$$

простыя относительно p ; слѣд. простое число относительно p

и произведение ихъ

$$(a_1 - a) (a_1^{m-1} + B_1 a_1^{m-2} + C_1 a_1^{m-3} + \dots + H_1 a_1 + S_1);$$

откуда въ противность допущеннаго нами слѣдуетъ, что $x = a_1$ не удовлетворяетъ сравненію (9). Слѣд. сдѣланное нами допущеніе невозможно, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы можно доказать слѣдующую болѣе общую:

21. ТЕОРЕМА.

Если въ сравненіи

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

не всѣ коэффициенты дѣлятся на p ; то оно больше m рѣшеній имѣть не можетъ.

Доказательство. Мы видѣли § 17, что въ сравненіи

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

могутъ быть опущены всѣ члены, которыхъ коэффициенты дѣлятся на p . Такимъ опущеніемъ членовъ сравненіе

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

приведется къ тождеству

$$0 \equiv 0 \pmod{p},$$

если всѣ коэффициенты $A, B, C, \dots, H, S$ суть кратные p .

Въ противномъ случаѣ сравненіе

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

приведется къ другому, котораго коэффициенты не будутъ дѣлиться на p . Дѣлая въ этомъ сравненіи по § 17 коэффициенты высшей степени равнымъ единицѣ, мы по предыдущей теоремѣ заключимъ, что оно не имѣетъ болѣе рѣшеній, чѣмъ находится

единицъ въ показателѣ его степени; и слѣд. не имѣеть болѣе m рѣшеній; ибо, очевидно, сравненіе, получаемое изъ

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Hx + S \equiv 0 \pmod{p}$$

опущеніемъ какихъ бы то ни было членовъ, не можетъ быть степени болѣе m ; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

§ 19. На основаніи этой теоремы могутъ быть доказаны многія любопытныя свойства чиселъ.

Такъ можно доказать слѣдующую теорему:

22. ТЕОРЕМА.

Коэффициенты всѣхъ степеней x въ разложеніи выраженія

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1$$

дѣлятся на p , если p число простое.

Доказательство. Выраженіе

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1)$$

обращается въ нуль при $x=1, 2, 3, \dots, p-1$. Слѣд. всѣ эти величины x удовлетворяютъ сравненію

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

По теоремѣ же Фермата эти числа удовлетворяютъ сравненію

$$x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Вычитая это сравненіе изъ предыдущаго, мы находимъ такое сравненіе

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

которому также будутъ удовлетворять числа $1, 2, 3, \dots, p-1$; ибо оно получено изъ сравненій, которымъ числа $1, 2, 3, \dots, p-1$ удовлетворяютъ. Если же сравненію

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p};$$

удовлетворяютъ числа $1, 2, 3, \dots, p-1$; то оно имѣеть $p-1$ рѣшеній

$$x \equiv 1, x \equiv 2, x \equiv 3, \dots, x \equiv p-1 \pmod{p}.$$

А это по предыдущей теоремѣ не иначе можетъ имѣть мѣсто, какъ при дѣлимости на p всѣхъ коэффициентовъ въ сравненіи

$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$;
ибо это сравненіе, какъ не трудно замѣтить, степени $p-2$;
откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Посмотримъ теперь къ какимъ сравненіямъ приводитъ насъ эта теорема. Для этого мы замѣчаемъ, что выраженіе

$$(x-1)(x-2)(x-3)\dots(x-p+1) - x^{p-1} + 1$$

по выполненіи умноженій и приведеніи членовъ будетъ

$$-(1+2+3+\dots+p-1)x^{p-2} + (1.2+1.3+2.3+\dots)x^{p-3} - \\ (1.2.3+2.3.4+\dots)x^{p-4} + \dots + (-1)^{p-1}1.2.3\dots(p-1) + 1;$$

слѣдов. по доказанной нами теоремѣ числа

$$1+2+\dots+p-1,$$

$$1.2+1.3+2.3+\dots,$$

$$1.2.3+2.3.4+\dots,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$(-1)^{p-1}1.2.3\dots(p-1) + 1$$

будутъ кратныя p , что по нашему знакоположенію представится такими сравненіями

$$1+2+3+\dots+p-1 \equiv 0, \pmod{p}$$

$$1.2+1.3+2.3+\dots \equiv 0,$$

$$1.2.3+2.3.4+\dots \equiv 0,$$

$$\dots\dots\dots$$

$$(-1)^{p-1}1.2.3\dots(p-1) + 1 \equiv 0.$$

Вотъ сравненія, которыя будутъ имѣть мѣсто для всякаго простаго числа p . Такъ для $p=5$ будетъ

$$1+2+3+4 \equiv 0 \pmod{5},$$

$$1.2+1.3+1.4+2.3+2.4+3.4 \equiv 0,$$

$$1.2.3+2.3.4+1.2.4+1.3.4 \equiv 0,$$

$$1.2.3.4+1 \equiv 0.$$

Особенно замѣчательно здѣсь сравненіе

$$(-1)^{p-1} 1.2.3 \dots (p-1) + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

которое приводитъ насъ къ слѣдующей теоремѣ, извѣстной подъ названіемъ теоремы Вильсона.

23. ТЕОРЕМА.

Если p число простое; то $1.2.3 \dots (p-1) + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

Доказательство. Число p можетъ быть или 2 или болѣе 2; въ послѣднемъ случаѣ оно, какъ простое, будетъ всегда не четное. Но сравненіе

$$(-1)^{p-1} 1.2.3 \dots (p-1) + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

справедливое для всякаго простого числа p , при p не четномъ даетъ

$$1.2.3 \dots (p-1) + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Это же сравненіе имѣетъ мѣсто и при $p = 2$; ибо для этой величины p оно приводится къ слѣдующему:

$$1 + 1 \equiv 0 \pmod{2},$$

что справедливо. Такъ убѣждаемся въ предложенной нами теоремѣ.

Не трудно доказать, что вообще если m чиселъ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$, которыя меньше p и не менѣе 0, удовлетворяютъ сравненію

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p};$$

то

$$-A(a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m) \equiv B \pmod{p},$$

$$A(a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3 + \dots) \equiv C,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$(-1)^{m-1} A(a_1 a_2 \dots a_{m-1} + a_2 a_3 \dots a_m + \dots) \equiv L,$$

$$(-1)^m A a_1 a_2 a_3 \dots a_m \equiv M.$$

Въ самомъ дѣлѣ, числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$ обращаютъ въ нуль выраженіе

$$A(x - a_1)(x - a_2)(x - a_3) \dots (x - a_m).$$

Слѣд. эти числа удовлетворяють сравненію

$$A (x - a_1) (x - a_2) \dots (x - a_m) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но тѣ же числа по положенію удовлетворяють сравненію

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p},$$

а потому удовлетворяють они и сравненію

$$\left. \begin{aligned} & A (x - a_1) (x - a_2) (x - a_3) \dots (x - a_m) \\ & - Ax^m - Bx^{m-1} - Cx^{m-2} - \dots - Lx - M \end{aligned} \right\} \equiv 0 \pmod{p},$$

получаемому въ разности предыдущихъ сравненій. Но если этому сравненію удовлетворяють m чиселъ $a_1, a_2, a_3, \dots, a_m$, взятыхъ нами изъ ряда $0, 1, 2, 3, \dots, p-1$; то оно имѣеть m рѣшеній; степень же его меньше m ; ибо въ выраженіи

$$\begin{aligned} & A (x - a_1) (x - a_2) (x - a_3) \dots (x - a_m) \\ & - Ax^m - Bx^{m-1} - Cx^{m-2} - \dots - Lx - M \end{aligned}$$

членъ съ x^m сокращается. Вслѣдствіе этого по 21-й теоремѣ мы заключаемъ, что въ сравненіи

$$\left. \begin{aligned} & A (x - a_1) (x - a_2) (x - a_3) \dots (x - a_m) \\ & - Ax^m - Bx^{m-1} - Cx^{m-2} - \dots - Lx - M \end{aligned} \right\} \equiv 0 \pmod{p}$$

коэффициенты всѣхъ степеней x дѣлятся на p . Но въ этомъ сравненіи коэффициенты $x^{m-1}, x^{m-2}, \dots, x, x^0$ суть

$$-A (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m) - B,$$

$$A (a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3 + \dots) - C,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$(-1)^{m-1} A (a_1 a_2 \dots a_{m-1} + a_2 a_3 \dots a_m + \dots) - L$$

$$(-1)^m A a_1 a_2 a_3 \dots a_m - M.$$

Слѣд. по принятому нами законоположенію будетъ

$$-A (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m) - B \equiv 0 \pmod{p},$$

$$A (a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3 + \dots) - C \equiv 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$(-1)^{m-1} A (a_1 a_2 \dots a_{m-1} + a_2 a_3 \dots a_m + \dots) - L \equiv 0,$$

$$(-1)^m A a_1 a_2 a_3 \dots a_m - M \equiv 0;$$

откуда и выходятъ сравненія

$$— A (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m) \equiv B \pmod{p},$$

$$A (a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3 + \dots) \equiv C,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$(-1)^{m-1} A (a_1 a_2 \dots a_{m-1} + a_2 a_3 \dots a_m + \dots) \equiv L,$$

$$(-1)^m A a_1 a_2 a_3 \dots a_m \equiv M,$$

которыя мы имѣли въ виду доказать.

Такъ изъ сравненія

$$x^3 + 2x^2 + x - 4 \equiv 0 \pmod{11},$$

которому удовлетворяють числа 1, 3, 5, мы найдемъ

$$— (1 + 3 + 5) \equiv 2 \pmod{11},$$

$$1 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + 3 \cdot 5 \equiv 1,$$

$$— 1 \cdot 3 \cdot 5 \equiv — 4.$$

§ 20. Мы доказали, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

не можетъ имѣть болѣе m рѣшеній. Теперь посмотримъ, при какихъ условіяхъ это сравненіе имѣетъ не менѣе m рѣшеній.

При этомъ мы будемъ всегда предполагать m не болѣе $p - 1$.

Покажемъ же предварительно, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть всегда приведено къ этому виду.

24. ТЕОРЕМА.

Если p число простое, то сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть замѣнено сравненіемъ степени $p - 1$

$$A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \dots + L_1 x + M_1 \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ полиномъ $A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \dots + L_1 x + M_1$ есть остатокъ отъ дѣленія

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M$$

на $x^p - x$.

Доказательство. Дѣлимъ полиномъ

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M$$

на $x^p - x$; частное и остатокъ будутъ функціи цѣлыя съ цѣлыми коэффициентами; притомъ степень остатка будетъ меньше степени дѣлителя $x^p - x$; слѣд. не болѣе $p - 1$. Пусть же частное этого дѣленія будетъ Φx и

$$A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \dots + L_1 x + M_1$$

остатокъ; приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M = \Phi x (x^p - x) + A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \dots + L_1 x + M_1 \quad (10).$$

На основаніи этого уравненія не трудно убѣдиться, что сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

тождественно сравненію

$$A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \dots + L_1 x + M_1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, выраженіе $x^p - x$ при всѣхъ значеніяхъ x будетъ сравнимо съ 0 по модулю p ; ибо оно, очевидно, дѣлится на p при x кратномъ p , а при x недѣлящемся на p будетъ $x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ и слѣд. $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$ по теоремѣ Фермата. Изъ этого видно, что, при всѣхъ значеніяхъ x , будетъ сравнимо съ нулемъ произведеніе $\Phi x (x^p - x)$.

Поэтому, не измѣняя сравненія

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p},$$

мы можемъ вычесть изъ первой части его $\Phi x (x^p - x)$, вслѣдствіе чего оно представится такъ

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M - \Phi x (x^p - x) \equiv 0 \pmod{p},$$

а это по (10) приводится къ слѣдующему

$$A_1 x^{p-1} + B_1 x^{p-2} + C_1 x^{p-3} + \dots + L_1 x + M_1 \equiv 0 \pmod{p},$$

что и требовалось доказать.

На этомъ основаніи мы заключаемъ, что степень сравненія съ модулемъ 2 можетъ быть понижена до 1, съ модулемъ 3 до 2, съ модулемъ 5 до 4, и т. д.

Такъ, имѣя сравненіе $x^5 + x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{3}$, мы степень его можемъ понизить до 2-хъ. Для этого ищемъ остатокъ отъ дѣленія $x^5 + x^2 - 1$ на $x^3 - x$. Такъ какъ этотъ остатокъ есть $x^2 + x - 1$; то рассматриваемое нами сравненіе замѣнится такимъ

$$x^2 + x - 1 \equiv 0 \pmod{3}.$$

§ 21. Показавши какимъ образомъ степень сравненія съ модулемъ p можетъ быть понижена до $p-1$, приступимъ теперь къ опредѣленію условій, подъ которыми сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ m рѣшеній, гдѣ m не болѣе $p-1$. Мы здѣсь предполагаемъ коэффициентъ высшей степени x равнымъ единицѣ; ибо видѣли, что это можетъ быть сдѣлано во всякомъ сравненіи.

Вотъ теоремы, по которымъ мы всегда узнаемъ, имѣетъ ли данное сравненіе столько рѣшеній, сколько въ показателѣ его степени находится единицъ, или нѣтъ.

25. ТЕОРЕМА.

Если сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ m рѣшеній, то въ остатокъ отъ дѣленія $x^p - x$ на $x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M$ всѣ коэффициенты дѣлятся на p .

Доказательство. Пусть будетъ Fx частное отъ дѣленія

$x^p - x$ на $x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M$ и Φx остатокъ отъ этого дѣленія. Приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ $x^p - x = Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) + \Phi x$; откуда выходитъ $x^p - x - Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) = \Phi x$ (11).

Возьмемъ теперь сравненіе

$$x^p - x - Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) \equiv 0 \pmod{p}$$

и докажемъ, что въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ это сравненіе имѣеть не менѣе m рѣшеній. Это слѣдуетъ изъ того, что при всѣхъ величинахъ x , выраженіе $x^p - x$, какъ видѣли въ § 20, сравнимо съ 0 по модулю p ; выраженіе же

$$Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M)$$

становится сравнимымъ съ 0 по модулю p при всѣхъ числахъ, удовлетворяющихъ сравненію

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p};$$

это же сравненіе имѣеть m рѣшеній, по положенію.

Итакъ сравненіе

$$x^p - x - Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) \equiv 0$$

имѣеть по крайней мѣрѣ m рѣшеній. Но оно по (11) приводится къ

$$\Phi x \equiv 0 \pmod{p},$$

котораго степень меньше m ; ибо Φx означаетъ у насъ остатокъ отъ дѣленія $x^p - x$ на

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M.$$

Убѣдясь такимъ образомъ съ одной стороны, что сравненіе

$$\Phi x \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣеть по крайней мѣрѣ m рѣшеній, а съ другой, что оно степени ниже m , мы, по теоремѣ 21-ой заключаемъ, что въ Φx всѣ коэффициенты суть числа кратныя p , въ чемъ и заключается предложенная нами теорема.

Докажемъ теперь обратную этой теоремѣ.

26. Т Е О Р Е М А.

Если остатокъ отъ дѣленія $x^p - x$ на $x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M$ имѣеть всѣ коэффициенты кратныя p ; то

сравненіе

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ m рѣшеній.

Доказательство. Пусть будутъ Fx и Φx частное и остатокъ отъ дѣленія $x^p - x$ на

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M;$$

остатокъ Φx , по положенію, будетъ имѣть всѣ коэффициенты кратные p ; поэтому для всякой величины x будетъ

$$\Phi x \equiv 0 \pmod{p} \quad (12);$$

частное же Fx будетъ цѣлая функція такого вида

$$x^{p-m} + B_1 x^{p-m-1} + \dots$$

Приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, сложенному съ остаткомъ, найдемъ

$$x^p - x = Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) + \Phi x;$$

откуда

$$x^p - x - \Phi x = Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M).$$

Но такъ какъ, по (12) и по сказанному нами выше относительно $x^p - x$, выраженіе $x^p - x - \Phi x$ сравнимо съ нулемъ по модулю p для всѣхъ чиселъ $0, 1, 2, \dots, p-1$; то всѣ эти числа будутъ удовлетворять сравненію

$$Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) \equiv 0 \pmod{p};$$

ибо первая часть его, по выведенному нами сейчасъ уравненію, тождественна разности $x^p - x - \Phi x$.

Итакъ всѣ числа $0, 1, 2, \dots, p-1$ удовлетворяютъ сравненію

$$Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но этому сравненію никакое число не можетъ удовлетворять, не удовлетворяя ни одному изъ сравненій

$$Fx \equiv 0, \quad x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, если эти сравненія не удовлетворяются при

$x = \alpha$, то $F\alpha$ и $\alpha^m + B\alpha^{m-1} + C\alpha^{m-2} + \dots + L\alpha + M$ суть числа не дѣлящіяся на p , а потому и простыя съ p ; ибо p число само простое. Но если $F\alpha$ и

$$\alpha^m + B\alpha^{m-1} + C\alpha^{m-2} + \dots + L\alpha + M$$

суть числа простыя съ p ; то и произведеніе ихъ

$$F\alpha(\alpha^m + B\alpha^{m-1} + C\alpha^{m-2} + \dots + L\alpha + M)$$

число простое съ p и слѣд. сравненіе

$$Fx(x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M) \equiv 0 \pmod{p}$$

при $x = \alpha$ не удовлетворяется.

Итакъ каждое изъ p чиселъ $0, 1, 2, \dots, p-1$ будетъ удовлетворять по крайней мѣрѣ одному изъ сравненій

$$Fx \equiv 0, x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p},$$

а потому, если назовемъ черезъ n и n' , сколько чиселъ въ ряду $0, 1, 2, \dots, p-1$ удовлетворяетъ сравненію $Fx \equiv 0 \pmod{p}$ и

$$x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p};$$

то сумма $n + n'$ будетъ не менѣе p . При томъ, числа n, n' , означая, сколько чиселъ въ ряду $0, 1, 2, \dots, p-1$ удовлетворяютъ сравненіямъ

$$Fx \equiv 0, x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p},$$

будутъ равны числу рѣшеній этихъ сравненій; слѣд., по теоремѣ 20-й, число n' не болѣе m , а n не болѣе $p - m$; ибо, видѣли, Fx есть функція такого вида $x^{p-m} + B_1x^{p-m-1} + \dots$

Итакъ числа n, n' , опредѣляющія число рѣшеній сравненій $Fx \equiv 0, x^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Lx + M \equiv 0 \pmod{p}$,

будутъ удовлетворять условіямъ

$$n + n' \geq p, \quad n \leq p - m, \quad n' \leq m.$$

Первыя два условія, по исключеніи n , даютъ $n' \geq m$, а это, въ совокупности съ условіемъ $n' \leq m$, обнаруживаетъ равенство $n' = m$. Откуда и слѣдуетъ предложенная теорема.

На основаніи послѣднихъ двухъ теоремъ мы узнаемъ всегда, имѣетъ ли данное сравненіе столько рѣшеній, сколько въ пока-

зателѣ его степени содержится единицъ. Для этого мы, сдѣлавъ предварительно коэффициентъ высшей степени x въ данномъ сравненіи равнымъ единицѣ по способу, показанному въ § 17, и называя черезъ p модуль его, дѣлимъ $x^p - x$ на первую часть сравненія. Если остатокъ, получаемый при этомъ дѣленіи, имѣетъ всѣ коэффициенты кратные p , то по послѣдней теоремѣ мы заключимъ, что данное сравненіе имѣетъ столько рѣшеній, сколько въ показателѣ его степени содержится единицъ. Въ противномъ же случаѣ, по теоремѣ предпослѣдней мы заключимъ, что сравненіе не имѣетъ столько рѣшеній.

Напр. чтобы узнать, имѣетъ ли сравненіе

$$x^3 - x^2 - 2x \equiv 0 \pmod{5}$$

три рѣшенія, или нѣтъ, мы дѣлимъ $x^5 - x$ на $x^3 - x^2 - 2x$. Такъ какъ остатокъ этого дѣленія есть $5x^2 + 5x$, гдѣ оба коэффициента дѣлятся на 5, то мы заключаемъ, что рассматриваемое нами сравненіе имѣетъ три рѣшенія.

Напротивъ, дѣля $x^5 - x$ на $x^3 + x^2 - 2$ и находя въ остаткѣ $x^2 - 3x + 2$, гдѣ коэффициенты не дѣлятся на 5, заключаемъ, что сравненіе

$$x^3 + x^2 - 2 \equiv 0 \pmod{5}$$

имѣетъ менѣе трехъ рѣшеній.

ГЛАВА IV.

О сравненіяхъ второй степени.

§ 22. Общій видъ сравненій второй степени есть

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}.$$

Это сравненіе приводится къ сравненіямъ первой степени въ двухъ случаяхъ. Во первыхъ, когда $p = 2$. Въ этомъ случаѣ по 24-й теоремѣ, степень сравненія

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

можетъ быть понижена до 1. Во вторыхъ, сравненіе

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

приводится къ первой степени, когда a дѣлится на p ; ибо въ этомъ случаѣ будемъ имѣть

$$a \equiv 0 \pmod{p},$$

что по умноженіи на x^2 даетъ

$$ax^2 \equiv 0 \pmod{p},$$

вычитая же это сравненіе изъ $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$, найдемъ $bx + c \equiv 0 \pmod{p}$.

Итакъ въ случаѣ $p = 2$ или a кратнаго p , сравненіе $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ приводится къ сравненію первой степени, которое рѣшить мы умѣемъ. Обращаемся теперь къ случаю p не $= 2$ и a не дѣлящагося на p , и для упрощенія нашихъ изысканій ограничимся сначала случаемъ p простого.

Мы теперь покажемъ, къ чему приводится въ этомъ случаѣ рѣшеніе сравненія

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}.$$

Такъ какъ p предполагаемъ числомъ простымъ, отличнымъ отъ 2, и a не дѣлящимся на p , то $4a$ будетъ число простое съ p ; а потому, какъ не трудно убѣдиться, сравненіе $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ будетъ тождественно такому $4a(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{p}$. Въ самомъ дѣлѣ, первое сравненіе предполагаетъ второе; ибо, не нарушая сравненія, мы можемъ члены его умножить на всякое число; обратно, второе предполагаетъ первое; ибо оно получается изъ втораго сокращеніемъ общаго множителя $4a$, — сокращеніемъ позволительнымъ, потому что $4a$ число простое съ p . Но сравненіе $4a(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{p}$ можетъ быть такъ написано

$$(2ax + b)^2 - b^2 + 4ac \equiv 0 \pmod{p}.$$

Откуда выводимъ

$$z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p},$$

предполагая

$$z = 2ax + b.$$

Изъ этого мы видимъ, что рѣшеніе сравненія

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

приводится къ рѣшенію сравненія

$$z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$$

и опредѣленію x по уравненію

$$2ax + b = z.$$

Но что касается до опредѣленія x по уравненію $2ax + b = z$, когда рѣшеніемъ сравненія $z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$ найдено z , то оно сводится на рѣшеніе сравненія первой степени. Въ самомъ дѣлѣ, рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p}$, по замѣченному нами вообще о рѣшеніи сравненій $fx \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ fx цѣлая функція x съ цѣлыми коэффициентами, представится однимъ или нѣсколькими сравненіями вида

$$z \equiv \alpha \pmod{p}.$$

Вслѣдствіе чего, для опредѣленія неизвѣстнаго x , связаннаго съ z уравненіемъ $2ax + b = z$, будемъ имѣть

$$2ax + b \equiv \alpha \pmod{p}.$$

Эго сравненіе, какъ первой степени, мы рѣшать умѣемъ; замѣтимъ также, что оно, въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ, будетъ всегда имѣть одно рѣшеніе; ибо здѣсь $2a$ и p будутъ числа относительно другъ друга простыя.

Итакъ вся трудность рѣшенія сравненія

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$$

заключается въ рѣшеніи сравненія

$$z^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p};$$

этимъ сравненіемъ мы теперь и займемся. Мы его будемъ писать такъ

$$z^2 \equiv q \pmod{p},$$

полагая для сокращенія $b^2 - 4ac = q$.

Разсматривая сравненіе

$$z^2 \equiv q \pmod{p},$$

мы замѣчаемъ, что оно при $q \equiv 0 \pmod{p}$ будетъ удовлетво-
ряться предположеніемъ $z \equiv 0 \pmod{p}$. Не трудно также убѣ-
диться, что въ этомъ случаѣ $z \equiv 0 \pmod{p}$ есть единственное
рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$. Въ самомъ дѣлѣ, если q
сравнимо съ нулемъ по модулю p , то сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$
выражаетъ дѣлимость z^2 на p . Но p , будучи числомъ простымъ,
не можетъ дѣлиться на квадратъ какого либо числа; слѣд. по
6-ой теоремѣ, дѣлимость z^2 на p предполагаетъ дѣлимость z на p ,
а это выражается сравненіемъ

$$z \equiv 0 \pmod{p}.$$

Итакъ, если q сравнимо съ нулемъ по модулю p , то сравне-
ніе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ одно только рѣшеніе $z \equiv 0 \pmod{p}$.

Переходимъ теперь къ случаю q несравнимаго съ нулемъ
по модулю p ; въ этомъ случаѣ относительно рѣшеній сравне-
нія $z^2 \equiv q \pmod{p}$ будетъ имѣть мѣсто слѣдующая теорема:

27. ТЕОРЕМА.

Если q не сравнимо съ нулемъ по модулю p ; то сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ или не имѣетъ рѣшенія или имѣетъ два рѣшенія.

Доказательство. Мы видѣли, что вообще сравненіе $fx \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ столько рѣшеній, сколько чиселъ въ ряду $0, 1, 2, \dots, p-1$ ему удовлетворяетъ. На основаніи этого не трудно доказать, что сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$, при $q \not\equiv 0 \pmod{p}$, не можетъ имѣть одно только рѣшеніе. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ a то число, которое въ ряду $0, 1, 2, \dots, p-1$ удовлетворяетъ сравненію $z^2 \equiv q \pmod{p}$. Число a не можетъ быть нулемъ: ибо, дѣлая въ сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$ число z равнымъ нулю, находимъ $0 \equiv q \pmod{p}$, что противно положенію. Итакъ a будетъ однимъ изъ чиселъ $1, 2, \dots, p-1$.

Но не трудно убѣдиться, что если a удовлетворяетъ срав-
ненію $z^2 \equiv q \pmod{p}$, то $p-a$ будетъ также удовлетворять ему:
ибо $(p-a)^2$, какъ равное $p^2 - 2ap + a^2$, сравнимо съ a^2 , по мо-
дулю p . Слѣдовательно, $p-a$ будетъ опредѣлять второе рѣшеніе

сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$, если число $p - a$ заключается въ ряду

$$0, 1, 2, \dots, p-1$$

и отлично отъ a . Но первое слѣдуетъ изъ того, что a не болѣе p и не менѣе 1: второе же необходимо должно имѣть мѣсто, потому что, въ противномъ случаѣ, было бы $p - a = a$, и слѣд. $2a = p$, что невозможно, ибо p число простое отличное отъ 2, а потому четнымъ быть не можетъ.

Итакъ, если въ ряду найдется одно число, удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv q \pmod{p}$, то найдется и другое, ему удовлетворяющее. Слѣд. это сравненіе не можетъ имѣть одно только рѣшеніе. Но это сравненіе, будучи второй степени, не можетъ имѣть также болѣе двухъ рѣшеній; слѣдовательно, оно должно имѣть или два рѣшенія или ни одного, что и слѣдовало доказать.

§ 23. Мы займемся теперь изслѣдованіемъ признаковъ, по которымъ можно узнать, имѣетъ ли сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$, гдѣ предполагаемъ $q \not\equiv 0 \pmod{p}$, два рѣшенія или нѣтъ.

На основаніи теоремъ, доказанныхъ нами въ § 21, не трудно узнать, имѣетъ ли данное сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ два рѣшенія, или нѣтъ. Для этого, мы должны найти остатокъ, получаемый при дѣленіи $z^p - z$ на $z^2 - q$. Чтобы найти этотъ остатокъ, мы дѣлимое $z^p - z$ представляемъ такъ

$$z \left[(z^2)^{\frac{p-1}{2}} - q^{\frac{p-1}{2}} \right] + z \left[q^{\frac{p-1}{2}} - 1 \right]$$

и замѣчаемъ, что $(z^2)^{\frac{p-1}{2}} - q^{\frac{p-1}{2}}$ дѣлится на $z^2 - q$. Слѣд. при дѣленіи этого выраженія на $z^2 - q$, остатокъ будетъ

$$z \left[q^{\frac{p-1}{2}} - 1 \right].$$

Отсюда, по теоремѣ 26-й, мы заключаемъ, что сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ два рѣшенія, если $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$ дѣлится на p , или, что одно и то же, по нашему знакоположенію, если имѣетъ мѣсто сравненіе

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p},$$

Если же это сравненіе не удовлетворяется и слѣд. $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1$ не дѣлится на p , то, по теоремѣ 25-ой, заключимъ, что сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ не имѣетъ двухъ рѣшеній, а потому оно не можетъ имѣть и одного рѣшенія; ибо, по теоремѣ 27-й, это сравненіе или имѣетъ два рѣшенія или не имѣетъ ни одного.

Итакъ, сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ два рѣшенія, или не имѣетъ ни одного, смотря по тому, будетъ ли

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p},$$

или это сравненіе не будетъ имѣть мѣста. Въ первомъ случаѣ, мы будемъ говорить, что сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ возможно; во второмъ, что оно невозможно.

Припомнимъ здѣсь, что все это выведено нами въ предположеніи, что p число простое, отличное отъ 2, а q какое нибудь число положительное, или отрицательное, не дѣлящееся на p .

Такъ, чтобы узнать, имѣетъ ли сравненіе $z^2 \equiv 3 \pmod{5}$ рѣшенія или нѣтъ, мы возводимъ 3 въ степень $\frac{5-1}{2}$, или 2. Находя, что 3^2 не сравнимо съ 1 по модулю 5, мы заключаемъ, что сравненіе $z^2 \equiv 3 \pmod{5}$ не имѣетъ рѣшенія, другими словами, это сравненіе невозможно.

Напротивъ, мы убѣждаемся, что сравненіе $z^2 \equiv 2 \pmod{7}$ имѣетъ рѣшенія, находя что $2^{\frac{7-1}{2}} = 8$ и 8 сравнимо съ 1 по модулю 7.

§ 24. Если p и q не велики, то не трудно узнать, удовлетворяется ли сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, или нѣтъ. Но это становится весьма труднымъ, когда p и q большія числа. Мы покажемъ теперь, какимъ образомъ, не вычисляя значенія $q^{\frac{p-1}{2}}$, можно рѣшить, удовлетворяется ли сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

или нѣтъ и чрезъ то узнать, имѣтъ ли рѣшенія сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$, или нѣтъ. Съ этою цѣлію мы докажемъ теперь, что если q не дѣлится на p и p число простое, отличное отъ 2, какъ мы и предполагали, то число $q^{\frac{p-1}{2}}$ удовлетворяетъ всегда одному изъ двухъ сравненій

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1, \quad q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, если ни одно изъ этихъ сравненій не удовлетворяется, то ни число $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$, ни число $q^{\frac{p-1}{2}} + 1$ не дѣлится на p ; и слѣд. оба они простые съ p ; ибо p само по себѣ простое число. Но если оба числа $q^{\frac{p-1}{2}} - 1$, $q^{\frac{p-1}{2}} + 1$ суть простые съ p , то и произведеніе ихъ $\left(q^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(q^{\frac{p-1}{2}} + 1\right)$, или $q^{p-1} - 1$ число простое съ p ; а это не справедливо; ибо по теоремѣ Фермата, разность $q^{p-1} - 1$ дѣлится на p .

Итакъ, одно изъ двухъ сравненій

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1, \quad q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

необходимо должно удовлетвориться. Съ другой стороны не трудно убѣдиться, что оба эти сравненія въ одно время не могутъ имѣть мѣста; ибо, допустивши ихъ, мы находимъ $1 \equiv -1 \pmod{p}$, откуда $2 \equiv 0 \pmod{p}$, что не возможно; ибо p , предполагаемое отличнымъ отъ 2, дѣлить 2 не можетъ.

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что возможность удовлетворить сравненію $z^2 \equiv q \pmod{p}$ опредѣляется знакомъ, съ которымъ сравненіе

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

удовлетворяется. Если оно удовлетворяется съ $+$, то сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣтъ рѣшенія, и въ этомъ случаѣ число q называютъ *квадратичнымъ вычетомъ* числа p ; въ противномъ

случаѣ, если сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$ удовлетворяется съ знакомъ—, сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ не имѣетъ рѣшенія и число q называютъ *неквадратичнымъ вычетомъ* числа p . Кромѣ того для сокращенія письма вмѣсто того, чтобы писать p и q удовлетворяютъ сравненію $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, [что, какъ видѣли, есть признакъ возможности сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$] согласились писать

$$\left(\frac{q}{p}\right) = 1;$$

въ противномъ же случаѣ, если $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$, пишутъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -1.$$

По этому знакоположенію $\left(\frac{q}{p}\right)$ будетъ означать 1 съ тѣмъ изъ двухъ знаковъ $\pm$, съ которымъ она удовлетворяетъ сравненію $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$, и слѣд., значеніе этого символа выполнѣ будетъ опредѣлено сравненіемъ $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{p}$ и условіемъ, что численная величина $\left(\frac{q}{p}\right)$ есть 1.

Такъ мы нашли, что сравненіе $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетворяется при $q=2$, $p=7$. Слѣд., по нашему знакоположенію будетъ

$$\left(\frac{2}{7}\right) = 1.$$

Напротивъ мы видѣли, что $3^{\frac{5-1}{2}}$ по модулю 5 сравнимо съ —1; слѣд.

$$\left(\frac{3}{5}\right) = -1.$$

Такимъ образомъ изъ $\left(\frac{2}{7}\right) = 1$ мы заключаемъ о возможности рѣшить сравненіе $z^2 \equiv 2 \pmod{7}$, и число 2 называемъ *квадратичнымъ вычетомъ* 7. Напротивъ изъ равенства $\left(\frac{3}{5}\right) = -1$ заключимъ, что сравненіе $x^2 \equiv 3 \pmod{5}$ не имѣетъ рѣшенія и слѣдовательно 3 будетъ *неквадратичный вычетъ* 5.

§ 25. Показавши значеніе символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, мы приступимъ теперь къ раскрытію его свойствъ. Для этого мы докажемъ слѣдующія теоремы:

28. ТЕОРЕМА.

Величина символа $\left(\frac{1}{p}\right)$ есть 1, а символа $\left(\frac{-1}{p}\right)$ есть $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$.

Доказательство. Мы видѣли, что символъ $\left(\frac{q}{p}\right)$ удовлетворяетъ сравненію $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{p}$.

Дѣлая здѣсь послѣдовательно $q = 1$ и $q = -1$, находимъ

$$1 \equiv \left(\frac{1}{p}\right), \quad (-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{-1}{p}\right) \pmod{p},$$

или

$$1 - \left(\frac{1}{p}\right) \equiv 0, \quad (-1)^{\frac{p-1}{2}} - \left(\frac{-1}{p}\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Такъ какъ численная величина значеній символовъ $\left(\frac{1}{p}\right)$, $\left(\frac{-1}{p}\right)$ есть 1; то разности $1 - \left(\frac{1}{p}\right)$, $(-1)^{\frac{p-1}{2}} - \left(\frac{-1}{p}\right)$, при неравенствѣ $\left(\frac{1}{p}\right)$ съ 1, $\left(\frac{-1}{p}\right)$ съ $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$, приведутся или къ 2 или къ -2 ; но ни 2 ни -2 не сравнимо съ 0 по модулю p ; ибо p отлично отъ двухъ. Слѣд., нельзя допустить неравенства $\left(\frac{1}{p}\right)$ съ 1, $\left(\frac{-1}{p}\right)$ съ $(-1)^{\frac{p-1}{2}}$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что $\left(\frac{1}{5}\right) = 1$, $\left(\frac{-1}{5}\right) = 1$, $\left(\frac{-1}{11}\right) = -1$.

29. ТЕОРЕМА.

Если Q есть произведеніе чиселъ $q_1, q_2, \dots, q_n$, то

$$\left(\frac{Q}{p}\right) = \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right).$$

Доказательство. Символы $\left(\frac{Q}{p}\right), \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\dots\left(\frac{q_n}{p}\right)$, какъ видѣли, удовлетворяютъ сравненіямъ

$$Q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{Q}{p}\right), q_1^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right), q_2^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_2}{p}\right), \dots, q_n^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_n}{p}\right) \pmod{p}.$$

Перемножая всѣ эти сравненія, кромѣ перваго, между собою, находимъ

$$q_1^{\frac{p-1}{2}} q_2^{\frac{p-1}{2}} \dots q_n^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right) \pmod{p},$$

или, что одно и тоже,

$$[q_1 q_2 \dots q_n]^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right) \pmod{p}.$$

Но по положенію произведеніе $q_1 q_2 \dots q_n$ равно Q ; вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе представится такъ

$$Q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right) \pmod{p}.$$

Но мы видѣли, что $Q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{Q}{p}\right) \pmod{p}$.

Это сравненіе, вмѣстѣ съ предыдущимъ даетъ

$$\left(\frac{Q}{p}\right) \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right) \pmod{p},$$

или

$$\left(\frac{Q}{p}\right) - \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но такъ какъ численная величина символовъ

$$\left(\frac{Q}{p}\right), \left(\frac{q_1}{p}\right), \left(\frac{q_2}{p}\right), \dots, \left(\frac{q_n}{p}\right)$$

есть 1; то разность выраженій $\left(\frac{Q}{p}\right)$ и $\left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\dots\left(\frac{q_n}{p}\right)$, въ случаѣ неравенства ихъ, приведется или къ $+2$ или къ -2 . Но ни въ томъ ни въ другомъ случаѣ предыдущее сравненіе не можетъ имѣть мѣста; ибо p число отличное отъ 2. Итакъ, нельзя допустить неравенства величинъ $\left(\frac{Q}{p}\right), \left(\frac{q_1}{p}\right)\left(\frac{q_2}{p}\right)\dots\left(\frac{q_n}{p}\right)$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

На основаніи этой теоремы, опредѣленіе символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$ при Q составномъ, сводится на опредѣленіе символовъ

$$\left(\frac{q_1}{p}\right), \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right),$$

гдѣ $q_1, q_2, \dots, q_n$ простые числа, составляющія Q . Такъ, желая опредѣлить $\left(\frac{15}{7}\right)$, $\left(\frac{30}{101}\right)$, найдемъ, что

$$\left(\frac{15}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) \left(\frac{5}{7}\right), \quad \left(\frac{30}{101}\right) = \left(\frac{2}{101}\right) \left(\frac{3}{101}\right) \left(\frac{5}{101}\right).$$

На основаніи этой же теоремы, мы заключаемъ о такомъ равенствѣ

$$\left(\frac{q^n}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)^n.$$

Чтобы вывести это изъ доказанной нами теоремы, стоитъ принять числа $q_1, q_2, \dots, q_n$ за равныя q . Въ этомъ случаѣ уравненіе

$$\left(\frac{Q}{p}\right) = \left(\frac{q_1}{p}\right) \left(\frac{q_2}{p}\right) \dots \left(\frac{q_n}{p}\right)$$

намъ дастъ

$$\left(\frac{Q}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)^n;$$

число же Q , равное произведенію $q_1 q_2 \dots q_n$, приведетъ къ q^n .

Такъ найдемъ, что

$$\left(\frac{27}{5}\right) = \left(\frac{3^3}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right)^3, \quad \left(\frac{32}{7}\right) = \left(\frac{2^5}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right)^5.$$

Въ частномъ случаѣ $n = 2$, мы изъ уравненія

$$\left(\frac{q^n}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)^n$$

выводимъ

$$\left(\frac{q^2}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)^2.$$

Но будетъ ли $\left(\frac{q}{p}\right)$ равно $+1$, или -1 , всегда квадратъ его будетъ 1; слѣд.

$$\left(\frac{q^2}{p}\right) = 1.$$

Это свойство символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$ можетъ служить къ значительнымъ упрощеніямъ при опредѣленіи ихъ величинъ. По доказан-

ной нами теоремѣ мы имѣемъ

$$\left(\frac{Nq^2}{p}\right) = \left(\frac{N}{p}\right) \left(\frac{q^2}{p}\right);$$

куда внеся значеніе $\left(\frac{q^2}{p}\right)$ изъ предыдущаго уравненія, находимъ

$$\left(\frac{Nq^2}{p}\right) = \left(\frac{N}{p}\right).$$

На основаніи этого равенства мы заключаемъ, что при опредѣленіи величины символа $\left(\frac{Q}{p}\right)$ мы можемъ исключать изъ Q всякій множитель, составляющій точный квадратъ.

Такъ опредѣленіе $\left(\frac{45}{7}\right)$ сводится на опредѣленіе $\left(\frac{5}{7}\right)$; опредѣленіе $\left(\frac{8}{5}\right)$ на опредѣленіе $\left(\frac{2}{5}\right)$.

Прежде чѣмъ пойдемъ далѣе, замѣтимъ, что на основаніи доказанныхъ нами теоремъ относительно символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, значеніе $\left(\frac{-q}{p}\right)$ по $\left(\frac{q}{p}\right)$ опредѣляется уравненіемъ

$$\left(\frac{-q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right).$$

Въ самомъ дѣлѣ, на основаніи послѣдней теоремы, разсматривая $(-q)$, какъ произведеніе (-1) и q , находимъ

$$\left(\frac{-q}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{q}{p}\right);$$

куда внеся значеніе $\left(\frac{-1}{p}\right)$ по 28-й теоремѣ, имѣемъ

$$\left(\frac{-q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right),$$

что и слѣдовало доказать. Такъ находимъ

$$\left(\frac{-3}{5}\right) = (-1)^{\frac{5-1}{2}} \left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right); \quad \left(\frac{-2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2}} \left(\frac{2}{7}\right) = -\left(\frac{2}{7}\right).$$

30. ТЕОРЕМА.

Если q и q_1 сравнимы по модулю p , то $\left(\frac{q}{p}\right) = \left(\frac{q_1}{p}\right)$.

Доказательство. По положенію числа q и q_1 сравнимы по

модулю p . Но изъ сравненія

$$q \equiv q_1 \pmod{p},$$

по возведеніи обѣихъ частей его въ степень $\frac{p-1}{2}$, имѣемъ

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv q_1^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Символы же $\left(\frac{q}{p}\right)$, $\left(\frac{q_1}{p}\right)$ удовлетворяють сравненіямъ

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right), \quad q_1^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \pmod{p}.$$

Вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе даетъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) \equiv \left(\frac{q_1}{p}\right) \pmod{p},$$

или

$$\left(\frac{q}{p}\right) - \left(\frac{q_1}{p}\right) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но такъ какъ численная величина $\left(\frac{q}{p}\right)$ и $\left(\frac{q_1}{p}\right)$ есть 1; то первая часть этого сравненія, въ случаѣ неравенства значеній $\left(\frac{q}{p}\right)$ и $\left(\frac{q_1}{p}\right)$, будетъ $+2$, или -2 , что невозможно, ибо p отлнчно отъ 2. Слѣд. оба эти символа должны имѣть одну величину, что и слѣдовало доказать.

Такъ находимъ, что $\left(\frac{23}{7}\right) = \left(\frac{23-7}{7}\right) = \left(\frac{23-2 \cdot 7}{7}\right)$.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что символъ $\left(\frac{q}{p}\right)$ равенъ $\left(\frac{r}{p}\right)$, если r есть остатокъ отъ дѣленія q на p ; ибо, какъ замѣтили въ § 8, остатокъ сравнимъ съ дѣлимымъ, когда за модуль принять дѣлитель. Такимъ образомъ, замѣняя въ символѣ $\left(\frac{q}{p}\right)$ число q остаткомъ отъ дѣленія q на p , мы вмѣсто $\left(\frac{q}{p}\right)$ будемъ имѣть $\left(\frac{r}{p}\right)$, гдѣ $r < p$.

§ 26. Вотъ теоремы, которыя послужатъ намъ для того, чтобы опредѣленіе какого либо символа $\left(\frac{q}{p}\right)$ привести къ опредѣленію символовъ вида $\left(\frac{q}{p}\right)$, гдѣ q число положительное, простое и меньше p . Что же касается до опредѣленія символа $\left(\frac{q}{p}\right)$,

когда q число положительное, простое и меньше p , то оно будет основываться на слѣдующихъ теоремахъ:

31. ТЕОРЕМА.

Если мы согласимся изображать наибольшее цѣлое число, заключающееся въ данномъ количествѣ, знакомъ E , поставленнымъ передъ нимъ, то значеніе $\left(\frac{q}{p}\right)$ опредѣлится уравненіемъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}}.$$

Доказательство. Нетрудно убѣдиться, что при p нечетномъ и a положительномъ, можно найти положительное число z , которое, будучи меньше $\frac{p}{2}$, удовлетворитъ условію

$$z \equiv (-1)^{E\frac{2a}{p}} a \pmod{p} \quad (13).$$

Въ самомъ дѣлѣ, если $E\frac{2a}{p}$ число четное, то это сравненіе принимаетъ такой видъ

$$z \equiv a \pmod{p}.$$

Но въ этомъ случаѣ $\frac{1}{2} E\frac{2a}{p}$ будетъ число цѣлое; а потому $a - \frac{1}{2} p E\frac{2a}{p}$ будетъ число цѣлое, удовлетворяющее сравненію

$$z \equiv a \pmod{p}.$$

Это же число, которое можетъ быть представлено такъ

$$\frac{p}{2} \left(\frac{2a}{p} - E\frac{2a}{p} \right),$$

будетъ количествомъ положительнымъ и меньшимъ $\frac{p}{2}$; ибо по значенію $E\frac{2a}{p}$, разность $\frac{2a}{p} - E\frac{2a}{p}$ должна быть не менѣе 0 и меньше 1.

Обращаемся теперь къ тому случаю, когда $E\frac{2a}{p}$ число не четное. Если $E\frac{2a}{p}$ число нечетное, то сравненіе (13) принимаетъ такой видъ

$$z \equiv -a \pmod{p}.$$

Но въ этомъ случаѣ $\frac{1 + E \frac{2a}{p}}{2}$ есть число цѣлое; а потому предыдущему сравненію удовлетворимъ, полагая

$$z = \frac{1}{2} p \left(1 + E \frac{2a}{p} \right) - a,$$

а это число, которое иначе представится такъ

$$\frac{p}{2} \left[1 - \left(\frac{2a}{p} - E \frac{2a}{p} \right) \right],$$

очевидно, положительное и не больше $\frac{p}{2}$; ибо, какъ замѣчали выше, разность $\frac{2a}{p} - E \frac{2a}{p}$ не выходитъ изъ предѣловъ 0 и 1.

Убѣдившись такимъ образомъ въ возможности всегда удовлетворить условіямъ

$$z \equiv (-1)^{E \frac{2a}{p}} a \pmod{p}, \quad z \text{ не } < 0 \text{ и } < \frac{p}{2},$$

назовемъ черезъ $z_1, z_2, \dots, z_{\frac{p-1}{2}}$ числа, удовлетворяющія имъ

въ предположеніяхъ $a = q, a = 2q, \dots, a = \frac{p-1}{2} q$. Эти числа будутъ удовлетворять сравненіямъ

$$z_1 \equiv (-1)^{E \frac{2q}{p}} q, z_2 \equiv (-1)^{E \frac{4q}{p}} 2q, \dots, z_{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{E \frac{(p-1)q}{p}} \frac{p-1}{2} q \pmod{p} \quad (14),$$

которыя по перемноженіи дають

$$z_1 z_2 \dots z_{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{E \frac{2q}{p} + E \frac{4q}{p} + \dots + E \frac{(p-1)q}{p}} 1.2 \dots \frac{p-1}{2} q^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \quad (15).$$

Но не трудно убѣдиться, что произведеніе $z_1 z_2 \dots z_{\frac{p-1}{2}}$ равно произведенію $1.2 \dots \frac{p-1}{2}$. Для этого мы замѣчаемъ, что числа $z_1, z_2, \dots, z_{\frac{p-1}{2}}$, будучи меньше $\frac{p}{2}$ и не меньше 0, могутъ имѣть только значенія 0, 1, 2, $\dots, \frac{p-1}{2}$.

Потомъ мы замѣчаемъ, что ни одно изъ нихъ не можетъ быть нулемъ; ибо въ противномъ случаѣ предыдущее сравненіе предполагало бы дѣлимость $1 \cdot 2 \dots \frac{p-1}{2}$ на p ; между тѣмъ какъ $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ числа простыя съ p . Итакъ, числа $z_1, z_2, \dots, z_{\frac{p-1}{2}}$ могутъ равняться только числамъ

$$1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}.$$

Также не трудно показать, что въ ряду $z_1, z_2, \dots, z_{\frac{p-1}{2}}$ нѣтъ двухъ чиселъ равныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы допустимъ, что здѣсь z_m и z_μ равны, гдѣ m и μ какія нибудь два числа, содержащіяся въ ряду $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$; то имѣя по (14),

$$z_m \equiv (-1)^{\frac{E 2qm}{p}} m q, \quad z_\mu \equiv (-1)^{\frac{E 2q\mu}{p}} \mu q \pmod{p},$$

мы бы нашли

$$(-1)^{\frac{E 2qm}{p}} m q \equiv (-1)^{\frac{E 2q\mu}{p}} \mu q \pmod{p}.$$

Но это сравненіе по сокращеніи на q , число простое съ p , даетъ

$$(-1)^{\frac{E 2qm}{p}} m \equiv (-1)^{\frac{E 2q\mu}{p}} \mu \pmod{p},$$

что, очевидно, невозможно; ибо оно предполагаетъ дѣлимость разности

$$(-1)^{\frac{E 2qm}{p}} m - (-1)^{\frac{E 2q\mu}{p}} \mu$$

на p ; а эта разность приводится къ одному изъ четырехъ:

$$m + \mu, \quad -(m + \mu), \quad m - \mu, \quad -(m - \mu),$$

и такъ какъ числа m, μ взяты нами изъ ряда $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ и не равны между собою, то сумма ихъ меньше p , а разность не равна нулю; слѣд. ни то, ни другое не дѣлится на p .

Такъ убѣждаемся мы, что въ составъ ряда

$$z_1, z_2, \dots, z_{\frac{p-1}{2}}$$

могутъ входить только числа

$$1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$$

и каждое только по одному разу. Но такъ какъ эти ряды заключаютъ одинакое число членовъ, то въ составъ перваго войдутъ всѣ числа втораго. Слѣдов. ряды

$$z_1, z_2, \dots, z_{\frac{p-1}{2}},$$

$$1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$$

составлены изъ однихъ и тѣхъ же чиселъ и притомъ взятыхъ по одному разу; а потому произведеніе членовъ перваго ряда равно произведенію членовъ втораго.

Убѣдясь въ этомъ, мы можемъ замѣнить въ (15) $z_1 z_2 \dots z_{\frac{p-1}{2}}$ числомъ $1.2.\dots.\frac{p-1}{2}$, послѣ чего (15), будучи сокращено на $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$, числа простыя съ p , даетъ

$$1 \equiv q^{\frac{p-1}{2}} (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}} \pmod{p}.$$

Умножая же обѣ части этого сравненія на

$$(-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}}$$

и замѣчая, что -1 , будучи возведена въ степень

$$2 \left[E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p} \right],$$

даетъ 1, находимъ

$$(-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}} q^{\frac{p-1}{2}} \equiv q \pmod{p}.$$

Но по свойству символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, мы имѣемъ

$$q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{p}.$$

Это же сравненіе вмѣстѣ съ предыдущимъ даетъ

$$\left(\frac{q}{p}\right) - (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}} \equiv 0 \pmod{p};$$

откуда мы заключаемъ о равенствѣ

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}};$$

ибо въ противномъ случаѣ первая часть этого сравненія привелась бы къ 2 или — 2, что съ нулемъ не сравнимо по модулю p , отличному отъ 2. Такъ убѣждаемся мы въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи этой теоремы, мы можемъ опредѣлить значеніе $\left(\frac{q}{p}\right)$, не возводя q въ степень $\frac{p-1}{2}$. Такъ, для опредѣленія величины $\left(\frac{5}{11}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{5}{11}\right) = (-1)^{E\frac{2 \cdot 5}{11} + E\frac{4 \cdot 5}{11} + E\frac{6 \cdot 5}{11} + E\frac{8 \cdot 5}{11} + E\frac{10 \cdot 5}{11}}.$$

Замѣчая, что

$$E\frac{2 \cdot 5}{11} = E\frac{10}{11} = 0, \quad E\frac{8 \cdot 5}{11} = E\frac{40}{11} = 3,$$

$$E\frac{4 \cdot 5}{11} = E\frac{20}{11} = 1, \quad E\frac{10 \cdot 5}{11} = E\frac{50}{11} = 4,$$

$$E\frac{6 \cdot 5}{11} = E\frac{30}{11} = 2, \quad 0+1+2+3+4=10,$$

мы изъ предыдущаго уравненія выводимъ

$$\left(\frac{5}{11}\right) = (-1)^{10} = 1.$$

Выведенное нами уравненіе для опредѣленія $\left(\frac{q}{p}\right)$ справедливо при всякомъ числѣ q . Но не трудно вывести изъ него уравненіе болѣе простое, которое будетъ служить для опредѣленія $\left(\frac{a}{p}\right)$, при a нечетномъ. Для этого въ уравненіи

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{E\frac{2q}{p} + E\frac{4q}{p} + \dots + E\frac{(p-1)q}{p}}$$

полагаемъ $q = \frac{1}{2}(a + p)$, гдѣ a , подобно p , число нечетное; это даетъ намъ

$$\left(\frac{\frac{1}{2}(a+p)}{p}\right) = (-1)^{E \frac{a+p}{p} + E \frac{2a+2p}{p} + \dots + E \frac{\frac{p-1}{2}a + \frac{p-1}{2}p}{p}}.$$

Умноживъ обѣ части этого уравненія на $\left(\frac{2}{p}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{\frac{1}{2}(a+p)}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{E \frac{a+p}{p} + E \frac{2a+2p}{p} + \dots + E \frac{\frac{p-1}{2}a + \frac{p-1}{2}p}{p}}.$$

Но по теоремѣ 29-й, произведеніе $\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{\frac{1}{2}(a+p)}{p}\right)$ равно $\left(\frac{\frac{1}{2} \cdot 2(a+p)}{p}\right)$, или $\left(\frac{a+p}{p}\right)$, а это по теоремѣ 30 равно $\left(\frac{a}{p}\right)$. Вслѣдствіе чего изъ предыдущаго уравненія выводимъ

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{E \frac{a+p}{p} + E \frac{2a+2p}{p} + \dots + E \frac{\frac{p-1}{2}a + \frac{p-1}{2}p}{p}}.$$

Но

$$\begin{aligned} E \frac{a+p}{p} &= E\left(\frac{a}{p} + 1\right) = 1 + E \frac{a}{p}, \\ E \frac{2a+2p}{p} &= E\left(\frac{2a}{p} + 2\right) = 2 + E \frac{2a}{p}, \\ &\dots\dots\dots \\ E \frac{\frac{p-1}{2}a + \frac{p-1}{2}p}{p} &= E\left(\frac{\frac{p-1}{2}a}{p} + \frac{p-1}{2}\right) = \frac{p-1}{2} + E \frac{\frac{p-1}{2}a}{p}. \end{aligned}$$

Слѣдовательно

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{1+2+\dots+\frac{p-1}{2} + E \frac{a}{p} + E \frac{2a}{p} + \dots + E \frac{\frac{p-1}{2}a}{p}}.$$

А такъ какъ сумма прогрессіи $1 + 2 + \dots + \frac{p-1}{2}$ равна $\frac{p^2-1}{8}$, то изъ этого уравненія выходитъ

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)(-1)^{\frac{p^2-1}{8} + E \frac{a}{p} + E \frac{2a}{p} + \dots + E \frac{\frac{p-1}{2}a}{p}} \quad (16).$$

Дѣлая въ этомъ уравненіи $a = 1$ и замѣчая, что

$$\left(\frac{1}{p}\right) = 1, \quad E \frac{1}{p} = 0, \quad E \frac{2}{p} = 0, \dots, \quad E \frac{p-1}{p} = 0,$$

находимъ

$$1 = \left(\frac{2}{p}\right) (-1)^{\frac{p^2-1}{8}},$$

что для опредѣленія величины $\left(\frac{2}{p}\right)$, даетъ

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{-\frac{p^2-1}{8}}.$$

Внося отсюда величину $\left(\frac{2}{p}\right)$ въ (16), находимъ

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{E \frac{a}{p} + E \frac{2a}{p} + \dots + E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}} \quad (17).$$

Вотъ уравненіе, которое можетъ служить для опредѣленія $\left(\frac{a}{p}\right)$, при a нечетномъ. Оно подобно тому, которое доказали въ предыдущей теоремѣ, съ тою только разницею, что здѣсь подъ знакомъ E находятся количества вдвое меньшія.

Мы нашли также уравненіе

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{-\frac{p^2-1}{8}}.$$

Это уравненіе будетъ служить намъ при опредѣленіи $\left(\frac{q}{p}\right)$, когда q равно 2, или кратное 2. На основаніи этого уравненія не трудно показать, что $\left(\frac{2}{p}\right)$ есть 1, если $p = 8n \pm 1$, и -1 , если $p = 8n \pm 3$. Въ самомъ дѣлѣ, внося въ него $8n \pm 1$ и $8n \pm 3$ на мѣсто p , находимъ

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{8n \pm 1}\right) &= (-1)^{-\frac{(8n \pm 1)^2 - 1}{8}} = (-1)^{-8n^2 \mp 2n} = 1, \\ \left(\frac{2}{8n \pm 3}\right) &= (-1)^{-\frac{(8n \pm 3)^2 - 1}{8}} = (-1)^{-8n^2 \mp 6n - 1} = -1; \end{aligned}$$

отсюда слѣдуетъ такая теорема:

32. ТЕОРЕМА.

Если p равно $8n \pm 1$, то $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$; если же $p = 8n \pm 3$, то $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$.

Такъ находимъ, что $\left(\frac{2}{17}\right) = 1$, $\left(\frac{2}{13}\right) = -1$.

На основаніи уравненія (17), мы можемъ доказать еще теорему, относящуюся до опредѣленія величины $\left(\frac{q}{p}\right)$. Она заключается въ слѣдующемъ:

33. ТЕОРЕМА.

Если a число нечетное и меньше p , то $\left(\frac{a}{p}\right)$ равно

$$(-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{p-1}{2} - E \frac{p}{a} - E \frac{2p}{a} - \dots - E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}}.$$

Доказательство. Мы нашли (17) для опредѣленія $\left(\frac{a}{p}\right)$, когда q нечетное, такое уравненіе

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{E \frac{a}{p} + E \frac{2a}{p} + \dots + E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}}.$$

Посмотримъ теперь, какія значенія имѣютъ $E \frac{a}{p}$, $E \frac{2a}{p}$, $\dots$, $E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$, гдѣ предполагаемъ a меньше p . Дробь $\frac{a}{p}$ будетъ меньше 1; слѣд. $E \frac{a}{p} = 0$. Это наименьшій изъ членовъ $E \frac{a}{p}$, $E \frac{2a}{p}$, $\dots$, $E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$. Наибольшій же $E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$ представится такъ $E \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{2p}\right)$, или $E \left(\frac{a-1}{2} + \frac{p-a}{2p}\right)$, а это очевидно равно $\frac{a-1}{2}$, ибо $\frac{a-1}{2}$ есть цѣлое число, а $\frac{p-a}{2p}$ дробь меньше единицы и положительная, потому что $a < p$.

Итакъ въ ряду

$$E \frac{a}{p}, E \frac{2a}{p}, \dots, E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$$

члены идутъ, возрастая отъ 0 до $\frac{a-1}{2}$. Чтобы опредѣлить сумму ихъ, мы найдемъ, сколько здѣсь членовъ равныхъ

0, 1, 2, ..., $\frac{a-1}{2}$. Для этого мы опредѣлимъ сначала, сколько здѣсь членовъ не превосходящихъ k , гдѣ k есть одно изъ чиселъ 0, 1, 2, ..., $\frac{a-3}{2}$. Съ этою цѣлю положимъ, что въ ряду

$$E \frac{a}{p}, E \frac{2a}{p}, \dots, E \frac{la}{p}, E \frac{(l+1)a}{p}, \dots, E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p} \quad (18)$$

последній членъ, не превосходящій k , есть $E \frac{la}{p}$; это очевидно будетъ имѣть мѣсто въ томъ случаѣ, когда $\frac{la}{p} < k+1$, а $\frac{(l+1)a}{p} > k+1$ *). Но изъ этихъ неравенствъ выйдетъ

$$\frac{p(k+1)}{a} - l > 0, \quad \frac{p(k+1)}{a} - l < 1,$$

а это показываетъ, что $\frac{p(k+1)}{a}$ съ цѣлымъ числомъ l разнится количествомъ положительнымъ, но меньшимъ 1. Слѣд. l есть наибольшее цѣлое число, заключающееся въ количествѣ $\frac{p(k+1)}{a}$;

а это по нашему знакоположенію представится такъ: $E \frac{p(k+1)}{a}$. Итакъ число членовъ въ ряду (18), не превосходящихъ k , равно $E \frac{p(k+1)}{a}$. Такимъ же образомъ находимъ, что здѣсь число членовъ,

не превосходящихъ $k-1$, есть $E \frac{pk}{a}$, а отсюда заключаемъ, что число членовъ равныхъ k есть $E \frac{p(k+1)}{a} - E \frac{pk}{a}$. На основаніи этого мы заключаемъ, что въ ряду (18) число членовъ

$$\text{равныхъ } 0 \text{ есть } \dots \dots \dots E \frac{p}{a} - E \frac{0 \cdot p}{a},$$

$$\text{равныхъ } 1 \dots \dots \dots E \frac{2p}{a} - E \frac{p}{a},$$

$$\text{равныхъ } 2 \dots \dots \dots E \frac{3p}{a} - E \frac{2p}{a},$$

.....

$$\text{равныхъ } \frac{a-1}{2} - 1 \text{ есть } \dots \dots E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a} - E \frac{\frac{1}{2}(a-3)p}{a}.$$

*) Равенство здѣсь не можетъ имѣть мѣста, потому что дроби $\frac{a}{p}, \frac{2a}{p}, \dots, \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$, гдѣ p простое само по себѣ и не дѣлитъ a , не могутъ равняться цѣлому числу; дроби же $\frac{la}{p}, \frac{(l+1)a}{p}$ взяты изъ этого ряда.

Чтоже касается до числа членовъ остальныхъ въ ряду (18), равныхъ $\frac{a-1}{2}$; то мы ихъ найдемъ, сложивъ предыдущія числа и вычтя ихъ сумму изъ $\frac{1}{2}(p-1)$, числа всѣхъ членовъ ряда (18). Такимъ образомъ найдемъ, что здѣсь членовъ равныхъ $\frac{a-1}{2}$ содержится $\frac{p-1}{2} - E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}$.

На основаніи этихъ данныхъ находимъ, что сумма всѣхъ членовъ ряда (18) составляетъ

$$\begin{aligned} & 0. \left(E \frac{p}{a} - E \frac{0 \cdot p}{a} \right) + \\ & 1. \left(E \frac{2p}{a} - E \frac{p}{a} \right) + \\ & 2. \left(E \frac{3p}{a} - E \frac{2p}{a} \right) + \\ & \dots\dots\dots \\ & \left(\frac{a-1}{2} - 1 \right) \left(E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a} - E \frac{\frac{1}{2}(a-3)p}{a} \right) + \\ & \frac{a-1}{2} \left(\frac{p-1}{2} - E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a} \right), \end{aligned}$$

а это приводится къ слѣдующему

$$\frac{a-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2} - E \frac{p}{a} - E \frac{2p}{a} - \dots - E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}.$$

Итакъ сумма

$$E \frac{a}{p} + E \frac{2a}{p} + \dots + E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}$$

равна

$$\frac{a-1}{2} \frac{p-1}{2} - E \frac{p}{a} - E \frac{2p}{a} - \dots - E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}.$$

Вслѣдствіе этого уравненіе

$$\left(\frac{a}{p} \right) = (-1)^{E \frac{a}{p} + E \frac{2a}{p} + \dots + E \frac{\frac{1}{2}(p-1)a}{p}}$$

даетъ

$$\left(\frac{a}{p} \right) = (-1)^{\frac{a-1}{2} \frac{p-1}{2} - E \frac{p}{a} - E \frac{2p}{a} - \dots - E \frac{\frac{1}{2}(a-1)p}{a}},$$

что и слѣдовало доказать.

Эта теорема также можетъ быть употреблена для опредѣленія значенія $\left(\frac{a}{p} \right)$, если a число нечетное и меньше p . Она

весьма удобна въ приложеніи, если a число небольшое.

Такъ для величины $\left(\frac{7}{101}\right)$ она даетъ

$$\left(\frac{7}{101}\right) = (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{101-1}{2}} - E^{\frac{101}{7}} - E^{\frac{2 \cdot 101}{7}} - E^{\frac{3 \cdot 101}{7}};$$

откуда выходитъ $\left(\frac{7}{101}\right) = (-1)^{3 \cdot 50 - 14 - 28 - 43} = -1$.

Но эта теорема особенно замѣчательна тѣмъ, что изъ нея очень просто выводится теорема, извѣстная подъ названіемъ *закона взаимности двухъ простыхъ чиселъ*.

Эта теорема заключается въ слѣдующемъ:

34. ТЕОРЕМА.

Если v и s суть числа простые нечетныя и неравныя между

собой; то $\left(\frac{v}{s}\right) = \left(\frac{s}{v}\right) (-1)^{\frac{v-1}{2} \cdot \frac{s-1}{2}}$.

Доказательство. Пусть будетъ v наименьшее изъ двухъ чиселъ v, s ; по доказанной нами теоремѣ при $v < s$ значеніе $\left(\frac{v}{s}\right)$ опредѣлится уравненіемъ

$$\left(\frac{v}{s}\right) = (-1)^{\frac{v-1}{2} \cdot \frac{s-1}{2}} - E^{\frac{s}{v}} - E^{\frac{2s}{v}} - \dots - E^{\frac{\frac{1}{2}(v-1)s}{v}}.$$

Дѣлая же въ уравненіи (17) $a = s$, $p = v$, найдемъ

$$\left(\frac{s}{v}\right) = (-1)^{E^{\frac{s}{v}} + E^{\frac{2s}{v}} + \dots + E^{\frac{\frac{1}{2}(v-1)s}{v}}}.$$

Эти два уравненія по перемноженіи ихъ членовъ даютъ

$$\left(\frac{v}{s}\right) \left(\frac{s}{v}\right) = (-1)^{\frac{v-1}{2} \cdot \frac{s-1}{2}}.$$

Умножая же обѣ части этого уравненія на $\left(\frac{s}{v}\right)$ и замѣчая, что $\left(\frac{s}{v}\right)^2$ есть 1, находимъ

$$\left(\frac{v}{s}\right) = \left(\frac{s}{v}\right) (-1)^{\frac{v-1}{2} \cdot \frac{s-1}{2}},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ мы будемъ имѣть

$$\begin{aligned} \left(\frac{5}{7}\right) &= \left(\frac{7}{5}\right)(-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{5-1}{2}} = \left(\frac{7}{5}\right)(-1)^{3 \cdot 2} = \left(\frac{7}{5}\right), \\ \left(\frac{11}{19}\right) &= \left(\frac{19}{11}\right)(-1)^{\frac{11-1}{2} \cdot \frac{19-1}{2}} = \left(\frac{19}{11}\right)(-1)^{5 \cdot 3} = -\left(\frac{19}{11}\right). \end{aligned}$$

§ 27. На основаніи доказанныхъ нами теоремъ относительно символа $\left(\frac{q}{p}\right)$ легко найти его величину, какъ бы q и p ни были велики. Вотъ какъ слѣдуетъ поступать при опредѣленіи $\left(\frac{q}{p}\right)$. Если q больше p , мы по теоремѣ 30 замѣняемъ въ $\left(\frac{q}{p}\right)$ число q остаткомъ отъ дѣленія q на p , или наименьшимъ отрицательнымъ вычетомъ q по модулю p , если онъ гораздо меньше этого остатка.

Такимъ образомъ опредѣленіе $\left(\frac{q}{p}\right)$ сведется на опредѣленіе $\left(\frac{\pm R}{p}\right)$, гдѣ R будетъ меньше p . Что касается до знака — при R , то по теоремѣ 29 мы $\left(\frac{-R}{p}\right)$ можемъ выразить черезъ $\left(\frac{R}{p}\right)$. Потомъ для опредѣленія $\left(\frac{R}{p}\right)$ разлагаемъ R на произведеніе простыхъ чиселъ, исключая при этомъ множителей, составляющихъ точные квадраты. Разложивши R на произведеніе простыхъ чиселъ, мы по теоремѣ 29 разлагаемъ $\left(\frac{R}{p}\right)$ на произведеніе нѣсколькихъ множителей вида $\left(\frac{r}{p}\right)$, гдѣ r число простое. Послѣ того ищемъ значеніе каждаго изъ этихъ символовъ, поступая такимъ образомъ: если $r = 2$, то $\left(\frac{r}{p}\right)$ опредѣляемъ по теоремѣ 32; если же r нечетное, то по закону взаимности чиселъ выражаемъ $\left(\frac{r}{p}\right)$ черезъ $\left(\frac{p}{r}\right)$ и съ этимъ символомъ поступаемъ также какъ съ $\left(\frac{q}{p}\right)$, сводя опредѣленіе его на символы вида $\left(\frac{r'}{r}\right)$, гдѣ $r' < r$.

Продолжая эти дѣйствія, мы будемъ получать символы все съ меньшими и меньшими числами; поэтому необходимо дойдемъ окончательно или до $\left(\frac{1}{r_n}\right)$ или до $\left(\frac{2}{r_n}\right)$, которыхъ величину легко найдемъ, а чрезъ нихъ опредѣлится и искомый $\left(\frac{q}{p}\right)$.

Объяснимъ это примѣрами. Пусть будетъ дано найти значеніе $\left(\frac{1013}{601}\right)$.

Для 1013 на 601 находимъ въ остаткѣ 412; откуда слѣдуетъ, что

$$\left(\frac{1013}{601}\right) = \left(\frac{412}{601}\right).$$

По исключеніи изъ 412 квадрата 2, мы находимъ число простое 103 и $\left(\frac{412}{601}\right)$ приводится къ $\left(\frac{103}{601}\right)$; по закону же взаимности чиселъ выводимъ

$$\left(\frac{103}{601}\right) = \left(\frac{601}{103}\right) (-1)^{\frac{601-1}{2} \cdot \frac{103-1}{2}} = \left(\frac{601}{103}\right).$$

Потомъ дѣлимъ 601 на 103 и замѣчая, что остатокъ будетъ 86, между тѣмъ какъ наименьшій отрицательный вычетъ 601 по модулю 103 есть -17 , находимъ выгоднѣе его ввести. Это даетъ намъ

$$\left(\frac{601}{103}\right) = \left(\frac{-17}{103}\right).$$

Но $\left(\frac{-17}{103}\right) = \left(\frac{-1}{103}\right) \left(\frac{17}{103}\right)$, гдѣ $\left(\frac{-1}{103}\right) = (-1)^{\frac{103-1}{2}} = -1$.
Слѣд.

$$\left(\frac{-17}{103}\right) = -\left(\frac{17}{103}\right).$$

Такъ какъ 17 число простое, то выводимъ

$$\left(\frac{17}{103}\right) = \left(\frac{103}{17}\right) (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{103-1}{2}} = \left(\frac{103}{17}\right).$$

Замѣняя въ $\left(\frac{103}{17}\right)$ число 103 остаткомъ отъ дѣленія 103 на 17, имѣемъ

$$\left(\frac{103}{17}\right) = \left(\frac{1}{17}\right) = 1.$$

Соединяя всѣ эти уравненія, находимъ

$$\left(\frac{1013}{601}\right) = \left(\frac{412}{601}\right) = \left(\frac{601}{103}\right) = \left(\frac{-17}{103}\right) = -\left(\frac{17}{103}\right) = -\left(\frac{103}{17}\right) = -\left(\frac{1}{17}\right) = -1.$$

Итакъ искомая величина $\left(\frac{1013}{601}\right)$ есть -1 .

Для другаго примѣра беремъ $\left(\frac{20470}{1847}\right)$.

Повторяя надъ символомъ $\left(\frac{20470}{1847}\right)$ тѣ же дѣйствія, находимъ

$$\begin{aligned}\left(\frac{20470}{1847}\right) &= \left(\frac{153}{1847}\right) = \left(\frac{3^2 \cdot 17}{1847}\right) = \left(\frac{17}{1847}\right), \\ \left(\frac{17}{1847}\right) &= \left(\frac{1847}{17}\right) (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{1847-1}{2}} = \left(\frac{1847}{17}\right) = \left(\frac{11}{17}\right), \\ \left(\frac{11}{17}\right) &= \left(\frac{17}{11}\right) (-1)^{\frac{17-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}} = \left(\frac{17}{11}\right) = \left(\frac{6}{11}\right), \\ \left(\frac{6}{11}\right) &= \left(\frac{2}{11}\right) \left(\frac{3}{11}\right); \left(\frac{2}{11}\right) = -1, \\ \left(\frac{3}{11}\right) &= \left(\frac{11}{3}\right) (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{11-1}{2}} = -\left(\frac{11}{3}\right) = -\left(\frac{-1}{3}\right) = 1.\end{aligned}$$

Изъ соединенія этихъ уравненій получаемъ

$$\left(\frac{20470}{1847}\right) = -1.$$

Также опредѣляя величину символа $\left(\frac{2108}{2003}\right)$, находимъ

$$\begin{aligned}\left(\frac{2108}{2003}\right) &= \left(\frac{105}{2003}\right) = \left(\frac{3}{2003}\right) \left(\frac{5}{2003}\right) \left(\frac{7}{2003}\right), \\ \left(\frac{3}{2003}\right) &= \left(\frac{2003}{3}\right) (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{2003-1}{2}} = -\left(\frac{2003}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1, \\ \left(\frac{5}{2003}\right) &= \left(\frac{2003}{5}\right) (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{2003-1}{2}} = \left(\frac{2003}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right), \\ \left(\frac{3}{5}\right) &= \left(\frac{5}{3}\right) (-1)^{\frac{5-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} = \left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1, \\ \left(\frac{7}{2003}\right) &= \left(\frac{2003}{7}\right) (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{2003-1}{2}} = -\left(\frac{2003}{7}\right) = -\left(\frac{1}{7}\right) = -1;\end{aligned}$$

откуда выходитъ

$$\left(\frac{2108}{2003}\right) = 1.$$

§ 28. Мы показали, какъ по даннымъ числамъ p и q найти величину символа $\left(\frac{q}{p}\right)$, чѣмъ опредѣляется имѣть ли сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ рѣшенія или нѣтъ. Теперь переходимъ къ рѣшенію обратнаго вопроса: по данной величинѣ $\left(\frac{x}{p}\right)$ найти значенія x , иначе, рѣшить уравненія $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$.

Начнемъ съ перваго $\left(\frac{x}{p}\right)=1$. Мы видѣли, что уравненіе $\left(\frac{x}{p}\right)=1$ символически выражаетъ, что сравненіе $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетворяется. Не трудно узнать, что это сравненіе имѣтъ $\frac{p-1}{2}$ рѣшеній; для этого по сказанному въ § 21 дѣлимъ $x^p - x$ на $x^{\frac{p-1}{2}} - 1$ и замѣчая, что $x^p - x$, какъ равное $x(x^{\frac{p-1}{2}} + 1)(x^{\frac{p-1}{2}} - 1)$, дѣлится на $x^{\frac{p-1}{2}} - 1$ безъ остатка, по теоремѣ 26-ой заключаемъ, что сравненіе $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ имѣтъ $\frac{p-1}{2}$ рѣшеній. Но эти рѣшенія (§ 12) должны представиться такъ

$$x \equiv a_1, \quad x \equiv a_2, \dots, \dots, \quad x \equiv a_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

гдѣ $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{p-1}{2}}$ суть числа въ ряду $0, 1, 2, \dots, p-1$, удовлетворяющія сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. При томъ ясно, что ни одно изъ этихъ чиселъ не будетъ равно нулю, ибо нуль не удовлетворяетъ сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Итакъ въ ряду $1, 2, \dots, p-1$ находится $\frac{p-1}{2}$ чиселъ, удовлетворяющихъ сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, или уравненію $\left(\frac{x}{p}\right)=1$, другими словами, въ ряду $1, 2, \dots, p-1$ находится $\frac{p-1}{2}$ квадратичныхъ вычетовъ по модулю p . За тѣмъ всѣ остальные числа въ ряду $1, 2, \dots, p-1$, ихъ будетъ также $\frac{p-1}{2}$, удовлетворятъ уравненію $\left(\frac{x}{p}\right)=-1$: это будутъ неквадратичные вычеты по модулю p .

Изъ сказаннаго нами слѣдуетъ, что всѣ числа, удовлетворяющія сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, или, что одно и то же, уравненію $\left(\frac{x}{p}\right)=1$, опредѣляются сравненіями

$$x \equiv a_1, \quad x \equiv a_2, \dots, \dots, \quad x \equiv a_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p},$$

гдѣ $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{p-1}{2}}$ числа положительныя, меньшія p и удов-

летворяющія сравненію $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Эти числа мы могли

бы найти, рѣшая сравненіе $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Но это чрезвычайно затруднительно, если число p велико; потому мы предложимъ способъ ихъ находить независимо отъ рѣшенія срав-

ненія $x^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Для этого мы замѣчаемъ, что сравне-

ніе $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ есть условіе возможности удовлетворить сравненію $z^2 \equiv a \pmod{p}$. Притомъ мы видѣли, что это срав-

неніе въ случаѣ возможности удовлетворяется двумя числами (§ 22), заключающимися въ ряду $1, 2, \dots, p-1$; такъ что если одно изъ этихъ чиселъ есть α , то другое $p-\alpha$. Но одно изъ этихъ чиселъ необходимо меньше $\frac{p}{2}$ и слѣд. не болѣе $\frac{p-1}{2}$; ибо

сумма ихъ есть p , а они не равны между собою. Поэтому для

числа a , при которомъ сравненіе $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетво-

ряется, всегда найдется въ ряду $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ число z , удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv a \pmod{p}$, другими словами, для такого числа a будетъ имѣть мѣсто одно изъ сравненій

$$1^2 \equiv a, 2^2 \equiv a, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \equiv a \pmod{p}.$$

Слѣд. число a по модулю p будетъ сравнимо съ однимъ изъ чиселъ

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2,$$

и такъ какъ оно меньше p ; то оно найдется между остатками отъ дѣленія этихъ чиселъ на p .

Итакъ каждое изъ чиселъ $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{p-1}{2}}$, меньшихъ p и

удовлетворяющихъ сравненію $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, мы найдемъ въ

ряду остатковъ, получаемыхъ при дѣленіи $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ на

p . Послѣ сего значенія x , удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$,

мы опредѣлимъ сравненіями

$$x \equiv a_1, x \equiv a_2, \dots x \equiv a_{\frac{p-1}{2}} \pmod{p};$$

откуда для выраженія x , удовлетворяющаго уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, по § 11 найдемъ *)

$$x = np + a_1, x = np + a_2, \dots x = np + a_{\frac{p-1}{2}}.$$

Для примѣра рѣшимъ уравненіе $\left(\frac{x}{11}\right) = 1$. По сказанному нами это уравненіе будетъ имѣть $\frac{11-1}{2} = 5$ рѣшеній, которыя опредѣлятся сравненіями

$$x \equiv a_1, x \equiv a_2, x \equiv a_3, x \equiv a_4, x \equiv a_5 \pmod{11},$$

гдѣ a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 суть остатки отъ дѣленія $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2$ на 11. Но такъ какъ эти остатки суть 1, 4, 9, 5, 3; то уравненію

$$\left(\frac{x}{11}\right) = 1$$

будутъ удовлетворять числа, опредѣляемые сравненіями

$$x \equiv 1, x \equiv 3, x \equiv 4, x \equiv 5, x \equiv 9 \pmod{11},$$

или, что одно и тоже, уравненіями

$$x = 11n + 1, x = 11n + 3, x = 11n + 4, x = 11n + 5, x = 11n + 9.$$

Зная рѣшенія уравненія $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, нетрудно найти рѣшенія уравненія $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$. Для этого мы замѣчаемъ во первыхъ, что по значенію символа $\left(\frac{x}{p}\right)$ число x предполагается не дѣлящимся на p и во вторыхъ, что числа, не удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, удовлетворяютъ уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$. Отсюда слѣдуетъ, что мы найдемъ всѣ числа, для которыхъ $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$, если выкинемъ изъ чиселъ, не дѣлящихся на p , числа удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$. Но всѣ числа могутъ быть представлены формулами

$$np, np + 1, np + 2, \dots np + p - 1.$$

Откинувъ здѣсь первую формулу, которая даетъ числа кратныя

*) Это получаемъ мы, замѣняя въ формулахъ § 11 число N числомъ $-n$.

p , мы находимъ для рѣшенія уравненій $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$ и $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$ такія формулы

$$np + 1, np + 2, \dots np + p - 1.$$

Отброся же здѣсь числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$, которыя опредѣляются формулами

$$np + a_1, np + a_2, \dots np + a_{\frac{p-1}{2}},$$

мы найдемъ всѣ числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$. Изъ этого слѣдуетъ, что числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{p}\right) = -1$, представляются формулами

$$np + b_1, np + b_2, \dots np + b_{\frac{p-1}{2}},$$

гдѣ $b_1, b_2, \dots b_{\frac{p-1}{2}}$ суть числа ряда $1, 2, \dots p - 1$, отличныя отъ $a_1, a_2, \dots a_{\frac{p-1}{2}}$, остатковъ, получаемыхъ при дѣленіи $1^2, 2^2, \dots \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ на p .

Для примѣра найдемъ рѣшенія уравненія $\left(\frac{x}{11}\right) = -1$. По сказанному нами числа, удовлетворяющія этому уравненію, представляются формулами

$$11n + b_1, 11n + b_2, 11n + b_3, 11n + b_4, 11n + b_5,$$

гдѣ b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 найдемъ, выкинувъ изъ ряда $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ числа равныя остаткамъ, получаемымъ при дѣленіи $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2$ на 11. Но эти остатки суть $1, 4, 9, 5, 3$. Выкинувъ ихъ изъ ряда $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$, находимъ $2, 6, 7, 8, 10$ для величинъ b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 . Откуда заключаемъ, что числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{x}{11}\right) = -1$, опредѣляются формулами

$$11n + 2, 11n + 6, 11n + 7, 11n + 8, 11n + 10.$$

Такъ рѣшается вопросъ объ опредѣленіи значеній x по данной величинѣ $\left(\frac{x}{p}\right)$, или, что одно и то же, объ опредѣленіи квадратичныхъ и неквадратичныхъ вычетовъ даннаго числа.

§ 29. Въ предыдущихъ параграфахъ мы занимались изслѣдованіемъ, когда сравненіе $x^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ рѣшенія и когда

нѣтъ. Теперь остается показать, какъ найдутся рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$, когда оно возможно. Говоря о сравненіяхъ вида $a^x \equiv A \pmod{p}$, мы покажемъ общій и весьма простой способъ рѣшать сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$. Здѣсь же ограничимся однимъ частнымъ случаемъ, въ которомъ это рѣшеніе можно легко найти. Случай, которымъ мы теперь ограничимся, есть тотъ, когда p вида $4n+3$.

Возможность рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$, какъ видѣли, предполагаетъ, что $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$. Дѣлая здѣсь $p = 4n+3$, находимъ $q^{\frac{4n+3-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, или $q^{2n+1} \equiv 1 \pmod{p}$, что по умноженіи на q будетъ $q^{2n+2} \equiv q \pmod{p}$. Сличая это сравненіе съ $z^2 \equiv q \pmod{p}$, замѣчаемъ, что послѣднему удовлетворяетъ $z = q^{n+1}$. Зная одно число, удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv q \pmod{p}$, мы найдемъ подобныхъ чиселъ безконечное множество изъ сравненія $z \equiv q^{n+1} \pmod{p}$. Но мы видѣли, что одно изъ этихъ чиселъ будетъ положительное и меньше p ; это остатокъ отъ дѣленія q^{n+1} на p . Называя его черезъ α , мы одно изъ рѣшеній сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$ представимъ такъ: $z \equiv \alpha \pmod{p}$. Что касается до другого рѣшенія этого сравненія, то по сказанному въ § 23 оно будетъ $z \equiv p - \alpha \pmod{p}$. Такъ найдутся оба рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{p}$ при $p = 4n+3$.

Для примѣра найдемъ рѣшенія сравненія $z^2 \equiv 3 \pmod{11}$. Оно имѣетъ рѣшенія, ибо

$$\left(\frac{3}{11}\right) = \left(\frac{11}{3}\right)(-1)^{\frac{11-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} = -\left(\frac{11}{3}\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = 1;$$

а такъ какъ $11 = 4 \cdot 2 + 3$; то рѣшенія его суть $z \equiv \alpha$, $z \equiv 11 - \alpha \pmod{11}$, гдѣ α есть остатокъ отъ дѣленія 3^{2+1} на 11. Но этотъ остатокъ есть 5; слѣд. $\alpha = 5$ и рѣшенія сравненія $z^2 \equiv 3 \pmod{11}$ суть $z \equiv 5$, $z \equiv 6 \pmod{11}$.

§ 30. До сихъ поръ мы занимались сравненіями второй степени, предполагая модуль ихъ числомъ простымъ. Что же касается до сравненій съ модулемъ составнымъ, то мы ограни-

чимся только доказательствомъ, что сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{p}$ имѣетъ рѣшеніе, если p число нечетное, простое съ q и въ составъ его входятъ простые числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, для которыхъ

$$\left(\frac{q}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{q}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{q}{\gamma}\right) = 1, \dots$$

Начнемъ съ частнаго случая $p = \alpha^m$ и покажемъ, какъ найдутся рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}$, когда знаемъ рѣшенія сравненія $z^2 \equiv q \pmod{\alpha}$, котораго возможность, какъ видѣли, условливается равенствомъ $\left(\frac{q}{\alpha}\right) = 1$.

Предположимъ, что a есть число удовлетворяющее сравненію $z^2 \equiv q \pmod{\alpha}$, и P, Q суть числа, опредѣляемые уравненіями

$$P = \frac{(a + \sqrt{q})^m + (a - \sqrt{q})^m}{2},$$

$$Q = \frac{(a + \sqrt{q})^m - (a - \sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}};$$

числа P, Q будутъ цѣлыя; въ этомъ легко убѣдиться разложениемъ $(a + \sqrt{q})^m, (a - \sqrt{q})^m$ по биному Ньютона. Докажемъ теперь во 1) что P и Q удовлетворяютъ сравненію $P^2 - Q^2 q \equiv 0 \pmod{\alpha^m}$ и во 2) что Q число простое съ α .

Въ первомъ мы легко убѣждаемся, замѣтивъ изъ предыдущихъ уравненій, что

$$P + Q\sqrt{q} = (a + \sqrt{q})^m, \quad P - Q\sqrt{q} = (a - \sqrt{q})^m.$$

Перемножая же эти уравненія между собою, находимъ

$$P^2 - Q^2 q = (a^2 - q)^m.$$

Но по положенію a удовлетворяетъ сравненію $z^2 \equiv q \pmod{\alpha}$, слѣдов. $a^2 \equiv q \pmod{\alpha}$, что предполагаетъ дѣлимость $a^2 - q$ на α . Если же $a^2 - q$ имѣетъ дѣлителемъ α ; то $P^2 - Q^2 q$, равное $(a^2 - q)^m$, должно дѣлиться на α^m , а потому

$$P^2 - Q^2 q \equiv 0 \pmod{\alpha^m}.$$

Доказавши первое, переходимъ ко второму, къ доказательству, что Q число простое съ α . Для этого мы замѣчаемъ, что по-уравненію

$$Q = \frac{(a + \sqrt{q})^m - (a - \sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}},$$

дѣлимость Q на α предполагаетъ сравненіе

$$\frac{(a+\sqrt{q})^m - (a-\sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}} \equiv 0 \pmod{\alpha}.$$

Но это сравненіе, какъ не трудно убѣдиться разложеніемъ степеней $(a+\sqrt{q})^m$, $(a-\sqrt{q})^m$, содержать q въ цѣлыхъ степеняхъ и съ цѣлыми коэффициентами; по этому оно останется справедливымъ (§ 10), если въ немъ q замѣнимъ числомъ a^2 , сравнимымъ съ q по модулю α . Слѣд. предыдущее сравненіе предполагаетъ

$$\frac{(a+\sqrt{a^2})^m - (a-\sqrt{a^2})^m}{2\sqrt{a^2}} \equiv 0 \pmod{\alpha},$$

а это приводится къ

$$2^{m-1} a^{m-1} \equiv 0 \pmod{\alpha},$$

сравненію невозможному; ибо α число простое нечетное и a простое съ α .

Убѣдясь такимъ образомъ, что P и Q удовлетворяютъ сравненію

$$P^2 - Q^2 q \equiv 0 \pmod{\alpha^m}$$

и Q число простое съ α , не трудно доказать, что сравненіе $Qx \equiv P \pmod{\alpha^m}$ имѣетъ рѣшеніе и это рѣшеніе удовлетворяетъ сравненію $x^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}$. Первое слѣдуетъ изъ того, что Q , будучи числомъ простымъ съ α , будетъ простымъ также съ α^m ; въ этомъ же случаѣ сравненіе $Qx \equiv P \pmod{\alpha^m}$ имѣетъ всегда одно рѣшеніе. Намъ остается теперь показать, что числа x , опредѣляемыя сравненіемъ $Qx \equiv P \pmod{\alpha^m}$, удовлетворяютъ сравненію $x^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}$. Для этого мы, возведя обѣ части сравненія $Qx \equiv P \pmod{\alpha^m}$ въ квадратъ, выводимъ

$$Q^2 x^2 \equiv P^2 \pmod{\alpha^m}.$$

Но по доказанному нами относительно чиселъ P и Q имѣемъ

$$P^2 - Q^2 q \equiv 0 \pmod{\alpha^m}.$$

Это же сравненіе вмѣстѣ съ предыдущимъ даетъ

$$Q^2 x^2 \equiv Q^2 q \pmod{\alpha^m},$$

а такъ какъ Q число простое съ α и слѣд. съ α^m ; то въ этомъ сравненіи обѣ части могутъ быть сокращены на Q^2 ; вслѣдствіе

чего оно приводится къ

$$x^2 \equiv q \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Итакъ мы получимъ рѣшеніе сравненія $z^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}$ изъ сравненія

$$Qz \equiv P \pmod{\alpha^m},$$

гдѣ P и Q найдутся изъ уравненій

$$P = \frac{(a + \sqrt{q})^m + (a - \sqrt{q})^m}{2}, \quad Q = \frac{(a + \sqrt{q})^m - (a - \sqrt{q})^m}{2\sqrt{q}}$$

по a , числу удовлетворяющему сравненію

$$a^2 \equiv q \pmod{\alpha}.$$

Для примѣра возьмемъ сравненіе $z^2 \equiv -2 \pmod{3^3}$. По сказанному нами число, удовлетворяющее ему, найдется изъ сравненія

$$Qz \equiv P \pmod{3^3},$$

гдѣ

$$P = \frac{(a + \sqrt{-2})^3 + (a - \sqrt{-2})^3}{2}, \quad Q = \frac{(a + \sqrt{-2})^3 - (a - \sqrt{-2})^3}{2\sqrt{-2}}$$

и a есть число, удовлетворяющее сравненію $a^2 \equiv -2 \pmod{3}$.

Послѣднее сравненіе относится къ числу тѣхъ, которыя рѣшаются по способу показанному въ § 29; рѣшая его по этому способу, мы находимъ, что ему удовлетворяетъ 1. Дѣлая $a = 1$ въ уравненіяхъ, опредѣляющихъ P и Q , имѣемъ

$$P = \frac{(1 + \sqrt{-2})^3 + (1 - \sqrt{-2})^3}{2} = -5,$$

$$Q = \frac{(1 + \sqrt{-2})^3 - (1 - \sqrt{-2})^3}{2\sqrt{-2}} = 1.$$

Отсюда для опредѣленія z , числа удовлетворяющаго сравненію $z^2 \equiv -2 \pmod{3^3}$, выходитъ

$$z \equiv -5 \pmod{3^3}.$$

Показавши какимъ образомъ рѣшается сравненіе $z^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}$, гдѣ α какое нибудь простое нечетное число, переходимъ къ рѣшенію сравненія $z^2 \equiv q \pmod{\alpha^m \beta^n \gamma^r \dots}$.

Если $\left(\frac{q}{\alpha}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{\beta}\right) = 1$, $\left(\frac{q}{\gamma}\right) = 1, \dots$; то по сказанному

нами найдутся числа $u, v, w, \dots$, удовлетворяющія сравненіямъ

$$u^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}, \quad v^2 \equiv q \pmod{\beta^n}, \quad w^2 \equiv q \pmod{\gamma^r}, \dots$$

Эти числа опредѣляются такими сравненіями

$$u \equiv A \pmod{\alpha^m}, \quad v \equiv B \pmod{\beta^n}, \quad w \equiv C \pmod{\gamma^r}, \dots$$

Но не трудно убѣдиться, что между числами, опредѣляемыми каждымъ изъ этихъ сравненій, найдется число

$$A(\beta^n \gamma^r \dots)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)} + B(\alpha^m \gamma^r \dots)^{\beta^{n-1}(\beta-1)} + C(\alpha^m \beta^n \dots)^{\gamma^{r-1}(\gamma-1)} + \dots$$

Въ самомъ дѣлѣ, это число по модулю α^m сравнимо съ $A(\beta^n \gamma^r \dots)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)}$, гдѣ $(\beta^n \gamma^r \dots)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)}$, по теоремѣ 17 сравнимо съ 1 по тому же модулю α^m , и слѣд.

$A(\beta^n \gamma^r \dots)^{\alpha^{m-1}(\alpha-1)}$ сравнимо съ A . Также докажется, что это число сравнимо съ B по модулю β^n , съ C по модулю γ^r , и т. д...

А потому это число будетъ удовлетворять каждому изъ сравненій

$$u^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}, \quad v^2 \equiv q \pmod{\beta^n}, \quad w^2 \equiv q \pmod{\gamma^r}, \dots$$

и слѣд., называя его черезъ x , будемъ имѣть

$$x^2 \equiv q \pmod{\alpha^m}, \quad x^2 \equiv q \pmod{\beta^n}, \quad x^2 \equiv q \pmod{\gamma^r}, \dots$$

Но такъ какъ въ этихъ сравненіяхъ модули $\alpha^m, \beta^n, \gamma^r, \dots$ числа относительно другъ друга простые; ибо $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ суть различныя простые числа; то по § 9 эти сравненія предполагаютъ

$$x^2 \equiv q \pmod{\alpha^m \beta^n \gamma^r \dots}.$$

Такъ опредѣлится x , удовлетворяющій сравненію

$$x^2 \equiv q \pmod{p},$$

гдѣ q число простое съ p , а p число нечетное, состоящее изъ произведенія простыхъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, для которыхъ

$$\left(\frac{q}{\alpha}\right) = 1, \quad \left(\frac{q}{\beta}\right) = 1, \quad \left(\frac{q}{\gamma}\right) = 1, \dots$$

Этимъ мы оканчиваемъ теорію сравненій второй степени.

ГЛАВА V.

О сравненіяхъ двучленныхъ.

§ 31. Подъ именемъ сравненій двучленныхъ разумѣютъ сравненія такого вида

$$x^n - A \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ n , A , p какія нибудь числа. Мы начнемъ съ простѣйшаго случая: $A = 1$, p число простое. Мы будемъ предполагать p отличнымъ отъ 2; ибо по § 20 при $p = 2$ сравненіе $x^n - A \equiv 0 \pmod{p}$ приводится къ 1-й степени.

Относительно сравненій вида $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ мы докажемъ слѣдующую теорему.

35. ТЕОРЕМА.

Если одно и тоже число удовлетворяетъ сравненіямъ $x^m - 1 \equiv 0$, $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то оно удовлетворяетъ также сравненію $x^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ ω общій наиболѣйшій дѣлитель чиселъ m и n .

Доказательство. Пусть будетъ a то число, которое удовлетворяетъ и сравненію $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ и сравненію $x^n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$; мы будемъ имѣть

$$a^m \equiv 1, a^n \equiv 1 \pmod{p},$$

и a будетъ число простое съ p , ибо иначе было бы $a^m \equiv 0 \pmod{p}$.

По положенію ω , будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ чиселъ m и n , въ частныхъ $\frac{m}{\omega}$, $\frac{n}{\omega}$ дасть числа простыя между собою. Но при $\frac{m}{\omega}$, $\frac{n}{\omega}$ простыхъ между собою найдется z , удовлетворяющее сравненію $\frac{m}{\omega} z - 1 \equiv 0 \pmod{\frac{n}{\omega}}$, что предполагаетъ дѣлимость $\frac{m}{\omega} z - 1$ на $\frac{n}{\omega}$. Означая частное отъ этого дѣленія чрезъ y , найдемъ

$$\frac{m}{\omega} z - 1 = \frac{n}{\omega} y;$$

откуда выходитъ

$$mz - ny = \omega \quad (19)$$

Но изъ сравненій

$$a^m \equiv 1, a^n \equiv 1 \pmod{p},$$

возводя первое въ степень z , второе въ степень y , выводимъ

$$a^{mz} \equiv a^{ny} \pmod{p},$$

что по сокращеніи на a^{ny} (число простое съ p ; ибо, видѣли, a простое съ p) даетъ

$$a^{mz-ny} \equiv 1 \pmod{p},$$

гдѣ замѣняя $mz-ny$ черезъ ω по (19), имѣемъ

$$a^\omega \equiv 1 \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы не трудно доказать слѣдующую:

36. ТЕОРЕМА.

Сравненіе $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ ω рѣшеній, если ω есть общій наибольшій дѣлитель чиселъ m и $p - 1$, и эти рѣшенія найдутся изъ сравненія $x^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

Доказательство. Сравненію $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ могутъ удовлетворять только числа, не дѣлящіеся на p ; ибо для x кратнаго p будетъ $x^m \equiv 0 \pmod{p}$. Но по теоремѣ Фермата для x не дѣлящагося на p будетъ

$$x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Итакъ всѣ числа, удовлетворяющія сравненію $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, будутъ также удовлетворять сравненію $x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$; откуда слѣдуетъ по доказанной нами теоремѣ, что эти числа будутъ удовлетворять сравненію

$$x^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ $p - 1$ и m .

Также не трудно убѣдиться въ обратномъ, что всѣ числа, удовлетворяющія этому сравненію, будутъ удовлетворять и сравненію $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

Въ самомъ дѣлѣ, изъ сравненія $x^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ выходитъ $x^\omega \equiv 1 \pmod{p}$, а это по возведеніи въ степень

$\frac{m}{\omega}$ (число $\frac{m}{\omega}$ есть цѣлое; ибо ω есть дѣлитель m), даетъ $x^m \equiv 1$ (мод. p), или $x^m - 1 \equiv 0$ (мод. p).

Итакъ сравненіямъ $x^m - 1 \equiv 0$, $x^\omega - 1 \equiv 0$ (мод. p) будутъ удовлетворять одни и тѣ же числа. Намъ остается теперь показать, что эти сравненія имѣютъ ω рѣшеній; это легко сдѣлать надъ сравненіемъ $x^\omega - 1 \equiv 0$ (мод. p). Такъ какъ ω есть дѣлитель $p - 1$; то $\frac{p-1}{\omega}$ есть число цѣлое; называя его черезъ n , найдемъ $p - 1 = \omega n$. Вслѣдствіе чего $x^p - x$ представится такъ $x(x^{\omega n} - 1)$, или $x[(x^\omega)^n - 1^n]$, а это дѣлится на $x^\omega - 1$; ибо разность степеней дѣлится на разность корней. Но если $x^p - x$ дѣлится на $x^\omega - 1$ безъ остатка; то по 26-ой теоремѣ сравненіе $x^\omega - 1 \equiv 0$ (мод. p) имѣетъ ω рѣшеній. А такъ какъ это сравненіе удовлетворяется одними числами съ $x^m - 1 \equiv 0$ (мод. p), то и это сравненіе имѣетъ ω рѣшеній; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Такъ сравненіе $x^{10} - 1 \equiv 0$ (мод. 17), гдѣ общій наибольшій дѣлитель чиселъ 10 и 17—1 есть 2, будетъ имѣть только два рѣшенія, которыя найдутся изъ сравненія $x^2 \equiv 1$ (мод. 17). Замѣчая, что этому сравненію удовлетворяетъ 1 и 17—1=16, вслѣдствіе чего рѣшенія его суть

$$x \equiv 1, \quad \bar{x} \equiv 16 \text{ (мод. 17).}$$

мы заключаемъ, что рѣшенія сравненія $x^{10} - 1 \equiv 0$ (мод. 17) суть

$$x \equiv 1, \quad x \equiv 16 \text{ (мод. 17).}$$

На основаніи этой теоремы рѣшеніе сравненія $x^m - 1 \equiv 0$ (мод. p) сводится на рѣшеніе сравненія $x^\omega - 1 \equiv 0$ (мод. p), гдѣ ω дѣлитъ $p - 1$; этимъ-то сравненіемъ мы теперь и займемся. Относительно его мы докажемъ слѣдующую теорему:

37. ТЕОРЕМА.

Сравненію $x^\omega - 1 \equiv 0$ (мод. p), гдѣ ω дѣлитъ $p - 1$, удовлетворяетъ число $\alpha = n^{\frac{p-1}{\omega}}$, если n простое съ p .

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, полагая $\alpha = n^{\frac{p-1}{w}}$, нах-
димъ

$$\alpha^w - 1 = n^{p-1} - 1.$$

Но по теоремѣ Фермата при n простомъ съ p будетъ

$$n^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

слѣдовательно также

$$\alpha^w - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ $2^{\frac{11-1}{5}}$, $3^{\frac{11-1}{5}}$, $4^{\frac{11-1}{5}}$, будутъ удовлетворять
сравненію $x^5 - 1 \equiv 0 \pmod{11}$.

Такимъ образомъ мы можемъ найти нѣсколько рѣшеній срав-
ненія $x^w - 1 \equiv 0 \pmod{p}$. Что же касается до опредѣленія всѣхъ
его рѣшеній, то относительно ихъ докажется слѣдующая теорема:

38. ТЕОРЕМА.

*Если число θ удовлетворяетъ сравненію $x^w - 1 \equiv 0 \pmod{p}$
и не удовлетворяетъ сравненіямъ $x^\alpha - 1 \equiv 0$, $x^\beta - 1 \equiv 0$,
 $x^\zeta - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ $\alpha, \beta, \dots, \zeta$ суть дѣлители w (включая
сюда и 1); то всѣ w рѣшеній сравненія $x^w - 1 \equiv 0 \pmod{p}$
опредѣлятся такъ*

$$x \equiv \theta, x \equiv \theta^2, \dots, x \equiv \theta^w \pmod{p}.$$

Доказательство. Не трудно убѣдиться, что если θ удовле-
творяетъ сравненію $x^w - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то ему удовлетворяетъ
и θ^n , какое бы ни было число n . Въ самомъ дѣлѣ, если θ удов-
летворяетъ сравненію $x^w - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то $\theta^w - 1 \equiv 0 \pmod{p}$,
или $\theta^w \equiv 1 \pmod{p}$. Но возведя обѣ части этого сравненія въ
степень n , находимъ $\theta^{nw} \equiv 1 \pmod{p}$, или $\theta^{nw} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$;
а это показываетъ, что θ^n удовлетворяетъ сравненію $x^w - 1 \equiv 0$
 $\pmod{p}$. На основаніи этого, мы заключаемъ, что

$$\theta, \theta^2, \dots, \theta^w$$

будутъ удовлетворять сравненію

$$x^w - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

и слѣд. будутъ удовлетворять ему всѣ числа, опредѣляемыя сравненіями

$$x \equiv \theta, x \equiv \theta^2, \dots x \equiv \theta^\omega \pmod{p} \quad (20).$$

Докажемъ же теперь, что въ этомъ ряду сравненій нѣтъ двухъ сравненій тождественныхъ между собою. Для этого допустимъ противное, допустимъ, что здѣсь какія нибудь два сравненія

$$x \equiv \theta^m, x \equiv \theta^n \pmod{p}$$

тождественны между собою; числа m и n , какъ показатели θ въ сравненіяхъ (20), будутъ болѣе 0 и не болѣе ω и пусть m будетъ болѣе n .

Допустивши, что сравненія

$$x \equiv \theta^m, x \equiv \theta^n \pmod{p}$$

удовлетворяются однимъ и тѣмъ же числомъ x , мы находимъ

$$\theta^m \equiv \theta^n \pmod{p},$$

что по сокращеніи на θ^n даетъ

$$\theta^{m-n} - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Это сравненіе вмѣстѣ съ сравненіемъ $\theta^\omega \equiv 1 \pmod{p}$, которому θ удовлетворяетъ по положенію, предполагаетъ

$$\theta^{\omega'} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ ω' общій наибольшій дѣлитель $m - n$ и ω (смотри теорему 35). Но ω' не можетъ быть равнымъ ω ; ибо ω' есть дѣлитель $m - n$, гдѣ m и n болѣе 0 и не болѣе ω , а потому $m - n < \omega$. Но если число ω' меньше ω , то, дѣля ω , оно должно быть однимъ изъ дѣлителей его: $\alpha, \beta, \dots \zeta$; вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе должно быть однимъ изъ сравненій

$$\theta^\alpha - 1 \equiv 0, \theta^\beta - 1 \equiv 0, \dots \theta^\zeta - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Эти же сравненія, по положенію, не могутъ имѣть мѣста. Итакъ, между сравненіями

$$x \equiv \theta, x \equiv \theta^2, \dots x \equiv \theta^\omega \pmod{p}$$

не можетъ быть двухъ тождественныхъ между собою, слѣд. въ

нихъ заключаются всѣ ѡ рѣшеній сравненія

$$x^{\omega} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ, чтобы найти всѣ рѣшенія сравненія $x^6 - 1 \equiv 0 \pmod{13}$, мы должны найти число, которое бы удовлетворяло ему, не удовлетворяя сравненіямъ

$$x - 1 \equiv 0, \quad x^2 - 1 \equiv 0, \quad x^3 - 1 \equiv 0 \pmod{13}.$$

Замѣчая, что такое свойство принадлежитъ числу 4, мы заключаемъ, что рѣшенія сравненія

$$x^6 - 1 \equiv 0 \pmod{13}$$

суть

$$x \equiv 4, \quad x \equiv 4^2, \quad x \equiv 4^3, \quad x \equiv 4^4, \quad x \equiv 4^5, \quad x \equiv 4^6 \pmod{13},$$

или

$$x \equiv 4, \quad x \equiv 3, \quad x \equiv 12, \quad x \equiv 9, \quad x \equiv 10, \quad x \equiv 1 \pmod{13}.$$

§ 32. Переходимъ теперь къ сравненіямъ $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ A какое нибудь число, недѣлящееся на p , а p число простое, которое мы опять предполагаемъ отличнымъ отъ 2.

Относительно сравненій этого вида мы докажемъ слѣдующую теорему.

39. ТЕОРЕМА.

Сравненіе $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$ возможно только въ томъ случаѣ, когда $A^{\frac{p-1}{m}} \equiv 1 \pmod{p}$, гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ $p-1$ и m . Когда же это сравненіе возможно, оно имѣетъ ω рѣшеній, которыя найдутся изъ сравненія $x^{\omega} - A^{\pi} \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ π есть число, удовлетворяющее условию $\frac{m}{\omega} \pi \equiv 1 \pmod{\frac{p-1}{\omega}}$.

Доказательство. Мы предполагаемъ A недѣлящимся на p ; поэтому число x , удовлетворяющее сравненію $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, или $x^m \equiv A \pmod{p}$, не можетъ быть кратнымъ p ; ибо въ этомъ случаѣ было бы $x^m \equiv 0 \pmod{p}$ и сравненіе $x^m \equiv A \pmod{p}$ дало бы $A \equiv 0 \pmod{p}$. Но если x не дѣлится

на p ; то по теоремѣ Фермата будетъ

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Возводя обѣ части этого сравненія въ степень $\frac{m}{\omega}$, а члены сравненія

$$x^m \equiv A \pmod{p}$$

въ степень $\frac{p-1}{\omega}$ (числа $\frac{m}{\omega}$, $\frac{p-1}{\omega}$ будутъ цѣлыя; ибо ω есть общій дѣлитель m и $p-1$), находимъ

$$x^{\frac{(p-1)m}{\omega}} \equiv 1, \quad x^{\frac{m(p-1)}{\omega}} \equiv A^{\frac{p-1}{\omega}} \pmod{p};$$

откуда слѣдуетъ

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Итакъ для возможности сравненія

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$$

необходимо, чтобы A удовлетворяло сравненію

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p} \quad (21)$$

Предположимъ теперь, что это условіе выполняется и докажемъ, что въ такомъ случаѣ всѣ числа, удовлетворяющія сравненію

$$x^m \equiv A \pmod{p},$$

удовлетворяютъ также сравненію

$$x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p},$$

гдѣ π число, опредѣляемое сравненіемъ

$$\frac{m}{\omega} \pi \equiv 1 \pmod{\frac{p-1}{\omega}}.$$

Число ω , будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ чиселъ m и $p-1$, въ частныхъ $\frac{m}{\omega}$, $\frac{p-1}{\omega}$ даетъ числа простые между собою. Но при $\frac{m}{\omega}$, $\frac{p-1}{\omega}$ простыхъ между собою найдется число π , удовлетворяющее сравненію $\frac{m}{\omega} \pi \equiv 1 \pmod{\frac{p-1}{\omega}}$ и для такого числа π разность $\frac{m}{\omega} \pi - 1$ будетъ дѣлиться на $\frac{p-1}{\omega}$. Называя ς

частное отъ этого дѣленія, будемъ имѣть

$$\frac{m}{\omega} \pi - 1 = \zeta \frac{p-1}{\omega},$$

или

$$m\pi - \zeta(p-1) = \omega \quad (22)$$

На основаніи этого уравненія мы покажемъ, что сравненіе

$$x^m \equiv A \pmod{p}$$

предполагаетъ

$$x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, возводя обѣ части сравненія

$$x^m \equiv A \pmod{p}$$

въ степень π , находимъ

$$x^{m\pi} \equiv A^\pi \pmod{p};$$

по теоремѣ же Фермата имѣемъ

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

гдѣ возведя обѣ части въ степень ζ , получаемъ

$$x^{\zeta(p-1)} \equiv 1, \text{ или } 1 \equiv x^{\zeta(p-1)} \pmod{p}.$$

Но изъ сравненій

$$x^{m\pi} \equiv A^\pi, \quad 1 \equiv x^{\zeta(p-1)} \pmod{p},$$

перемножая ихъ почленно, выводимъ

$$x^{m\pi} \equiv A^\pi x^{\zeta(p-1)} \pmod{p},$$

что по сокращеніи на $x^{\zeta(p-1)}$ будетъ

$$x^{m\pi - \zeta(p-1)} \equiv A^\pi \pmod{p}.$$

Замѣняя же здѣсь $m\pi - \zeta(p-1)$ числомъ ω по (22), найдемъ

$$x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Изъ этого видно, что сравненіе

$$x^m \equiv A \pmod{p}$$

не можетъ имѣть рѣшеній отличныхъ отъ рѣшеній $x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p}$.

Убѣдившись въ этомъ, мы докажемъ остальную часть предложенной нами теоремы. Для этого мы докажемъ, что сравненіе

$x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p}$ имѣть ω рѣшеній и что всѣ они удовлетворяютъ сравненію $x^m \equiv A \pmod{p}$.

Чтобы увѣриться въ первомъ, мы по § 21 ищемъ остатокъ, получаемый при дѣленіи $x^p - x$ на $x^\omega - A^\pi$. Этотъ остатокъ мы легко находимъ, замѣчая, что $x^p - x$ можетъ быть такъ представлено

$$[(x^\omega)^{\frac{p-1}{\omega}} - (A^\pi)^{\frac{p-1}{\omega}}] x + (A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} - 1) x,$$

гдѣ $[(x^\omega)^{\frac{p-1}{\omega}} - (A^\pi)^{\frac{p-1}{\omega}}] x$, очевидно, дѣлится на $x^\omega - A^\pi$.

Откуда слѣдуетъ, что искомый остатокъ есть

$$[A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} - 1] x.$$

Но здѣсь коэффициентъ $A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} - 1$ дѣлится на p ; ибо по (21) имѣемъ

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p},$$

что по возведеніи въ степень π даетъ

$$A^{\frac{\pi(p-1)}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p};$$

слѣд. по теоремѣ 26 сравненіе $x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p}$ имѣетъ ω рѣшеній.

Намъ остается теперь доказать, что всѣ рѣшенія сравненія $x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p}$ удовлетворяютъ сравненію $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$. Для этого мы замѣтимъ, что сравненіе $x^\omega \equiv A^\pi \pmod{p}$ по возведеніи его частей въ степень $\frac{m}{\omega}$ даетъ

$$x^m \equiv A^{\frac{\pi m}{\omega}} \pmod{p}.$$

Вычитая же A изъ обѣихъ частей этого сравненія, найдемъ

$$x^m - A \equiv A^{\frac{\pi m}{\omega}} - A \pmod{p},$$

или

$$x^m - A \equiv A (A^{\frac{\pi m - \omega}{\omega}} - 1) \pmod{p}.$$

Внося сюда величину πm изъ (22), получаемъ

$$x^m - A \equiv A \left(A^{\frac{\varsigma(p-1)}{\omega}} - 1 \right) \pmod{p} \quad (23)$$

Но по (21) A удовлетворяетъ сравненію

$$A^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p},$$

которое по возведеніи его частей въ степень ς будетъ

$$A^{\frac{\varsigma(p-1)}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p},$$

или

$$A^{\frac{\varsigma(p-1)}{\omega}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Вслѣдствіе же этого сравненіе (23) приводится къ такому

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{p},$$

что и оставалось намъ доказать.

Для примѣра возьмемъ сравненіе

$$x^8 - 3 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Общій наибольшій дѣлитель 8 и 11—1 есть 2. Слѣд. для возможности этого сравненія необходимо быть

$$3^{\frac{11-1}{2}} \equiv 1 \pmod{11}.$$

Это условіе выполняется; ибо $3^{\frac{11-1}{2}} = 3^5 = 243$, что сравнимо съ 1 по модулю 11. Рѣшенія же этого сравненія найдутся изъ сравненія $x^2 - 3^\pi \equiv 0 \pmod{11}$, гдѣ π опредѣляется условіемъ

$$\frac{8}{2}\pi \equiv 1 \pmod{\frac{11-1}{2}},$$

или

$$4\pi \equiv 1 \pmod{5}.$$

Рѣшая это сравненіе по способу, показанному въ § 15, находимъ

$$\pi \equiv 4^{5-2} \equiv 64 \pmod{5}.$$

Откуда видимъ, что за π можно взять 4. Вслѣдствіе этого сравненіе

$$x^2 - 3^\pi \equiv 0 \pmod{11}$$

даетъ

$$x^3 - 81 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Но этому сравненію удовлетворяетъ $x=9$ и $x=11-9=2$.
Слѣ. рѣшенія сравненія

$$x^8 - 3 \equiv 0 \pmod{11}$$

суть

$$x \equiv 2, x \equiv 9 \pmod{11}.$$

Изъ доказанной нами теоремы относительно сравненій вида $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$ выводимъ слѣдующую:

40. ТЕОРЕМА.

Сравненіе $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ не имѣетъ рѣшенія, если $p-1$ по освобожденіи отъ общихъ множителей съ m приводится къ числу нечетному. Въ противномъ случаѣ это сравненіе имѣетъ ω рѣшеній, если $p-1$ и m имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ ω и эти рѣшенія найдутся изъ сравненія

$$x^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Доказательство. По теоремѣ 39 для возможности сравненія

$$x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

необходимо, чтобы удовлетворялось сравненіе

$$(-1)^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p};$$

а это не можетъ имѣть мѣста, если $\frac{p-1}{\omega}$ число нечетное; слѣд. частное отъ дѣленія $p-1$ на ω , общій наибольшій дѣлитель чиселъ m и $p-1$, должно быть числомъ четнымъ. Если-же $\frac{p-1}{\omega}$ число четное; то условіе

$$(-1)^{\frac{p-1}{\omega}} \equiv 1 \pmod{p}$$

выполняется, а въ этомъ случаѣ по доказанной нами теоремѣ сравненіе

$$x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣть ω рѣшеній и эти рѣшенія найдутся изъ сравненія

$$x^\omega - (-1)^\pi \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ π есть число, удовлетворяющее сравненію

$$\frac{m}{\omega} \pi \equiv 1 \pmod{\frac{p-1}{\omega}}.$$

Но такъ какъ въ послѣднемъ сравненіи модуль число четное, а вторая часть не дѣлится на 2; то и первая должна быть числомъ простымъ съ 2. Откуда слѣдуетъ, что π число нечетное, а потому сравненіе

$$x^\omega - (-1)^\pi \equiv 0 \pmod{p},$$

которымъ опредѣляются рѣшенія сравненія

$$x^m + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

приведется къ такому

$$x^\omega + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Такъ убѣждаемся мы въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что сравненіе

$$x^4 + 1 \equiv 0 \pmod{13}$$

не имѣетъ рѣшенія; ибо общій наибольшій дѣлитель 4 и 13—1 есть 4, а частное отъ дѣленія 13—1 на 4 есть 3, число нечетное. Напротивъ сравненіе

$$x^9 + 1 \equiv 0 \pmod{13}$$

имѣетъ три рѣшенія; ибо общій наибольшій дѣлитель 9 и 13—1 есть 3, а 3, дѣля 13—1, даетъ въ частномъ число четное 4, и рѣшенія этого сравненія найдутся изъ сравненія

$$x^3 + 1 \equiv 0 \pmod{13}.$$

§ 33. До сихъ поръ мы говорили о сравненіи $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, предполагая p числомъ простымъ. Обращаемся теперь къ тѣмъ случаямъ, когда здѣсь p число составное. Мы предположимъ p числомъ простымъ относительно m и A и докажемъ, что въ этомъ случаѣ, если можно удовлетворить сравненію $x^m - A \equiv 0$, принимая за модуль его какое либо изъ простыхъ

чиселъ, входящихъ въ составъ p , то ему можно удовлетворить и при модуль p .

Мы начнемъ съ частнаго случая, предположивъ, что $p = \alpha^m$, гдѣ α какое нибудь простое цѣлое, недѣлящее m и A , и покажемъ, какимъ образомъ изъ рѣшенія сравненія

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha}$$

могутъ быть выведены рѣшенія сравненій

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^2}, \quad x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^3}, \quad \text{и т. д.}$$

Пусть будетъ a число, удовлетворяющее сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha};$$

число a не будетъ дѣлиться на α , ибо A по положенію не дѣлится на α . Для опредѣленія числа, удовлетворяющаго сравненію $x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^2}$, положимъ $x = a + \alpha z$ и будемъ искать z подъ условіемъ $(a + \alpha z)^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^2}$, которое приводится къ слѣдующему

$$a^m - A + ma^{m-1}\alpha z + \frac{m(m-1)}{1.2}a^{m-2}\alpha^2 z^2 + \dots + \alpha^m z^m \equiv 0 \pmod{\alpha^2}.$$

Но здѣсь α есть общій множитель членовъ сравненія и модуля; ибо a , будучи числомъ удовлетворяющимъ сравненію $x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha}$, въ разности $a^m - A$ даетъ число кратное α ; во всѣхъ же прочихъ членахъ сравненія и въ модуль число α входитъ множителемъ. Сокращая его, находимъ

$$\frac{a^m - A}{\alpha} + ma^{m-1}z + \frac{m(m-1)}{1.2}a^{m-2}\alpha z^2 + \dots + \alpha^{m-1}z^m \equiv 0 \pmod{\alpha}.$$

Но такъ какъ

$$\frac{m(m-1)}{1.2}a^{m-1}\alpha z^2 + \dots + \alpha^{m-1}z^m \equiv 0 \pmod{\alpha};$$

то предыдущее сравненіе приведетъ къ такому

$$\frac{a^m - A}{\alpha} + ma^{m-1}z \equiv 0 \pmod{\alpha}.$$

Это сравненіе, будучи первой степени относительно неизвѣстнаго z , легко рѣшается. Притомъ не трудно убѣдиться, что оно всегда имѣетъ рѣшеніе: въ немъ коэффициентъ при z , будучи составленъ изъ произведенія чиселъ m и a простыхъ съ α ,

будетъ число простое съ модулемъ α ; въ этомъ же случаѣ сравненіе первой степени всегда имѣетъ рѣшеніе.

Итакъ рѣшеніемъ сравненія

$$\frac{a^m - A}{\alpha} + ma^{m-1}z \equiv 0 \pmod{\alpha}$$

найдется число z , по которому число, удовлетворяющее сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^2},$$

выразится такъ: $x = a + \alpha z$. Покажемъ теперь, какимъ образомъ по числу b , удовлетворяющему сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^2},$$

найдется число x , для котораго

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^3}.$$

Для этого, полагая въ этомъ сравненіи $x = b + \alpha^2 u$, выведемъ

$$(b + \alpha^2 u)^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^3}.$$

Разлагая же $(b + \alpha^2 u)^m$ по биному Ньютона, сокращая всѣ члены сравненія и модуль на α^2 и опуская члены кратные α , какъ дѣлали выше, найдемъ для опредѣленія u сравненіе

$$\frac{b^m - A}{\alpha^2} + mb^{m-1}u \equiv 0 \pmod{\alpha}.$$

Отсюда опредѣлится u . Зная же u , мы опредѣлимъ число, удовлетворяющее сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^3},$$

изъ уравненія $x = b + \alpha^2 u$.

Поступая такимъ образомъ, мы будемъ находить рѣшенія сравненій $x^m - A \equiv 0$ при модуляхъ α^4 , α^5 , и т. д.

Для примѣра найдемъ рѣшеніе сравненія $x^5 - 2 \equiv 0 \pmod{3^2}$. Сначала рѣшаемъ сравненіе $x^5 - 2 \equiv 0 \pmod{3}$, которое по теоремѣ 39-й приводится къ слѣдующему

$$x - 2^\pi \equiv 0 \pmod{3},$$

гдѣ π опредѣляется условіемъ

$$5\pi \equiv 1 \pmod{2}.$$

Замѣчая, что этому условію удовлетворяетъ $\pi = 1$, мы для рѣшенія сравненія $x^5 - 2 \equiv 0 \pmod{3}$ находимъ

$$x - 2 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Откуда заключаемъ, что 2 есть число ему удовлетворяющее, и для рѣшенія сравненія

$$x^5 - 2 \equiv 0 \pmod{3^2}$$

полагаемъ: $x = 2 + 3z$, гдѣ z опредѣляется условіемъ

$$\frac{2^5 - 2}{3} + 5 \cdot 2^{5-1} z \equiv 0 \pmod{3},$$

или

$$10 + 80z \equiv 0 \pmod{3},$$

которое по сокращеніи на 10 приводится съ слѣдующему

$$8z \equiv -1 \pmod{3}.$$

Между числами, удовлетворяющими этому сравненію, находимъ 1; принимая ее за z , мы находимъ, что $2 + 3z$ равно 5 и это будетъ число, удовлетворяющее сравненію

$$x^5 - 2 \equiv 0 \pmod{3^2}.$$

Обращаемся теперь къ сравненію $x^m - A \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ p какое нибудь число простое съ m и A , и докажемъ, что если p состоитъ изъ произведенія простыхъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, для которыхъ сравненія

$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha}$, $x^m - A \equiv 0 \pmod{\beta}$, $x^m - A \equiv 0 \pmod{\gamma}$... имѣютъ рѣшенія; то можно найти рѣшеніе сравненія

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{p}.$$

Пусть будетъ $p = \alpha^\lambda \beta^\mu \gamma^\nu \dots$. По приему, показанному нами, мы найдемъ числа, удовлетворяющія сравненіямъ

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^\lambda}, \quad x^m - A \equiv 0 \pmod{\beta^\mu}, \quad x^m - A \equiv 0 \pmod{\gamma^\nu} \dots$$

Пусть эти числа будутъ $M, N, P, \dots$; по теоремѣ 13-й всѣ числа, опредѣляемые сравненіемъ

$$x \equiv M \pmod{\alpha^\lambda},$$

будутъ удовлетворять сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^\lambda};$$

числа, опредѣляемые сравненіемъ

$$x \equiv N \pmod{\beta^\mu},$$

будутъ удовлетворять сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\beta^\mu},$$

и т. д. Но въ § 30 видѣли, какимъ образомъ можно найти число, удовлетворяющее всѣмъ сравненіямъ

$$x \equiv M \pmod{\alpha^\lambda}, \quad x \equiv N \pmod{\beta^\mu}, \quad x \equiv P \pmod{\gamma^\nu}, \dots$$

и слѣд. всѣмъ сравненіямъ

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^\lambda}, \quad x^m - A \equiv 0 \pmod{\beta^\mu}, \quad x^m - A \equiv 0 \pmod{\gamma^\nu} \dots$$

А такъ какъ α , β , $\gamma, \dots$ различныя простыя числа; то модули этихъ сравненій α^λ , β^μ , $\gamma^\nu, \dots$ суть числа относительно другъ друга простыя; а въ этомъ случаѣ эти сравненія по § 9 предполагаютъ

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^\lambda \beta^\mu \gamma^\nu \dots}.$$

Такъ мы найдемъ число, удовлетворяющее сравненію

$$x^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^\lambda \beta^\mu \gamma^\nu \dots},$$

опредѣливши число, которое удовлетворяетъ сравненіямъ

$$x \equiv M \pmod{\alpha^\lambda}, \quad x \equiv N \pmod{\beta^\mu}, \quad x \equiv P \pmod{\gamma^\nu}, \dots,$$

гдѣ M , N , $P, \dots$ числа, опредѣляемые условіями

$$M^m - A \equiv 0 \pmod{\alpha^\lambda};$$

$$N^m - A \equiv 0 \pmod{\beta^\mu};$$

$$P^m - A \equiv 0 \pmod{\gamma^\nu};$$

$$\dots\dots\dots$$

ГЛАВА VI.

О сравненіяхъ вида $a^x \equiv A \pmod{p}$.

§ 34. До сихъ поръ мы занимались изслѣдованіемъ такихъ сравненій, которыя заключаютъ въ себѣ алгебраическую цѣлую функцію неизвѣстнаго и разсмотрѣли замѣчательнѣйшія изъ этихъ

сравненій: сравненія первыхъ двухъ степеней и сравненія двучленные. Теперь переходимъ къ сравненіямъ, которыя содержатъ неизвѣстное показателемъ. Изъ этихъ сравненій самое замѣчательное есть $a^x \equiv A \pmod{p}$, гдѣ p число простое, не дѣлящее a и A . Этимъ сравненіемъ мы теперь и займемся. Относительно его легко доказать слѣдующую теорему:

41. ТЕОРЕМА.

Если число α удовлетворяетъ сравненію $a^\alpha \equiv A \pmod{p}$; то ему удовлетворяетъ и всякое число, сравнимое съ α по модулю $p - 1$.

Доказательство. Если z сравнимо съ α по модулю $p - 1$; то $z - \alpha$ дѣлится на $p - 1$. Называя ς частное отъ дѣленія $z - \alpha$ на $p - 1$, найдемъ

$$z - \alpha = (p - 1)\varsigma;$$

откуда слѣдуетъ

$$a^{z-\alpha} = a^{(p-1)\varsigma}.$$

Но по теоремѣ Фермата a^{p-1} и слѣд. $a^{(p-1)\varsigma}$ сравнимо съ 1 по модулю p ; поэтому

$$a^{z-\alpha} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Имѣя же по положенію

$$a^\alpha \equiv A \pmod{p},$$

мы перемноженіемъ этого сравненія съ предыдущимъ находимъ

$$a^z \equiv A \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Изъ доказанной нами теоремѣ видно, что если сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$ удовлетворяетъ одно число, то ему удовлетворяетъ безконечное множество другихъ, сравнимыхъ съ первымъ по модулю $p - 1$. Но всѣ эти числа, сравнимыя между собою по модулю $p - 1$, мы принимаемъ за одно рѣшеніе сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$. Въ этомъ значеніи сравненіе

$$a^x \equiv A \pmod{p}$$

будетъ имѣть столько рѣшеній, сколько положительныхъ чиселъ

меньших $p - 1$ и слѣд. не сравнимыхъ между собою по модулю $p - 1$ ему удовлетворяетъ *). Эти рѣшенія представляются такъ

$$x \equiv \alpha_1, \quad x \equiv \alpha_2, \dots, \quad x \equiv \alpha_n \pmod{p - 1},$$

гдѣ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ суть положительныя числа, меньшія $p - 1$ и удовлетворяющія сравненію

$$a^x \equiv A \pmod{p}.$$

Показавши какъ считаются рѣшенія сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$, мы приступимъ къ опредѣленію числа ихъ и начнемъ съ частнаго случая $A = 1$.

Относительно сравненія $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ легко доказать слѣдующія теоремы:

42. ТЕОРЕМА.

Если сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетворяетъ $x = \alpha$; то ему удовлетворяетъ всякое число кратное α .

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, если сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетворяетъ $x = \alpha$; то $a^\alpha \equiv 1 \pmod{p}$. Это же сравненіе по возведеніи въ какую нибудь степень n будетъ $a^{n\alpha} \equiv 1 \pmod{p}$; откуда слѣдуетъ, что $n\alpha$ удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$.

43. ТЕОРЕМА.

Если сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетворяетъ число α ; то ему удовлетворяетъ и общій наибольшій дѣлитель чиселъ α и $p - 1$.

Доказательство. Эту теорему легко вывести изъ теоремы 36-й, доказанной нами для двучленнаго сравненія $x^m - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, по которой число a , удовлетворяющее этому сравненію, должно также удовлетворять сравненію $x^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p}$, гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель m и $p - 1$, и слѣд. сравненіе $a^m \equiv 1 \pmod{p}$ предполагаетъ сравненіе $a^\omega \equiv 1 \pmod{p}$, въ чемъ и заключается предложенная нами теорема.

*) До этого мы доходимъ, повторяя о рѣшеніяхъ сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$ тѣже сужденія, которые дѣлали въ § 12 при опредѣленіи числа рѣшеній сравненія $fx \equiv 0 \pmod{p}$.

44. ТЕОРЕМА.

Наименьшее число, за исключеніемъ 0, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, есть дѣлитель $p - 1$; прочія же числа ему удовлетворяющія суть кратныя этого дѣлителя.

Доказательство. Пусть будетъ α наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$; по предыдущей теоремѣ сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ будетъ удовлетворять общій наибольшій дѣлитель чиселъ α и $p - 1$. Но этотъ дѣлитель чиселъ $p - 1$ и α , удовлетворяя сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, долженъ быть равенъ α ; ибо въ противномъ случаѣ онъ былъ бы меньше α , между тѣмъ какъ по положенію α есть наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$. Итакъ α должно быть дѣлителемъ числа $p - 1$.

Теперь докажемъ, что всѣ числа, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, суть кратныя α . Для этого мы замѣчаемъ, что по предыдущей теоремѣ сравненіе $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ предполагаетъ $a^\omega \equiv 1 \pmod{p}$, гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ x и $p - 1$. Это же сравненіе вмѣстѣ съ $a^\alpha \equiv 1 \pmod{p}$ предполагаетъ (см. теор. 35) $a^{\omega'} \equiv 1 \pmod{p}$, гдѣ ω' общій наибольшій дѣлитель α и ω . Но ω' должно быть равно α ; иначе ω' , будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ α и ω , было бы меньше α , и такъ какъ ω' удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, то мы бы нашли въ ω' число меньше α , которое удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, что противно положенію. Итакъ ω' равно α . Но мы видѣли, что ω есть общій наибольшій дѣлитель x и $p - 1$; слѣд. α , равное ω' , дѣлитъ ω и x , что и слѣдовало доказать.

Такъ замѣчая, что наименьшее число (послѣ 0), удовлетворяющее сравненію $2^x \equiv 1 \pmod{31}$, есть 5, мы заключаемъ, что только числа кратныя 5 будутъ удовлетворять этому сравненію.

По доказанной нами теоремѣ мы заключаемъ, что наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, есть одинъ изъ дѣлителей $p - 1$ [изъ этого числа не исключается само $p - 1$, которое по теоремѣ Фермата удовлетворяетъ сравненію $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$], и если это число есть α , то всѣ числа, удов-

летворяющія этому сравненію, начиная отъ 0, представлятъ такимъ рядомъ

$$0, \alpha, 2\alpha, \dots;$$

откуда видно, что

$$0, \alpha, 2\alpha, \dots, \alpha \left(\frac{p-1}{\alpha} - 1 \right)$$

суть единственныя числа, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ и меньшія $p-1$; слѣд. рѣшенія сравненія $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ суть

$$x \equiv 0, x \equiv \alpha, x \equiv 2\alpha, \dots, x \equiv \alpha \left(\frac{p-1}{\alpha} - 1 \right) \pmod{p-1},$$

и число ихъ есть $\frac{p-1}{\alpha}$.

Такъ замѣчая, что наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $2^x \equiv 1 \pmod{31}$, есть 5, мы заключаемъ, что это сравненіе имѣетъ $\frac{31-1}{5} = 6$ рѣшеній, которыя суть

$$x \equiv 0, x \equiv 5, x \equiv 2.5, x \equiv 3.5, x \equiv 4.5, x \equiv 5.5 \pmod{30}.$$

Мы нашли, что число рѣшеній сравненія $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ опредѣляется отношеніемъ $p-1$ къ α , гдѣ α наименьшее число, удовлетворяющее этому сравненію. Отсюда слѣдуетъ, что это сравненіе имѣетъ одно только рѣшеніе, если наименьшее число, удовлетворяющее этому сравненію, есть $p-1$.

§ 35. Переходимъ теперь въ сравненіямъ $a^x \equiv A \pmod{p}$ гдѣ A какое нибудь число, недѣлящееся на p , и докажемъ слѣдующую теорему.

45. ТЕОРЕМА.

Если сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$ удовлетворяетъ λ , а наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, есть α ; то первое сравненіе имѣетъ $\frac{p-1}{\alpha}$ рѣшеній, которыя суть

$$x \equiv \lambda, x \equiv \lambda + \alpha, x \equiv \lambda + 2\alpha, \dots, x \equiv \lambda + \left(\frac{p-1}{\alpha} - 1 \right) \alpha \pmod{p-1}.$$

Доказательство. Если λ и α удовлетворяютъ сравненіямъ

$$a^\lambda \equiv A, a^\alpha \equiv 1 \pmod{p};$$

то

$$a^\lambda \equiv A, a^\alpha \equiv 1 \pmod{p}.$$

Возведя обѣ части послѣдняго сравненія въ какую нибудь сте-

пень n и перемноживъ его почленно съ $a^\lambda \equiv A \pmod{p}$, находимъ

$$a^{\lambda+na} \equiv A \pmod{p}.$$

Откуда ясно, что $\lambda + na$ удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$, какое бы ни было цѣлое число n .

Не трудно также убѣдиться, что кромѣ чиселъ вида $\lambda + \alpha n$, нѣтъ другихъ, способныхъ удовлетворить сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$.

Въ самомъ дѣлѣ, если $a^x \equiv A \pmod{p}$, то $a^x \equiv a^\lambda \pmod{p}$; ибо, по положенію, λ удовлетворяетъ сравненію $a^\lambda \equiv A \pmod{p}$. Но сокращая сравненіе $a^x \equiv a^\lambda \pmod{p}$ на a^λ , находимъ $a^{x-\lambda} \equiv 1 \pmod{p}$, что по 44-й теоремѣ, предполагаетъ дѣлимость $x - \lambda$ на α . Полагая же частное отъ дѣленія $x - \lambda$ на α равнымъ n , находимъ $x - \lambda = \alpha n$ и слѣд. $x = \lambda + \alpha n$.

Итакъ числа, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$, опредѣляются формулою $x = \lambda + \alpha n$, гдѣ n какое нибудь число. Но эта формула при значеніяхъ n сравнимыхъ по модулю $\frac{p-1}{\alpha}$ даетъ числа сравнимыя между собою по модулю $p-1$; и обратно при двухъ значеніяхъ n , не сравнимыхъ по модулю $\frac{p-1}{\alpha}$, значенія $\lambda + \alpha n$ будутъ также не сравнимы. Въ этомъ мы убѣждаемся, замѣтивъ, что сравненіе

$$\lambda + \alpha n \equiv \lambda + \alpha n' \pmod{p-1}$$

по уничтоженіи λ и сокращеніи α въ обѣихъ частяхъ сравненія и модуль приводится къ слѣдующему

$$n \equiv n' \pmod{\frac{p-1}{\alpha}}.$$

Но по модулю $\frac{p-1}{\alpha}$ всѣ числа сравнимы съ однимъ изъ слѣдующихъ

$$0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{\alpha} - 1,$$

которые не сравнимы между собою; слѣд. всѣ числа, опредѣляемые формулою $x = \lambda + \alpha n$, будутъ сравнимы по модулю p съ однимъ изъ чиселъ

$$\lambda, \lambda + \alpha, \lambda + 2\alpha, \dots, \lambda + \alpha \left(\frac{p-1}{\alpha} - 1 \right);$$

сами же они другъ съ другомъ будутъ не сравнимы. А потому

всѣ числа вида $\lambda + n\alpha$, или, что одно и то же, удовлетворяющія сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$, опредѣляются сравненіями $x \equiv \lambda$, $x \equiv \lambda + \alpha$, $x \equiv \lambda + 2\alpha$, $x \equiv \lambda + \alpha \left(\frac{p-1}{\alpha} - 1 \right) \pmod{p-1}$, и эти сравненія всѣ различны между собою; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Такъ замѣчая, что сравненію $2^x \equiv 13 \pmod{17}$ удовлетворяетъ $x=6$, наименьшее же число, удовлетворяющее сравненію $2^x \equiv 1 \pmod{17}$, есть 8, мы заключаемъ, что сравненіе $2^x \equiv 13 \pmod{17}$ имѣетъ $\frac{17-1}{8}$, или 2 рѣшенія, которыя суть

$$x \equiv 6, \quad x \equiv 6 + 8 \pmod{16}.$$

§ 36. На основаніи доказанной нами теоремы число рѣшеній сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$, въ случаѣ его возможности, опредѣляется числомъ рѣшеній сравненія $a^x \equiv 1 \pmod{p}$. Теперь мы рассмотримъ особенно тотъ случай, когда сравненіе $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ имѣетъ одно рѣшеніе и слѣд. наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, есть $p-1$. Въ этомъ случаѣ число a получаетъ названіе первообразнаго корня числа p и сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ особенно замѣчательно по своимъ приложеніямъ. Этимъ сравненіемъ мы теперь и займемся. Относительно его мы докажемъ слѣдующую теорему:

46. ТЕОРЕМА.

Если a есть первообразный корень числа p , и A не дѣлится на p ; то сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ имѣетъ одно рѣшеніе.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, по свойству первообразнаго корня a наименьшее число, удовлетворяющее сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$, есть $p-1$. Но въ этомъ случаѣ по предыдущей теоремѣ сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ или имѣетъ одно рѣшеніе или не имѣетъ ни одного. Докажемъ же, что послѣднее не можетъ имѣть мѣста при A недѣлящемся на p . Для этого допустивъ, что сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ не имѣетъ рѣшенія, мы замѣчаемъ, что A , не будучи кратнымъ p , при дѣленіи на p даетъ въ остаткѣ одно изъ чиселъ

$$1, 2, \dots, p-1,$$

и слѣд. съ однимъ изъ этихъ чиселъ будетъ сравнимо по модулю p . Пусть это число будетъ r . Имѣя $A \equiv r \pmod{p}$, мы изъ сравненія $a^x \equiv A \pmod{p}$ выведемъ $a^x \equiv r \pmod{p}$, которое не будетъ имѣть рѣшенія; ибо по положенію не имѣетъ его сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$. Но такъ какъ a число простое съ p ; то $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{p-2}$ не дѣлятся на p , и слѣд. каждое изъ нихъ по модулю p сравнимо съ однимъ изъ чиселъ

$$1, 2, 3, \dots, p-1.$$

Откуда слѣдуетъ, что всѣ $p-1$ чиселъ $0, 1, 2, \dots, p-2$ удовлетворяютъ какому либо изъ $p-1$ сравненій

$$a^x \equiv 1, a^x \equiv 2, a^x \equiv 3, \dots, a^x \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Но такъ какъ одно изъ нихъ есть $a^x \equiv r \pmod{p}$, которое не имѣетъ рѣшенія; то всѣ $p-1$ чиселъ $0, 1, 2, \dots, p-2$ должны удовлетворять остальнымъ $p-2$ сравненіямъ, и слѣд. по крайней мѣрѣ одному изъ нихъ удовлетворяютъ два числа изъ ряда $0, 1, 2, \dots, p-2$, что не возможно; ибо это предполагаетъ въ этомъ сравненіи два рѣшенія. Итакъ нельзя допустить, чтобы сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ при A недѣлящемся на p не имѣло рѣшенія, а это и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что если a есть первообразный корень числа p ; то для всякаго числа A , недѣлящагося на p , сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ будетъ имѣть одно рѣшеніе, и слѣд. будетъ удовлетворяться однимъ числомъ меньшимъ $p-1$ и не меньшимъ нуля. Такое число называютъ *указателемъ* числа A ; первообразный же корень a получаетъ въ этомъ случаѣ названіе *основанія указателей*. Итакъ число x будетъ указателемъ числа A , по основанію a , если x , будучи меньше $p-1$ и не меньше 0, удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv A \pmod{p}$, и въ этомъ случаѣ мы будемъ писать такъ

$$x = \text{Ind. } A.$$

По сказанному нами мы найдемъ $\text{Ind. } A$, рѣшая сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$ и выбирая между числами удовлетворяющими ему то, которое меньше $p-1$ и не меньше нуля. Такъ при однихъ и тѣхъ же модуль p и основаніи a мы найдемъ одну вели-

чину для указателя какого либо числа A , недѣлящагося на p . Обратно зная, что $Ind. A = x$, мы для опредѣленія числа A будемъ имѣть сравненіе $a^x \equiv A \pmod{p}$. Но этимъ не опредѣляется вполне число A ; этому сравненію удовлетворяють всѣ числа, сравнимыя съ A по модулю p , и слѣд. всѣ они имѣють одинъ и тотъ же указатель. Итакъ зная указатель A , мы будемъ знать только число, съ которымъ A сравнимо по модулю p . Это число опредѣляется сравненіемъ $A \equiv a^x \pmod{p}$, при $x = Ind. A$. Поясимъ это примѣромъ. Пусть будетъ $p = 7$. Такъ какъ сравненію $3^x \equiv 1 \pmod{7}$ не удовлетворяють числа 1, 2, 3, 4, 5; то 3 есть первообразный корень числа 7. Примемъ же его за основаніе и найдемъ указателей 1, 2, 3, 4, 5, 6, которые будутъ также указателями всѣхъ чиселъ, сравнимыхъ съ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по модулю 7.

Чтобы найти указателя 1, мы должны рѣшить сравненіе

$$3^x \equiv 1 \pmod{7}.$$

Но ему, очевидно, удовлетворяетъ 0; слѣд.

$$Ind. 1 \equiv 0.$$

Не трудно убѣдиться, что и всегда указатель 1 есть 0; ибо сравненію $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ всегда удовлетворяетъ $x = 0$.

Чтобы найти указателей 2, 3, 4, 5, 6, мы должны рѣшить сравненія

$$3^x \equiv 2, 3^x \equiv 3, 3^x \equiv 4, 3^x \equiv 5, 3^x \equiv 6 \pmod{7},$$

и между числами имъ удовлетворяющими найти тѣ, которые меньше 7—1 и не меньше 0; а это приводится къ тому, чтобы найти, которое изъ чиселъ

$$3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5$$

сравнимо съ 2, 3, 4, 5, 6 по модулю 7. Но такъ какъ эти числа равны

$$3, 9, 27, 81, 243,$$

и остатки отъ дѣленія ихъ на 7 суть

$$3, 2, 6, 4, 5;$$

то мы заключаемъ, что

$$3^1 \equiv 3, 3^2 \equiv 2, 3^3 \equiv 6, 3^4 \equiv 4, 3^5 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Слѣд.

$$Ind. 3 = 1, Ind. 2 = 2, Ind. 6 = 3, Ind. 4 = 4, Ind. 5 = 5.$$

Отсюда для опредѣленія указателей чиселъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по модулю 7 и основанію 3, выходитъ такая таблица

$$\begin{aligned} Ind. 1 &= 0, \\ Ind. 2 &= 2, \\ Ind. 3 &= 1, \\ Ind. 4 &= 4, \\ Ind. 5 &= 5, \\ Ind. 6 &= 3. \end{aligned}$$

По этой таблицѣ мы находимъ указатель всякаго числа A , простаго съ 7, замѣчая, что такое число будетъ сравнимо по модулю 7 съ однимъ изъ чиселъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и слѣд. съ этимъ числомъ имѣетъ одного указателя. Такъ для опредѣленія указателей 20 и—18, мы находимъ, что по модулю 7 эти числа сравнимы съ 6 и 3. Откуда слѣдуетъ

$$\begin{aligned} Ind. 20 &= Ind. 6 = 3, \\ Ind. -18 &= Ind. 3 = 1. \end{aligned}$$

Для опредѣленія чиселъ по данному указателю мы предыдущую таблицу расположимъ такъ:

$$\begin{aligned} 0 &= Ind. 1, \\ 1 &= Ind. 3, \\ 2 &= Ind. 2, \\ 3 &= Ind. 6, \\ 4 &= Ind. 4, \\ 5 &= Ind. 5. \end{aligned}$$

По этой таблицѣ мы найдемъ, какое изъ чиселъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 имѣетъ данный указатель. Такъ найдемъ, что указатель 3 принадлежитъ числу 6. Откуда заключаемъ, что всѣ числа, имѣющія указателемъ 3 по модулю 7 и основанію 3, сравнимы съ 6 по модулю 7.

Изъ сказаннаго нами видно, что составленіе таблицъ указателей не представляетъ никакихъ затрудненій, когда найдены первообразные корни. Но какъ найти ихъ — мы покажемъ впоследствии. Теперь же мы займемся изложеніемъ свойствъ указа-

телей, на основаніи которыхъ таблицы ихъ могутъ быть употребляемы съ чрезвычайною выгодною при рѣшеніи многихъ вопросовъ Теоріи чиселъ. Въ концѣ этой книги помѣщены таблицы указателей для модулей меньшихъ 200. Онѣ заимствованы нами изъ лекцій Алгебраическаго и Трансцендентнаго Анализа Г-на Академика Остроградскаго. Таблицы подѣ буквою *I* служатъ для опредѣленія указателей по данному числу; таблицы же подѣ буквою *N* по данному указателю служатъ для опредѣленія чиселъ. Въ тѣхъ и другихъ таблицахъ данное (будетъ ли это указатель или число) разбивается на десятки и единицы; единицы находятся въ верхней строкѣ, десятки въ крайней лѣвой; иско-мое же находится на одной вертикальной съ единицами и на одной горизонтальной съ десятками.

Такъ, чтобы найти указателя 167 по модулю 193, мы въ таблицѣ подѣ буквою *I* для модуля 193 ищемъ въ верхней строкѣ 7, а въ крайней слѣва 16; число же на одной горизонтальной съ 16 и на одной вертикальной съ 7 есть 101; это и есть искомый указатель 167. Обратно, желая опредѣлить при томъ же модулѣ и основаніи какія числа имѣютъ указателемъ 101, мы въ таблицѣ подѣ буквою *N* въ верхней строкѣ ищемъ 1, въ крайней 10; соотвѣтствующее имъ число въ таблицѣ 167. Откуда заключаемъ, что числа, имѣющія указателемъ 101, сравнимы съ 167 по модулю 193.

§ 37. Займемся теперь изслѣдованіемъ свойствъ указателей, на которыхъ основывается употребленіе ихъ таблицъ.

47. ТЕОРЕМА.

При модуль p указатель произведенія нѣсколькихъ чиселъ сравнимъ съ суммою ихъ указателей по модулю p — 1.

Доказательство. Пусть будутъ $A, B, C, \dots$ данныя числа и $i, i', i'', \dots$ ихъ указатели по модулю p и основанію a ; по свойству указателей будетъ

$$a^i \equiv A, \quad a^{i'} \equiv B, \quad a^{i''} \equiv C, \dots \pmod{p}.$$

Перемножая эти сравненія между собою, найдемъ

$$a^{i+i'+i''+\dots} \equiv ABC\dots (mod. p).$$

Но если I есть указатель $ABC\dots$; то

$$a^I \equiv ABC\dots (mod. p).$$

Изъ этого же сравненія и предыдущаго выходить

$$a^{i+i'+i''+\dots} \equiv a^I (mod. p),$$

что по сокращеніи на a^I даетъ

$$a^{i+i'+i''+\dots-I} \equiv 1 (mod. p).$$

Итакъ число $i + i' + i'' + \dots - I$ удовлетворяетъ сравненію $a^x \equiv 1 (mod. p)$, а это по теоремѣ 44-й предполагаетъ, что это число есть кратное наименьшаго числа, удовлетворяющаго сравненію $a^x \equiv 1 (mod. p)$, которое по свойству первообразныхъ корней есть $p - 1$. Слѣд. разность $i + i' + i'' + \dots - I$ дѣлится на $p - 1$, а это выражается сравненіемъ

$$I \equiv i + i' + i'' + \dots (mod. p - 1),$$

что и слѣдовало доказать.

Такъ по модулю 199 и основанію 127 находимъ

$$Ind. 2 = 194, Ind. 5 = 6, Ind. 19 = 11,$$

слѣдовательно

$$Ind. 2. 5. 19 \equiv 194 + 6 + 11 (mod. 198),$$

или

$$Ind. 190 \equiv 211 (mod. 198).$$

Замѣчая, что число меньше 198 и сравнимое съ 211 по модулю 198 есть 13, мы заключаемъ, что $Ind. 190 \equiv 13$. Такъ мы можемъ всегда найти указателя составнаго числа, зная указателей простыхъ чиселъ, входящихъ въ составъ его.

На основаніи доказанной нами теоремы мы заключаемъ, что указатель степени сравнимъ по модулю $p - 1$ съ произведеніемъ показателя степени на указателя корня. Въ самомъ дѣлѣ, мы нашли, что

$$Ind. ABC\dots \equiv Ind. A + Ind. B + Ind. C\dots (mod. p - 1).$$

Предполагая здѣсь $A=B=C=\dots$ и называя n число чи-

сель $A, B, C, \dots$, мы находимъ

$$\text{Ind. } A^n \equiv n. \text{Ind. } A \pmod{p-1}.$$

Такъ при модуль 199 находимъ $\text{Ind. } 2^3 \equiv 3 \text{Ind. } 2 \pmod{198}$.
Но $\text{Ind. } 2$ есть 194. Слѣд. $\text{Ind. } 2^3 \equiv 3.194 \equiv 582 \pmod{198}$.

48. ТЕОРЕМА.

Если x удовлетворяетъ сравненію $Ax^n \equiv B \pmod{p}$, и въ A и B числа недѣляющіяся на p и p число простое, то указатель x удовлетворяетъ сравненію $n. \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } B - \text{Ind. } A \pmod{p-1}$.

Доказательство. Такъ какъ два числа, сравнимыя по модулю p , имѣютъ одного указателя при томъ же модуль, то изъ сравненія

$$Ax^n \equiv B \pmod{p}$$

выходитъ

$$\text{Ind. } Ax^n = \text{Ind. } B.$$

Но по предыдущей теоремѣ $\text{Ind. } Ax^n$ по модулю $p-1$ сравнимъ съ $\text{Ind. } A + \text{Ind. } x^n$, а $\text{Ind. } x^n$ сравнимъ съ $n \text{Ind. } x$; слѣдовательно

$$\text{Ind. } A + n \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } B \pmod{p-1};$$

откуда выходитъ

$$n. \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } B - \text{Ind. } A \pmod{p-1},$$

что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы легко рѣшаются всѣ сравненія вида $Ax^n \equiv B \pmod{p}$ при p простомъ, A и B недѣлящихся на p . Сюда относятся сравненія первой степени, сравненія второй степени вида $x^2 \equiv q \pmod{p}$ и всѣ сравненія двучленные.

Начнемъ съ приложенія этой теоремы къ сравненіямъ первой степени. Если данное сравненіе есть $Ax \equiv B \pmod{p}$; то на основаніи предыдущей теоремы найдемъ

$$\text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } B - \text{Ind. } A \pmod{p-1}.$$

Замѣчая, что $\text{Ind. } x$ не можетъ быть менѣе 0 и болѣе $p-2$, мы изъ этого сравненія найдемъ его величину, опредѣляя наименьшее положительное число, сравнимое съ $\text{Ind. } B - \text{Ind. } A$

по модулю $p - 1$. Найдя указателя x , мы по таблицѣ найдемъ число, съ которымъ x сравнимо по модулю p ; это и будетъ иско-
мое рѣшеніе.

Такъ для рѣшенія сравненія

$$10x \equiv 9 \pmod{11}$$

находимъ

$$\text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } 9 - \text{Ind. } 10 \pmod{10}.$$

Но изъ таблицъ указателей видимъ, что

$$\text{Ind. } 9 = 6, \text{Ind. } 10 = 5;$$

откуда выходитъ

$$\text{Ind. } x \equiv 6 - 5 \equiv 1 \pmod{10},$$

и слѣдовательно $\text{Ind. } x = 1$. Но $\text{Ind. } x = 1$ соотвѣтствуетъ $x = 2$, слѣд. $x \equiv 2 \pmod{11}$.

Для рѣшенія сравненія $x^2 \equiv q \pmod{p}$, мы изъ предыдущей теоремы выводимъ

$$2 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } q \pmod{p - 1}.$$

Предполагая здѣсь p числомъ нечетнымъ, мы замѣчаемъ, что коэффициентъ искомага $\text{Ind. } x$ и модуль имѣютъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ 2. Изъ этого по теоремѣ 18-й мы заключаемъ, что это сравненіе и слѣд. $x^2 \equiv q \pmod{p}$ не имѣютъ рѣшенія, если $\text{Ind. } q$ не дѣлится на 2. Въ противномъ случаѣ по теоремѣ 19-й сравненіе $2 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } q \pmod{p - 1}$ будетъ имѣть два рѣшенія и слѣд. найдется два числа въ ряду 0, 1, 2, ..., $p - 2$, ему удовлетворяющія. Эти числа будутъ значенія $\text{Ind. } x$ и по нимъ мы найдемъ два рѣшенія сравненія $x^2 \equiv q \pmod{p}$.

Для примѣра возьмемъ сравненіе

$$x^2 \equiv 10 \pmod{101}.$$

Рѣшеніе его приведется къ сравненію

$$2 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } 10 \pmod{100}.$$

Но по таблицамъ находимъ $\text{Ind. } 10 = 25$, что на 2 не дѣлится, слѣд. это сравненіе не имѣетъ рѣшенія.. Дѣйствительно,

опредѣляя значеніе $\left(\frac{10}{101}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{10}{101}\right) = \left(\frac{2}{101}\right) \left(\frac{5}{101}\right) = - \left(\frac{5}{101}\right) = - \left(\frac{101}{5}\right) = - \left(\frac{1}{5}\right) = -1,$$

что обнаруживаетъ невозможность сравненія $x^2 \equiv 10 \pmod{101}$.

Для другаго примѣра возьмемъ сравненіе

$$x^2 \equiv 30 \pmod{107}.$$

Рѣшеніе этого сравненія приводится къ такому

$$2 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } 30 \pmod{106}.$$

Но $\text{Ind. } 30$ есть 80, число четное. Слѣд. это сравненіе имѣетъ рѣшеніе.

Рѣшая сравненіе

$$2 \text{ Ind. } x \equiv 80 \pmod{106},$$

мы находимъ, что наименьшія числа, ему удовлетворяющія, суть 40 и 93. Слѣд.

$$\text{Ind. } x = 40, \text{ Ind. } x = 93.$$

Но эти указатели соотвѣтствуютъ числамъ 64 и 43. Слѣд. рѣшенія сравненія $x^2 \equiv 30 \pmod{107}$ суть

$$x \equiv 64, x \equiv 43 \pmod{107}.$$

Обращаемся теперь къ рѣшенію двучленныхъ сравненій $x^n \equiv B \pmod{p}$.

Рѣшеніе этого сравненія по предыдущей теоремѣ приводится къ слѣдующему

$$n. \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } B \pmod{p-1}.$$

По теоремѣ 18-ой это сравненіе будетъ невозможно, если общій наибольшій дѣлитель чиселъ n и $p-1$ не дѣлитъ $\text{Ind. } B$, слѣд. въ этомъ случаѣ сравненіе

$$x^n \equiv B \pmod{p}$$

не имѣетъ рѣшенія. Если же общій наибольшій дѣлитель n и $p-1$ есть ω , и ω дѣлитъ $\text{Ind. } B$; то сравненіе

$$n. \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } B \pmod{p-1}$$

по теоремѣ 19-й имѣетъ ω рѣшеній. Откуда выходитъ ω различныхъ значеній $\text{Ind. } x$, и слѣд. ω рѣшеній сравненія $x^n \equiv B$

(*mod. p*); все это подтверждаетъ намъ 39-ю теорему, по которой сравненіе $x^n \equiv B \pmod{p}$ или не имѣетъ рѣшенія или имѣетъ ихъ столько, сколько единицъ въ общемъ наибольшемъ дѣлителѣ чиселъ n и $p - 1$.

Для примѣра возьмемъ сравненіе $x^{12} \equiv 17 \pmod{127}$. Для рѣшенія этого сравненія выводимъ

$$12 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } 17 \pmod{126}.$$

Находя для величины *Ind. 17* число 118, которое не дѣлится на 6, общаго наибольшаго дѣлителя 12 и 126, мы заключаемъ, что сравненіе

$$12 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } 17 \pmod{126},$$

и слѣд. сравненіе

$$x^{12} \equiv 17 \pmod{127},$$

не имѣетъ рѣшенія.

Для другаго примѣра возьмемъ сравненіе

$$x^{12} \equiv 38 \pmod{127}.$$

Изъ этого сравненія выходитъ

$$12 \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } 38 \pmod{126},$$

или

$$12 \text{ Ind. } x \equiv 60 \pmod{126}.$$

Здѣсь 60 дѣлится на 6, общій наибольшій дѣлитель чиселъ 12 и 126. Слѣд. это сравненіе имѣетъ 6 рѣшеній; эти рѣшенія мы найдемъ по 19-й теоремѣ, сокращая въ предыдущемъ сравненіи модуль и обѣ части на 6. Это даетъ намъ

$$2 \text{ Ind. } x \equiv 10 \pmod{21}.$$

Рѣшая это сравненіе, мы находимъ, что наименьшее число, ему удовлетворяющее, есть 5. Откуда для рѣшенія сравненія

$$12 \text{ Ind. } x \equiv 60 \pmod{126}$$

выходитъ

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ind. } x \equiv 5, \quad \text{Ind. } x \equiv 26, \quad \text{Ind. } x \equiv 47, \\ \text{Ind. } x \equiv 68, \quad \text{Ind. } x \equiv 89, \quad \text{Ind. } x \equiv 110. \end{array} \right\} \pmod{126}.$$

Изъ этихъ же сравненій слѣдуютъ такія 6 значеній *Ind. x*

$$5, 26, 47, 68, 89, 110.$$

Но этимъ указателямъ соотвѣтствуютъ числа

$$65, 30, 92, 62, 97, 35.$$

Слѣд. рѣшенія сравненія $x^{12} \equiv 17 \pmod{127}$ суть
 $x \equiv 65, x \equiv 30, x \equiv 92, x \equiv 62, x \equiv 97, x \equiv 35 \pmod{127}$.

§ 38. Переходимъ теперь къ опредѣленію первообразныхъ корней и докажемъ, что всякое число a простое съ p и неудовлетворяющее сравненіямъ

$$a^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1, a^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \dots \pmod{p},$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ суть простые числа, входящія въ составъ $p-1$, есть первообразный корень числа p .

Мы видѣли, что a будетъ первообразнымъ корнемъ числа p , если сравненіе $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ не удовлетворяется числомъ меньшимъ $p-1$. Покажемъ же, что это будетъ имѣть мѣсто въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ. Для этого мы допустимъ противное и обнаружимъ несообразность его.

Если сравненіе $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ удовлетворяется при $x < p-1$; то по теоремѣ 43-й удовлетворяется сравненіе $a^{\omega} \equiv 1 \pmod{p}$, гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель чиселъ $p-1$ и x , и слѣд. ω меньше $p-1$. Поэтому дробь $\frac{p-1}{\omega}$ приведется къ цѣлому числу, превосходящему 1. Но въ составъ этого числа могутъ входить только числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, входящія въ составъ $p-1$; слѣдов. одно изъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ дѣлитъ частное $\frac{p-1}{\omega}$. Пусть же это будетъ β и частное отъ дѣленія $\frac{p-1}{\omega}$ на β пусть будетъ ζ . Имѣя

$$\frac{p-1}{\omega\beta} = \zeta,$$

мы выводимъ

$$\omega\zeta = \frac{p-1}{\beta}.$$

На основаніи же этого уравненія, мы изъ сравненія

$$a^{\omega} \equiv 1 \pmod{p},$$

возводя обѣ части его въ степень ζ , находимъ

$$a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p},$$

что противно положенію.

Итакъ сравненіе $a^x \equiv 1 \pmod{p}$ не можетъ удовлетворяться при $x < p-1$, а потому a есть первообразный корень числа p , что и слѣдовало доказать.

На основаніи этого не трудно доказать слѣдующую теорему:

49. ТЕОРЕМА.

Если для a не возможны сравненія

$$x^\alpha \equiv a, \quad x^\beta \equiv a, \quad x^\gamma \equiv a, \dots \pmod{p},$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ суть простыя числа, входящія въ составъ $p-1$; то a есть первообразный корень. Въ противномъ случаѣ a не есть первообразный корень.

Доказательство. По теоремѣ 39-й отсутствіе рѣшеній въ сравненіяхъ

$$x^\alpha \equiv a, \quad x^\beta \equiv a, \quad x^\gamma \equiv a, \dots \pmod{p},$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ суть дѣлители $p-1$, предполагаетъ, что сравненія

$$a^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, \quad a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1, \quad a^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \dots \pmod{p}$$

не имѣютъ рѣшенія, а въ этомъ случаѣ, какъ доказали, число a есть первообразный корень числа p .

Напротивъ того, если какое нибудь изъ сравненій

$$x^\alpha \equiv a, \quad x^\beta \equiv a, \quad x^\gamma \equiv a, \dots \pmod{p}$$

удовлетворяется; то имѣетъ мѣсто одно изъ сравненій

$$a^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, \quad a^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1, \quad a^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \dots \pmod{p},$$

и слѣд. число a не есть первообразный корень.

§ 39. На основаніи этой теоремы легко найти всѣ числа въ ряду $1, 2, 3, \dots, p-1$, которыя не суть первообразные

корни. По доказанной нами теоремѣ, если a не есть первообразный корень p , то какое нибудь изъ сравненій

$$x^{\alpha} \equiv a, \quad x^{\beta} \equiv a, \quad x^{\gamma} \equiv a, \dots \dots (mod. \ p)$$

имѣеть рѣшеніе, а это мы узнаемъ потому, что одно изъ сравненій

$$\left. \begin{array}{l} 1^{\alpha} \equiv a, \quad 2^{\alpha} \equiv a, \quad 3^{\alpha} \equiv a, \dots (p-1)^{\alpha} \equiv a, \\ 1^{\beta} \equiv a, \quad 2^{\beta} \equiv a, \quad 3^{\beta} \equiv a, \dots (p-1)^{\beta} \equiv a, \\ 1^{\gamma} \equiv a, \quad 2^{\gamma} \equiv a, \quad 3^{\gamma} \equiv a, \dots (p-1)^{\gamma} \equiv a, \\ \dots \dots \dots \end{array} \right\} (mod. \ p)$$

удовлетворяется. Слѣд. число a , не будучи первообразнымъ корнемъ, будетъ сравнимо по модулю p съ однимъ изъ чиселъ

$$\begin{array}{l} 1^{\alpha}, \quad 2^{\alpha}, \quad 3^{\alpha}, \dots \dots \dots (p-1)^{\alpha}, \\ 1^{\beta}, \quad 2^{\beta}, \quad 3^{\beta}, \dots \dots \dots (p-1)^{\beta}, \\ 1^{\gamma}, \quad 2^{\gamma}, \quad 3^{\gamma}, \dots \dots \dots (p-1)^{\gamma}, \\ \dots \dots \dots \end{array}$$

а потому между остатками отъ дѣленія этихъ чиселъ на p найдутся всѣ числа, которыя меньше p и не первообразные корни p . Выкинувъ же эти числа изъ ряда

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \dots \dots, \quad p-1,$$

мы найдемъ всѣ первообразные корни меньшіе p . Что же касается до чиселъ, которыя превосходятъ p и имѣють свойство первообразныхъ корней, они, какъ не трудно убѣдиться, будутъ сравнимы съ первыми по модулю p ; мы на нихъ не будемъ останавливаться, потому что они ничего особеннаго не представляютъ и, говоря о числѣ первообразныхъ корней p , мы будемъ разумѣть только тѣ, которые меньше p .

Приложимъ сказанное нами къ опредѣленію первообразныхъ корней числа 13. Такъ какъ въ составъ 13—1 входятъ 2 и 3; то въ ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 всѣ числа, отличныя отъ остатковъ дѣленія

$$\begin{array}{l} 1^2, \quad 2^2, \quad 3^2, \quad 4^2, \quad 5^2, \quad 6^2, \quad 7^2, \quad 8^2, \quad 9^2, \quad 10^2, \quad 11^2, \quad 12^2, \\ 1^3, \quad 2^3, \quad 3^3, \quad 4^3, \quad 5^3, \quad 6^3, \quad 7^3, \quad 8^3, \quad 9^3, \quad 10^3, \quad 11^3, \quad 12^3, \end{array}$$

на 13, будутъ первообразные корни.

Но дѣля

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2, 11^2, 12^2$$

на 13, мы находимъ такой рядъ остатковъ

$$1, 4, 9, 3, 12, 10, 10, 12, 3, 9, 4, 1;$$

дѣля же

$$1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3, 6^3, 7^3, 8^3, 9^3, 10^3, 11^3, 12^3,$$

находимъ остатки

$$1, 8, 1, 12, 8, 8, 5, 5, 1, 12, 5, 12.$$

Исключая изъ ряда

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$$

числа равныя этимъ остаткамъ, находимъ, что первообразные корни числа 13 суть

$$2, 6, 7, 11.$$

§ 40. Показанный нами способъ опредѣленія первообразныхъ корней, замѣчательный тѣмъ, что даетъ всѣ эти корни, становится почти не выполнимымъ, когда ищутъ первообразные корни числа довольно большаго. Въ этомъ случаѣ легче бываетъ найти одинъ изъ первообразныхъ корней (чего для насъ, какъ увидимъ, совершенно достаточно), пробуя различныя числа возводить въ степени и искать, которая изъ нихъ сравнима съ 1 по модулю p , числу котораго ищемъ первообразный корень. Если возводя a въ степени 1, 2, 3,..... мы дойдемъ до a^{p-1} , не найдя между ними числа сравнимаго съ 1 по модулю p , мы заключаемъ, что a есть первообразный корень числа p . Если же мы найдемъ, что $a^n \equiv 1 \pmod{p}$, гдѣ n меньше $p-1$; то мы убѣдимся, что a не первообразный корень. Въ этомъ случаѣ мы будемъ искать число, котораго наименьшая степень, сравнимая съ единицею по модулю p , превосходила бы n и такое число мы всегда найдемъ, поступая слѣдующимъ образомъ.

Мы возьмемъ число изъ ряда

$$1, 2, 3, \dots \dots \dots p-1,$$

отличное отъ остатковъ дѣленія

$$a^1, a^2, a^3, \dots \dots \dots a^n$$

на p и станемъ искать низшую степень его, сравнимую съ еди-

ницею по модулю p . Пусть выбранное нами число будетъ b и низшая степень его, сравнимая съ единицею, будетъ m . Не трудно убѣдиться, что m не будетъ ни равнымъ n , ни дѣлителемъ n ; ибо въ томъ и другомъ случаѣ число b удовлетворяло бы сравненію $b^n \equiv 1 \pmod{p}$, что не возможно по теоремѣ 38-й при b несравнимомъ съ $a^1, a^2, \dots, a^{n-1}$ по модулю p и n наименьшемъ числѣ, удовлетворяющемъ сравненію $a^n \equiv 1 \pmod{p}$. Поэтому или m будетъ больше n и слѣд. само b будетъ числомъ, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею, превосходитъ n , или m , будучи меньше n , въ составѣ своемъ будетъ заключать множителя недѣлящаго n . Въ послѣднемъ случаѣ мы легко найдемъ по a, b, m и n число, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею, превосходитъ n . Для этого мы найдемъ общаго наибольшаго дѣлителя чиселъ m и n , и этого дѣлителя разложимъ на два множителя π и ς такъ, чтобы $\frac{n}{\pi}$ и $\frac{m}{\varsigma}$ были числа относительно другъ друга простыя *); потомъ найдемъ значеніе $a^\pi b^\varsigma$ или числа сравнимаго съ нимъ по модулю p . Такого числа низшая степень, сравнимая съ единицею, будетъ всегда болѣе n . Чтобы убѣдиться въ этомъ, мы докажемъ, что если

$$c \equiv a^\pi b^\varsigma, \quad c^N \equiv 1 \pmod{p};$$

то N дѣлится на $\frac{mn}{\pi\varsigma}$ и слѣд. низшая степень c , сравнимая съ единицею по модулю p , превосходитъ n ; ибо $\pi\varsigma$, будучи общимъ дѣлителемъ m и n , гдѣ m не дѣлитъ n , будетъ меньше m .

Чтобы доказать дѣлимость N на $\frac{mn}{\pi\varsigma}$, гдѣ

$$c^N \equiv 1, \quad c \equiv a^\pi b^\varsigma \pmod{p},$$

мы замѣчаемъ, что изъ этихъ сравненій по исключеніи c выходитъ

$$a^{\pi N} b^{\varsigma N} \equiv 1 \pmod{p}.$$

*) Чтобы сдѣлать такое разложеніе ω , общаго наибольшаго дѣлителя чиселъ m и n , мы разложимъ его на произведеніе простыхъ чиселъ и возьмемъ въ составъ π тѣ простые числа, которыхъ показатели въ ω не ниже показателей въ n ; въ составъ же ς возьмемъ тѣ простые числа, которыхъ показатели въ ω не ниже чѣмъ въ m . Что-же касается до простыхъ чиселъ, которыхъ показательъ въ m и n и слѣд. въ ω одинъ и тотъ-же, мы ихъ безъ различія можемъ взять въ составъ π или ς .

Возводя-же это сравненіе въ степени $\frac{n}{\pi}$, $\frac{m}{\varsigma}$, находимъ

$$a^{\frac{\varsigma n N}{\pi}} b^{\frac{m \pi N}{\varsigma}} \equiv 1, \quad a^{\frac{m \pi N}{\varsigma}} b^{N m} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Но мы видѣли, что m и n удовлетворяютъ сравненіямъ

$$a^n \equiv 1, \quad b^m \equiv 1 \pmod{p};$$

вслѣдствіе чего предыдущія сравненія приводятся къ

$$b^{\frac{\varsigma n N}{\pi}} \equiv 1, \quad a^{\frac{m \pi N}{\varsigma}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Эти-же сравненія по теоремѣ 44 предполагаютъ, что $\frac{N n \varsigma}{\pi}$ дѣлится на m , $\frac{m \pi N}{\varsigma}$ дѣлится на n ; ибо n и m суть наименьшія числа, удовлетворяющія сравненіямъ

$$a^x \equiv 1, \quad b^x \equiv 1 \pmod{p}.$$

Но дѣлимость $\frac{n \varsigma N}{\pi}$ на m , $\frac{m \pi N}{\varsigma}$ на n предполагаетъ числа $\frac{n \varsigma N}{\pi m}$,

$\frac{m \pi N}{\varsigma n}$, или $\frac{N}{\varsigma} \frac{n}{\pi}$, $\frac{N}{\pi} \frac{m}{\varsigma}$ цѣлыми. А потому число $\frac{m}{\varsigma} N$ должно

дѣлиться на $\frac{n}{\pi}$, а число $\frac{n}{\pi} N$ должно дѣлиться на $\frac{m}{\varsigma}$. Но эта дѣлимость при $\frac{m}{\varsigma}$ и $\frac{n}{\pi}$ простыхъ между собою, предполагаетъ дѣлимость N на числа $\frac{n}{\pi}$ и $\frac{m}{\varsigma}$, и слѣд. на произведеніе ихъ $\frac{m n}{\pi \varsigma}$, что и имѣли въ виду доказать.

Такимъ образомъ по числу, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею по модулю p , есть n , гдѣ n меньше $p-1$, мы всегда найдемъ число, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею, будетъ превосходить n ; и слѣд. повторяя эти приемы достаточное число разъ, мы необходимо дойдемъ до числа, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею по модулю p , будетъ не меньше $p-1$; такое число и будетъ первообразный корень числа p .

Для примѣра опредѣлимъ по этому способу первообразный корень числа 17. Испытываемъ не есть ли 2 первообразный корень его. Для этого дѣлимъ

$$2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, \dots$$

на 17; въ остаткѣ отъ этихъ дѣленій находимъ

2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, 1,.....

Дойдя до остатка 1, который получаемъ при дѣленіи 2^8 на 17, мы оканчиваемъ дѣленіе и заключаемъ, что 2 не есть первообразный корень. Послѣ того беремъ другое число, меньшее 17 и не заключающееся между остатками 2, 4, 8, 16, 15, 13, 9, и пробуемъ не есть-ли оно первообразный корень. Наименьшее изъ этихъ чиселъ есть 3; его мы и беремъ для испытанія. Дѣля $3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7, 3^8, 3^9, 3^{10}, 3^{11}, 3^{12}, 3^{13}, 3^{14}, 3^{15}$ на 17 и не находя въ остаткѣ 1, мы заключаемъ, что 3 есть первообразный корень 17.

Для другаго примѣра возьмемъ число 73 и найдемъ его первообразный корень. Начнемъ испытанія съ 2, какъ числа простѣйшаго. Дѣля числа

$2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8, 2^9, \dots$

на 73, мы найдемъ въ остаткѣ

2, 4, 8, 16, 32, 64, 55, 37, 1,.....

Откуда видимъ, что 2 удовлетворяетъ сравненію

$$2^9 \equiv 1 \pmod{73},$$

и слѣд. 2 не есть первообразный корень. Далѣе, замѣчая, что между остатками

2, 4, 8, 16, 32, 64, 55, 37

нѣтъ числа 3, мы беремъ его для испытанія. Дѣля числа

$3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7, 3^8, 3^9, 3^{10}, 3^{11}, 3^{12}, \dots$

на 73, находимъ въ остаткѣ

3, 9, 27, 8, 24, 72, 70, 64, 46, 65, 49, 1,.....

Слѣдовательно

$$3^{12} \equiv 1 \pmod{73}.$$

Откуда заключаемъ, что 3 также не есть первообразный корень числа 73. Но изъ 2 и 3, удовлетворяющихъ сравненіямъ

$$2^9 \equiv 1, \quad 3^{12} \equiv 1 \pmod{73},$$

мы по сказанному нами легко составимъ число, котораго низшая степень, сравнимая съ 1 по модулю 73, будетъ больше 12.

Для этого мы замѣчаемъ, что общій наибольшій дѣлитель 9 и 12 есть 3 и это число, будучи простымъ, въ составъ 12 входитъ въ первой степени, а въ составъ 9 во второй; поэтому для разложенія 3 на два множителя π и ς такъ, чтобы $\frac{9}{\pi}$, $\frac{12}{\varsigma}$ были числа простыя относительно другъ друга, мы возьмемъ $\pi = 1$, $\varsigma = 3$. Вслѣдствіе чего $2 \cdot 3^3$, или 54 будетъ число, котораго низшая степень, сравнимая съ единицею по модулю 73, превзойдетъ 12. Опредѣляя остатки отъ дѣленія

$$\begin{aligned} &54, 54^2, 54^3, 54^4, 54^5, 54^6, 54^7, 54^8, 54^9, \\ &54^{10}, 54^{11}, 54^{12}, 54^{13}, 54^{14}, 54^{15}, 54^{16}, 54^{17}, 54^{18}, \\ &54^{19}, 54^{20}, 54^{21}, 54^{22}, 54^{23}, 54^{24}, 54^{25}, 54^{26}, 54^{27}, \\ &54^{28}, 54^{29}, 54^{30}, 54^{31}, 54^{32}, 54^{33}, 54^{34}, 54^{35}, 54^{36} \end{aligned}$$

на 73, находимъ

$$\begin{aligned} &54, 69, 3, 16, 61, 9, 48, 37, 27, \\ &71, 38, 8, 67, 41, 24, 55, 50, 72, \\ &19, 4, 70, 57, 12, 64, 25, 36, 46, \\ &2, 35, 65, 6, 32, 49, 18, 23, 1. \end{aligned}$$

Откуда заключаемъ, что 36 есть наименьшее число, удовлетворяющее сравненію

$$54^x \equiv 1 \pmod{73}.$$

Продолжая искать первообразный корень 73, мы должны взять число, не заключающееся между найденными нами остатками отъ дѣленія степеней 54 на 73. Наименьшее изъ этихъ чиселъ есть 5; его то мы и будемъ испытывать. Возводя 5 во всѣ степени до 72-й, мы не находимъ числа, сравнимаго съ 1 по модулю 73. Слѣдов. наименьшее число, удовлетворяющее сравненію

$$5^x \equiv 1 \pmod{73},$$

есть 72; откуда заключаемъ, что 5 есть первообразный корень 73.

Такимъ образомъ мы найдемъ одинъ изъ первообразныхъ корней всякаго простаго числа. Но когда извѣстенъ одинъ первообразный корень числа p ; то мы легко найдемъ всѣ другіе. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ a найденный нами первообразный

корень числа p , и $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ различные простые числа, входящія въ составъ $p-1$. Если A есть первообразный корень, то по теоремѣ 49-й сравненія

$$x^\alpha \equiv A, x^\beta \equiv A, x^\gamma \equiv A, \dots \pmod{p}$$

не должны имѣть рѣшенія. Но изъ этихъ сравненій выходитъ $\alpha \text{ Ind } x \equiv \text{Ind. } A, \beta \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } A, \gamma \text{ Ind. } x \equiv \text{Ind. } A, \dots \pmod{p-1}$, а такъ какъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ суть простые числа, входящія въ составъ $p-1$; то условіе невозможности ихъ заключается въ недѣлимости $\text{Ind. } A$ на $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ или, что одно и то же, невозможность ихъ условливается тѣмъ, что $\text{Ind. } A$ число простое съ $p-1$. Но если за основаніе указателей мы предположимъ принятымъ извѣстный намъ первообразный корень a ; то

$$A \equiv a^{\text{Ind. } A} \pmod{p}.$$

Откуда слѣдуетъ, что число, которое есть первообразный корень p , будетъ сравнимо по модулю p съ a , возведеннымъ въ степень простую съ $p-1$.

Такъ всѣ первообразные корни числа 17 по найденному нами 3 опредѣляются сравненіями

$$\begin{aligned} x &\equiv 3, x \equiv 3^3, x \equiv 3^5, x \equiv 3^7, x \equiv 3^9, \\ x &\equiv 3^{11}, x \equiv 3^{13}, x \equiv 3^{15} \pmod{17}; \end{aligned}$$

откуда слѣдуетъ, что первообразные корни 17 суть

$$3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6.$$

§ 41. На основаніи сказаннаго нами мы замѣчаемъ, что въ ряду $1, 2, \dots, p-1$ находится столько первообразныхъ корней p , сколько чиселъ меньшихъ $p-1$ и простыхъ съ $p-1$.

Не трудно также вывести это непосредственно изъ свойствъ первообразныхъ корней, показанныхъ нами въ § 38.

Что-бы найти въ ряду

$$1, 2, 3, \dots, p-1$$

всѣ первообразные корни числа p , намъ стоитъ только выкинуть отсюда всѣ числа, которыя не могутъ быть первообразными корнями числа p . Но по § 38 это приводится къ тому, чтобы

здѣсь выкинуть всѣ числа, которыя удовлетворяютъ сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1, x^{\frac{p-1}{\gamma}} \equiv 1, \dots \pmod{p},$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ простые числа, входящія въ составъ $p-1$.

На основаніи этого не трудно сосчитать сколько первообразныхъ корней между числами $1, 2, 3, \dots, p-1$. Начнемъ съ простѣйшаго случая. Предположимъ, что $p-1$ дѣлится только на простое число α , и слѣд. $p-1 = \alpha^m$. Въ этомъ случаѣ всѣ тѣ изъ чиселъ

$$1, 2, 3, \dots, p-1,$$

которыя не удовлетворяютъ сравненію $x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1 \pmod{p}$, будутъ первообразные корни. Но по теоремѣ 36 между числами $1, 2, 3, \dots, p-1$ находится $\frac{p-1}{\alpha}$ чиселъ, удовлетворяющихъ срав-

ненію $x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1 \pmod{p}$; слѣд. здѣсь всѣ остальные $p-1 - \frac{p-1}{\alpha}$ суть первообразные корни p . Число же $p-1 - \frac{p-1}{\alpha}$ приводится къ $(p-1) \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)$, а это по 12 теоремѣ означаетъ сколько простыхъ чиселъ съ $p-1$ и меньшихъ $p-1$, если $p-1 = \alpha^m$.

Обращаемся теперь къ тому случаю, когда $p-1 = \alpha^m \beta^n$, гдѣ α, β различныя простые числа. Въ этомъ случаѣ мы найдемъ всѣ первообразные корни p между $1, 2, 3, \dots, p-1$, выкинувши отсюда числа, удовлетворяющія сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Но по 36 теоремѣ первому сравненію удовлетворяетъ $\frac{p-1}{\alpha}$ чиселъ меньшихъ p ; второму же удовлетворяетъ $\frac{p-1}{\beta}$ такихъ чиселъ. Притомъ между этими числами, удовлетворяющими сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p},$$

будетъ $\frac{p-1}{\alpha\beta}$ однихъ и тѣхъ же чиселъ, удовлетворяющихъ срав-

ненію

$$x^{\frac{p-1}{\alpha\beta}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Слѣд. различныхъ чиселъ, удовлетворяющихъ сравненіямъ

$$x^{\frac{p-1}{\alpha}} \equiv 1, \quad x^{\frac{p-1}{\beta}} \equiv 1 \pmod{p},$$

будетъ $\frac{p-1}{\alpha} + \frac{p-1}{\beta} - \frac{p-1}{\alpha\beta}$. За исключеніемъ ихъ всѣ числа въ ряду 1, 2, 3, ..., $p-1$ будутъ первообразные корни и число ихъ будетъ $p-1 - \frac{p-1}{\alpha} - \frac{p-1}{\beta} + \frac{p-1}{\alpha\beta}$, или $(p-1) \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \left(1 - \frac{1}{\beta}\right)$. Но по 12 теоремѣ извѣстно, что $(p-1) \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) \left(1 - \frac{1}{\beta}\right)$ означаетъ сколько простыхъ чиселъ съ $p-1$ и меньшихъ $p-1$, если $p-1 = \alpha^m \beta^n$.

Подобнымъ образомъ, полагая $p-1 = \alpha^m \beta^n \gamma^r$, $p-1 = \alpha^m \beta^n \gamma^r \delta^s$, $p-1 = \alpha^m \beta^n \gamma^r \delta^s \epsilon^t$, и т. д., докажемъ, что между числами 1, 2, 3, ..., $p-1$ столько же первообразныхъ корней, сколько чиселъ простыхъ съ $p-1$ и меньшихъ $p-1$.

Каждый изъ первообразныхъ корней p можетъ быть принятъ за основаніе при опредѣленіи указателей по модулю p . Выгоднѣе другихъ принимать тѣ, которые легко возводить въ степени и слѣд. опредѣлять по нимъ указателей. Впрочемъ, зная указателей по одному основанію, не трудно найти ихъ по другому. Пусть будетъ a то основаніе, по которому составлена таблица, а b основаніе, по которому хотимъ вычислить указателя какого нибудь числа A . Называя указателя A по основанію b черезъ x , для опредѣленія x будемъ имѣть

$$A \equiv b^x \pmod{p}.$$

Изъ этого сравненія мы заключаемъ о равенствѣ указателей A и b^x по какому нибудь основанію a . Изображая этихъ указателей по принятому нами знакоположенію черезъ $Ind. x$ и $Ind. b^x$, мы имѣемъ

$$Ind. A = Ind. b^x.$$

Но по свойству указателей $Ind. b^x \equiv x Ind. b \pmod{p-1}$.

Слѣдовательно

$$x \text{ Ind. } b \equiv \text{Ind. } A \pmod{p-1}.$$

Рѣшеніемъ этого сравненія мы найдемъ x .

Это сравненіе будетъ имѣть одно рѣшеніе; ибо, какъ видѣли, указатель первообразнаго корня будетъ всегда число простое съ $p-1$. Рѣшивши это сравненіе, мы легко найдемъ положительное число меньшее $p-1$ и ему удовлетворяющее; это и будетъ искомое число x , указатель числа A при основаніи b .

Для примѣра опредѣлимъ указателя числа 25 по основанію 2 и модулю 29, зная указателей при этомъ модулѣ по основанію 10, какъ находимъ въ нашихъ таблицахъ. Называя искомый указатель черезъ x , мы для опредѣленія его выводимъ

$$x \text{ Ind. } 2 \equiv \text{Ind. } 25 \pmod{28}.$$

Но $\text{Ind. } 2 = 11$, $\text{Ind. } 25 = 8$. Слѣд. x опредѣлится сравненіемъ

$$11x \equiv 8 \pmod{28}.$$

Рѣшая это сравненіе, находимъ

$$x \equiv 16 \pmod{28};$$

откуда для величины указателя 25 по основанію 2 получаемъ 16.

ГЛАВА VII.

О сравненіяхъ второй степени съ двумя неизвѣстными.

§ 42. До сихъ поръ мы занимались сравненіями, въ которыхъ одна неизвѣстная; теперь мы будемъ разсматривать сравненія съ двумя неизвѣстными. Замѣчательнѣйшія изъ нихъ и имѣющія наиболѣе приложения суть сравненія второй степени вида

$$x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p};$$

ими то мы и займемся теперь.

Относительно сравненій этого вида докажемъ слѣдующую теорему:

50. ТЕОРЕМА.

Если p число простое и не дѣлитъ A , то сравненію $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p}$ можно всегда удовлетворить.

Доказательство. Эта теорема очевидна для $p=2$; ибо тогда сравненію $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p}$ удовлетворяетъ $y=0, x=B$. Также очевидна она, если для какого нибудь значенія y сумма $Ay^2 + B$ обращается въ число кратное p ; ибо такая величина y вмѣстѣ съ $x=0$ удовлетворяетъ сравненію $x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p}$.

Докажемъ же теперь возможность удовлетворить этому сравненію при $p > 2$ и $Ay^2 + B$ неспособномъ сдѣлаться дѣлимымъ на p .

Въ этомъ случаѣ между всѣми значеніями $Ay^2 - B$ отъ $y=0$ до $y=p-1$ найдется число, которое будетъ сравнимо съ x^2 по модулю p ; ибо невозможность сравненія

$$x^2 \equiv -Ay^2 - B \pmod{p}$$

при p простомъ бѣльшемъ 2 и $-Ay^2 - B$ недѣлящемся на p , какъ видѣли въ IV главѣ, предполагаетъ сравненіе

$$(-Ay^2 - B)^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

что по раскрытіи скобокъ принимаетъ такой видъ

$$\pm A^{\frac{p-1}{2}} y^{p-1} \pm \frac{p-1}{2} A^{\frac{p-3}{2}} B y^{p-3} + \dots \pm B^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но этому сравненію не могутъ удовлетворять всѣ p чиселъ

$$0, 1, 2, \dots, p-1;$$

ибо оно степени $p-1$ и $A^{\frac{p-1}{2}}$ коэффициентъ y^{p-1} , состоя изъ произведенія чиселъ простыхъ съ p , не дѣлится на p .

Итакъ по крайней мѣрѣ одно изъ чиселъ

$$0, 1, 2, \dots, p-1$$

не будетъ удовлетворять этому сравненію, и такое число обратитъ $-Ay^2 - B$ въ квадратичный вычетъ p . При такомъ же

значеніи — $Ay^2 - B$ найдется x , удовлетворяющій сравненію

$$x^2 \equiv -Ay^2 - B \pmod{p},$$

откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

Изъ доказанной нами теоремы, какъ частный случай, выходитъ, что сравненіе $x^2 + y^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ рѣшеніе.

§ 43. Остановимся на изслѣдованіи сравненія

$$x^2 + Ay^2 + B \equiv 0 \pmod{p}$$

при $B = 0$. Предметомъ нашихъ изслѣдованій будетъ показать, какія свойства имѣетъ число p , для котораго сравненіе

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

удовлетворяется какими нибудь числами x , y , простыми между собою. Возможность этого сравненія намъ покажетъ, что число p можетъ быть дѣлителемъ числа, выражающагося формулою $x^2 + Ay^2$, гдѣ x , y простыя между собою. Въ противномъ случаѣ мы заключимъ, что числа, выражающіяся этою формулою, недѣлимы на p . Въ первомъ случаѣ мы будемъ называть p *дѣлителемъ квадратичной формы $x^2 + Ay^2$* ; во второмъ *недѣлителемъ квадратичной формы*. Мы покажемъ средства по данной формѣ $x^2 + Ay^2$ находить всѣ дѣлители ея и недѣлители. Эти числа мы будемъ представлять или формулами вида $mz + \alpha$, гдѣ z произвольное цѣлое число или формулами вида $am^2 + 2bmv + cv^2$, гдѣ u , v произвольныя цѣлыя числа, простыя между собою. Первое составляетъ изслѣдованія, извѣстныя подъ именемъ *теоріи линейныхъ дѣлителей квадратичныхъ формъ*; второе составляетъ *теорію квадратичныхъ дѣлителей квадратичныхъ формъ*.

Мы начнемъ съ теоріи линейныхъ дѣлителей и докажемъ слѣдующую теорему, которая служитъ основаніемъ ея:

51. ТЕОРЕМА.

Если сравненію $x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}$ удовлетворяютъ какія нибудь числа x , y , простыя между собою; то сравненіе $u^2 + A \equiv 0 \pmod{p}$ имѣетъ рѣшеніе.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, если y и x , не имѣя об-

шаго множителя, удовлетворяють сравненію

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p};$$

то y простое съ p ; ибо въ противномъ случаѣ простое число, дѣлящее y и p , дѣлило бы x и слѣд. x имѣло бы общаго дѣлителя съ y . Но если y простое съ p ; то можно найти такое число u , которое будетъ удовлетворять сравненію

$$yu \equiv x \pmod{p}.$$

Это же сравненіе по возведеніи въ квадратъ обѣихъ частей будетъ

$$y^2 u^2 \equiv x^2 \pmod{p},$$

что въ совокупности съ

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

дастъ

$$y^2 u^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но это сравненіе можетъ быть сокращено на y^2 ; ибо, видѣли, число y простое съ p . Такимъ образомъ находимъ

$$u^2 + A \equiv 0 \pmod{p},$$

что и слѣдовало доказать.

Итакъ возможность удовлетворить сравненію

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

числами x и y простыми между собою предполагаетъ возможность удовлетворить сравненію

$$u^2 + A \equiv 0 \pmod{p}.$$

Обратно, когда это сравненіе удовлетворяется; то мы всегда найдемъ рѣшеніе сравненія

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p},$$

дѣлая $y = 1$, $x = u$.

На основаніи доказанной нами теоремы не трудно узнать, будетъ-ли данное число дѣлителемъ данной формы или нѣтъ.

Такъ находя — 1 для величины $\left(\frac{3}{5}\right)$ по приѣмамъ, изложеннымъ въ IV главѣ, мы заключаемъ, что сравненіе $u^2 - 3 \equiv 0 \pmod{5}$ не имѣетъ рѣшенія. Откуда по доказанному нами слѣ-

дуетъ, что при x и y простыхъ между собою нельзя удовлетво-
рить сравненію

$$x^2 - 3y^2 \equiv 0 \pmod{5},$$

или, что одно и тоже, обратить $x^2 - 3y^2$ въ число кратное 5.

Также замѣчая, что $\left(\frac{-1}{p}\right)$ при p простомъ вида $4n+3$ равно—1, мы заключаемъ, что въ этомъ случаѣ сравненіе $u^2+1 \equiv 0 \pmod{p}$ не имѣетъ рѣшенія; а потому нельзя удовлетворить сравненію

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

числами простыми между собою.

Откуда слѣдуетъ, что никакое простое число вида $4n+3$ не будетъ дѣлителемъ чиселъ, разлагающихся на два квадрата простые между собою.

Такъ числа

$$5 = 2^2 + 1, \quad 10 = 3^2 + 1, \quad 13 = 3^2 + 2^2,$$

$$17 = 4^2 + 1, \quad 25 = 4^2 + 3^2, \quad 26 = 5^2 + 1, \dots\dots$$

не дѣлятся на числа 7, 11, 19, 23 вида $4n+3$.

Напротивъ замѣчая, что $\left(\frac{-1}{p}\right)$ есть +1, если p простое число вида $4n+1$, мы заключаемъ о возможности сравненія

$$u^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

для такихъ значеній p . Откуда слѣдуетъ возможность сравненія

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

и слѣд. дѣлимость суммы двухъ квадратовъ на p .

На основаніи доказанной нами теоремы не трудно показать видъ простаго числа p , которое можетъ быть дѣлителемъ дан-
ной формы $x^2 + Ay^2$. Мы не будемъ останавливаться на случаѣ $p=2$; ибо 2 всегда дѣлитъ $x^2 + Ay^2$ или при $x=1, y=1$ или $x=0, y=1$. По этому мы теперь будемъ предполагать p чи-
сломъ простымъ, отличнымъ отъ 2, и въ этомъ предположеніи *)
докажемъ слѣдующія теоремы:

*) Въ слѣдующихъ теоремахъ p означаетъ любое нечетное число. А. М.

52. ТЕОРЕМА.

Если A простое число вида $4n+3$ и p нечетный дѣлитель формы $x^2 + Ay^2$, то $\left(\frac{p}{A}\right) = +1$.

Доказательство. Если p есть дѣлитель формы $x^2 + Ay^2$; то сравненіе

$$x^2 + Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ рѣшеніе; а это по теоремѣ 51-й предполагаетъ возможность удовлетворить сравненію

$$u^2 + A \equiv 0 \pmod{p}.$$

Разлагая здѣсь p на произведеніе простыхъ чиселъ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, мы по § 30 возможность этого сравненія выразимъ такъ

$$\left(\frac{-A}{\alpha}\right) = 1, \quad \left(\frac{-A}{\beta}\right) = 1, \quad \left(\frac{-A}{\gamma}\right) = 1, \dots$$

Изъ этихъ уравненій не трудно вывести значенія символовъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right), \left(\frac{\beta}{A}\right), \left(\frac{\gamma}{A}\right), \dots$$

Такъ для опредѣленія перваго, мы выводимъ по доказаннымъ въ IV главѣ свойствамъ символа $\left(\frac{p}{q}\right)$, что

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{A}\right) &= \left(\frac{A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A-1}{2}} = \left(\frac{-A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A-1}{2}} \\ &= \left(\frac{-A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A+1}{2}} \end{aligned}$$

Но такъ какъ по предыдущимъ уравненіямъ $\left(\frac{-A}{\alpha}\right)$ равно 1, а число A по положенію вида $4n+3$; то изъ этого уравненія получаемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = 1.$$

Подобнымъ образомъ выводимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right) = 1, \quad \left(\frac{\gamma}{A}\right) = 1, \dots$$

Перемножая же эти уравненія между собою, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) \left(\frac{\beta}{A}\right) \left(\frac{\gamma}{A}\right) \dots = \left(\frac{\alpha\beta\gamma \dots}{A}\right) = 1;$$

откуда замѣчая, что $\alpha\beta\gamma\dots\dots = p$, выводимъ

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1,$$

что и слѣдовало доказать.

§3. ТЕОРЕМА.

Если A простое число вида $4n+1$ и p дѣлитъ x^2+Ay^2 , то $\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$; т. е. $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$, если $p = 4m+1$ и $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$, если $p = 4m+3$.

Доказательство. Если p есть дѣлитель x^2+Ay^2 ; то

$$x^2+Ay^2 \equiv 0 \pmod{p},$$

и слѣд. сравненіе

$$u^2+A \equiv 0 \pmod{p}$$

имѣетъ рѣшеніе. А это, какъ видѣли, предполагаетъ

$$\left(\frac{-A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{-A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{-A}{\gamma}\right) = 1, \dots\dots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots\dots$ суть простые числа, входящія въ составъ p .

На основаніи свойствъ символа $\left(\frac{p}{q}\right)$, мы отсюда выведемъ значенія $\left(\frac{\alpha}{A}\right), \left(\frac{\beta}{A}\right), \left(\frac{\gamma}{A}\right), \dots\dots\dots$

Такъ для опредѣленія перваго выводимъ

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{A}\right) &= \left(\frac{A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A-1}{2}} = \left(\frac{-A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A-1}{2}} \\ &= \left(\frac{-A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A+1}{2}}. \end{aligned}$$

Внеся сюда величину $\left(\frac{-A}{\alpha}\right)$, которая по предыдущему есть 1, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A+1}{2}}.$$

Но A вида $4n+1$, вслѣдствіе чего $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{A+1}{2}}$ равно

$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{4n+2}{2}}$, или $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} (2n+1)}$, а это равно $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}$;

ибо $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot 2n}$ есть 1. По этому величина $\left(\frac{\alpha}{A}\right)$ опредѣлится такимъ уравненіемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}.$$

Подобнымъ образомъ выводимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right) = (-1)^{\frac{\beta-1}{2}}, \left(\frac{\gamma}{A}\right) = (-1)^{\frac{\gamma-1}{2}}, \dots\dots$$

Перемножая же всѣ эти уравненія, имѣемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) \left(\frac{\beta}{A}\right) \left(\frac{\gamma}{A}\right) \dots = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots},$$

или

$$\left(\frac{\alpha\beta\gamma\dots}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots},$$

гдѣ замѣнивъ $\alpha\beta\gamma\dots$ черезъ p , находимъ

$$\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots}$$

Но не трудно убѣдиться, что $\frac{p-1}{2}$ и

$$\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots$$

разнятся между собою числомъ четнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что $p = \alpha\beta\gamma\dots\dots$, а потому $\frac{p-1}{2}$ равно $\frac{\alpha\beta\gamma\dots-1}{2}$, что иначе представится такъ

$$\frac{-1 + \left(1 + 2\frac{\alpha-1}{2}\right) \left(1 + 2\frac{\beta-1}{2}\right) \left(1 + 2\frac{\gamma-1}{2}\right) \dots}{2}.$$

Раскрывая же здѣсь скобки и откидывая члены, имѣющіе множителемъ 2, находимъ

$$\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots\dots$$

Итакъ это число съ $\frac{p-1}{2}$ разнится только числомъ четнымъ; а поэтому

$$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots} = (-1)^{\frac{p-1}{2}};$$

вслѣдствіе чего найденное нами выраженіе $\left(\frac{p}{A}\right)$ приводится къ такому

$$\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

что и слѣдовало доказать.

54. ТЕОРЕМА.

Если A простое число вида $4n + 1$ и p нечетный дѣлитель формы $x^2 - Ay^2$; то $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$.

Доказательство. Если p дѣлитъ $x^2 - Ay^2$; то
 $x^2 - Ay^2 \equiv 0 \pmod{p}$.

Это сравненіе предполагаетъ такое

$$u^2 - A \equiv 0 \pmod{p},$$

а отсюда выходитъ

$$\left(\frac{A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{A}{\gamma}\right) = 1, \dots\dots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots\dots$ простые числа, входящія въ составъ p . Опредѣляя по первому изъ этихъ уравненій значеніе $\left(\frac{\alpha}{A}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = \left(\frac{A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \frac{A-1}{2}} = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \frac{A-1}{2}},$$

что приводится къ равенству

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = 1;$$

потому что $A = 4n + 1$, и слѣд. $\frac{A-1}{2}$ равно четному числу $2n$.

Подобнымъ образомъ находимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right) = 1, \left(\frac{\gamma}{A}\right) = 1, \dots\dots$$

Перемножая же всѣ эти уравненія между собою, найдемъ

$$\left(\frac{\alpha\beta\gamma\dots\dots}{A}\right) = 1.$$

Но здѣсь произведеніе $\alpha\beta\gamma\dots\dots$ равно p ; слѣд.

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1;$$

въ чемъ и заключается предложенная теорема.

55. ТЕОРЕМА.

Если A простое число вида $4n+3$ и p нечетный делитель формы $x^2 - Ay^2$; то $\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$, т. е. $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$, если p вида $4m+1$, и $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$, если p вида $4m+3$.

Доказательство. Делимость $x^2 - Ay^2$ на p предполагает сравнение

$$x^2 - Ay^2 \equiv 0 \pmod{p},$$

а это предполагает сравнение

$$x^2 - A \equiv 0 \pmod{p},$$

и слѣд. уравненія

$$\left(\frac{A}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{A}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{A}{\gamma}\right) = 1, \dots\dots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots\dots$ простые числа, входящія въ составъ p .

Опредѣляя по этимъ уравненіямъ $\left(\frac{\alpha}{A}\right)$, находимъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = \left(\frac{A}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \frac{A-1}{2}} = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \frac{A-1}{2}},$$

и слѣд.

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}};$$

потому что $(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \frac{A-1}{2}}$ для $A = 4n+3$ приводится къ

$$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot 2n + \frac{\alpha-1}{2}}, \text{ гдѣ } (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot 2n} \text{ равно } 1.$$

Подобнымъ образомъ находимъ

$$\left(\frac{\beta}{A}\right) = (-1)^{\frac{\beta-1}{2}}, \left(\frac{\gamma}{A}\right) = (-1)^{\frac{\gamma-1}{2}}, \dots\dots$$

Перемножая же эти уравненія между собою, имѣемъ

$$\left(\frac{\alpha}{A}\right) \left(\frac{\beta}{A}\right) \left(\frac{\gamma}{A}\right) \dots\dots = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots\dots},$$

и слѣд.

$$\left(\frac{p}{A}\right) = \left(\frac{\alpha\beta\gamma\dots}{A}\right) = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots\dots}.$$

Но доказывая 53-й теорему, нашли

$$(-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots} = (-1)^{\frac{p-1}{2}};$$

поэтому предыдущее уравнение даетъ

$$\left(\frac{p}{A}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}},$$

что и слѣдовало доказать.

§ 44. На основаніи доказанныхъ нами теоремъ не трудно опредѣлить всѣ линейные дѣлители формъ вида $x^2 \pm Ay^2$, при A простомъ нечетномъ. Мы видѣли, что нечетные дѣлители такихъ формъ опредѣляются или уравненіемъ

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1$$

или уравненіемъ

$$\left(\frac{p}{A}\right) = -1,$$

смотря по тому будетъ ли въ формѣ $x^2 \pm Ay^2$ знакъ $+$ или $-$, будетъ ли A вида $4n + 3$ или $4n + 1$ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ (см. 53 и 55 теоремы) будетъ ли исконое p вида $4m + 1$ или $4m + 3$.

Но по способу, показанному нами въ § 28-мъ, мы легко найдемъ всѣ числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$ и $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$. Рѣшенія перваго, какъ видѣли тамъ, опредѣляются уравненіями

$$p = a_1 + nA, p = a_2 + nA, \dots, p = a_{\frac{A-1}{2}} + nA,$$

гдѣ n произвольное число, $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{A-1}{2}}$ остатки отъ дѣленія $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{A-1}{2}\right)^2$ на A . Рѣшенія же втораго $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$ опредѣляются уравненіями

$$p = b_1 + nA, p = b_2 + nA, \dots, p = b_{\frac{A-1}{2}} + nA,$$

гдѣ $b_1, b_2, \dots, b_{\frac{A-1}{2}}$ тѣ изъ чиселъ $1, 2, \dots, A-1$, которыя неравны $a_1, a_2, \dots, a_{\frac{A-1}{2}}$.

Теперь посмотримъ, какимъ образомъ каждая изъ этихъ

формуль можетъ служить для опредѣленія чиселъ вида $4m + 1$ или $4m + 3$.

Для того чтобы число p , опредѣляемое уравненіемъ

$$p = a + nA,$$

было вида $4m + 1$, число n должно быть такого вида, чтобы сумма $a + nA$ привелась бы къ $4m + 1$, другими словами, число n должно удовлетворять сравненію

$$a + nA \equiv 1 \pmod{4},$$

или

$$nA \equiv 1 - a \pmod{4}.$$

Это сравненіе всегда будетъ имѣть одно рѣшеніе, потому что A нечетное число; рѣшая его по способу, показанному въ § 15, находимъ

$$n \equiv (1 - a) A^{4 \cdot \frac{2-1}{2} - 1} \pmod{4},$$

или

$$n \equiv A(1 - a) \pmod{4}.$$

Этому сравненію будетъ удовлетворять одно изъ чиселъ 0, 1, 2, 3. Называя r то число, которое ему удовлетворяетъ, найдемъ

$$r \equiv A(1 - a) \pmod{4}.$$

Вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе приводится къ такому

$$n \equiv r \pmod{4},$$

откуда для выраженія n выходитъ

$$n = 4z + r.$$

Внося же эту величину n въ уравненіе

$$p = nA + a,$$

мы находимъ

$$p = 4Az + Ar + a$$

для выраженія чиселъ вида $4m + 1$, опредѣляемыхъ уравненіемъ

$$p = nA + a.$$

Подобнымъ образомъ для чиселъ вида $4m + 3$ мы найдемъ

$$p = 4Az + Ar' + a,$$

гдѣ r' наименьшее число, сравнимое съ A ($3 - a$) по модулю 4. Такъ изъ уравненія

$$p = nA + a,$$

опредѣляющаго одно изъ рѣшеній уравненія

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1,$$

выводятся уравненія, которыя даютъ одни числа вида $4m + 1$ или $4m + 3$.

Не трудно также изъ уравненія

$$p = nA + a$$

вывести другое, которое будетъ давать вмѣстѣ и числа вида $4m + 1$ и числа вида $4m + 3$, слѣд. всѣ нечетныя числа. Для этого мы должны будемъ найти видъ числа n , для котораго сумма $nA + a$ будетъ вида $2m + 1$; или, что одно и тоже, найти рѣшеніе сравненія

$$nA + a \equiv 1 \pmod{2}.$$

Но это сравненіе приводится къ такому

$$nA \equiv 1 - a \pmod{2}.$$

Если a число нечетное, ему удовлетворить $n = 0$, слѣд. въ этомъ случаѣ его рѣшеніе будетъ

$$n \equiv 0 \pmod{2};$$

откуда для опредѣленія n выходитъ такое уравненіе

$$n = 2z.$$

Если же a четное; то ему удовлетворить $n = 1$ (ибо A число нечетное), и слѣд. рѣшеніе его будетъ

$$n = 2z + 1.$$

Внося эти значенія n въ уравненіе

$$p = nA + a,$$

мы находимъ для опредѣленія нечетныхъ чиселъ

$$p = 2Az + a \text{ или } p = 2Az + A + a,$$

смотря потому будетъ ли a число нечетное или четное.

Поступая такимъ образомъ съ каждымъ изъ уравненій, опредѣляющихъ рѣшенія уравненій

$$\left(\frac{p}{A}\right) = 1, \quad \left(\frac{p}{A}\right) = -1,$$

мы найдемъ для выраженія нечетныхъ чиселъ, удовлетворяющихъ условію $\left(\frac{p}{A}\right) = 1$ или $\left(\frac{p}{A}\right) = -1$, формулы вида $2Az + a$; для выраженія же однихъ чиселъ вида $4m + 1$ или $4m + 3$, мы будемъ имѣть формулы вида $4Az + a$. Этими-то формулами на основаніи доказанныхъ нами теоремъ и опредѣляются нечетные дѣлители квадратичной формы $x^2 + Ay^2$.

Покажемъ это на примѣрахъ. Положимъ, что требуется найти видъ всѣхъ нечетныхъ дѣлителей квадратичной формы $x^2 + 19y^2$. Замѣчая, что 19 есть число простое и вида $4n + 3$, мы по теоремѣ 52 заключаемъ, что для нечетныхъ дѣлителей этой формы должно быть

$$\left(\frac{p}{19}\right) = 1.$$

Для опредѣленія чиселъ, удовлетворяющихъ этому уравненію, мы дѣлимъ

$$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2$$

на 19; находя въ остаткѣ

$$1, 4, 9, 16, 6, 17, 11, 7, 5,$$

мы заключаемъ, что p , удовлетворяющее уравненію $\left(\frac{p}{19}\right) = 1$, должно представиться какою либо изъ формулъ

$$19n + 1, 19n + 4, 19n + 9, 19n + 16, 19n + 6, 19n + 17, \\ 19n + 11, 19n + 7, 19n + 5.$$

Но чтобы эти формулы давали одни нечетныя числа, мы по сказанному нами формулу $19n + 1$, въ которой первый членъ нечетный, замѣняемъ формулою $2 \cdot 19z + 1$, формулу $19n + 4$, которой первый членъ четный, замѣняемъ формулою

$$2 \cdot 19z + 19 + 4, \text{ и т. д.}$$

Такимъ образомъ находимъ для нечетныхъ дѣлителей $x^2 + 19y^2$ слѣдующія формулы

$$2 \cdot 19z + 1, 2 \cdot 19z + 19 + 4, 2 \cdot 19z + 9, 2 \cdot 19z + 19 + 16, \\ 2 \cdot 19z + 19 + 6, 2 \cdot 19z + 17, 2 \cdot 19z + 11, 2 \cdot 19z + 7, \\ 2 \cdot 19z + 5,$$

которыя приводятся къ такому виду

$$38z + 1, 38z + 5, 38z + 7, 38z + 9, 38z + 11, 38z + 17, \\ 38z + 23, 38z + 25, 38z + 35.$$

Такъ опредѣляются всѣ числа, которыя могутъ дѣлитель сумму $x^2 + 19y^2$ при x и y простыхъ между собою. Этимъ можно пользоваться при опредѣленіи дѣлителей данныхъ чиселъ, когда эти числа выражены формулою вида $x^2 + 19y^2$. Напр. пусть будетъ дано число 2021; такъ какъ оно равно $11^2 + 19 \cdot 10^2$; то дѣлители его, если они есть, должны представиться какими либо изъ формулъ

$$38z + 1, 38z + 5, 38z + 7, 38z + 9, 38z + 11, 38z + 17, \\ 38z + 23, 38z + 25, 38z + 35.$$

Но если 2021 имѣетъ дѣлителей, то покрайней мѣрѣ одинъ изъ этихъ дѣлителей меньше $\sqrt{2021}$, и слѣд. меньше 45. Этого то дѣлителя мы и будемъ отыскивать.

Первая формула $38z + 1$ не даетъ его. Она при $z = 0$ даетъ 1, при $z = 1$ даетъ 39, что не можетъ дѣлитель 2021, ибо это число не дѣлится на 3, а 39 въ составѣ своемъ содержитъ 3; при $z = 2$ и болѣе 2 формула $38z + 1$ даетъ числа превосходящія 45.

Обращаемся ко второй формулѣ $38z + 5$. При $z = 0$ она даетъ 5, число, очевидно, не дѣлящее 2021; при $z = 1$ она даетъ 43 и пробуя дѣлитель этимъ числомъ 2021, находимъ, что 43 есть дѣлитель 2021.

Для другаго примѣра опредѣленія дѣлителей формъ вида $x^2 + Ay^2$ возьмемъ форму $x^2 + 7y^2$ и отыщемъ ея дѣлители.

Такъ какъ число 7 вида $4n + 3$, то по теоремѣ 55-й дѣлители формы $x^2 + 7y^2$ вида $4m + 1$ должны удовлетворять уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right) = 1;$$

дѣлители же вида $4m + 3$ должны удовлетворять уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right) = -1.$$

Опредѣлимъ же теперь числа вида $4m + 1$, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right) = 1,$$

и числа вида $4m + 3$, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right) = -1.$$

Чтобы найти числа, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right) = 1,$$

мы дѣлимъ $1^2, 2^2, 3^2$ на 7; находя въ остаткѣ 1, 4, 2, мы заключаемъ, что эти числа выражаются формулами

$$7n + 1, 7n + 4, 7n + 2.$$

Посмотримъ же теперь, какъ выведутся изъ нихъ формулы, опредѣляющія одни числа вида $4m + 1$.

По сказанному нами изъ формулы $7n + 1$ выводимъ

$$4.7z + 7r + 1,$$

гдѣ r то изъ чиселъ 0, 1, 2, 3, которое съ $7(1 - 1)$, или 0 сравнимо по модулю 4. Это число есть 0. Слѣд. формула $7n + 1$ для опредѣленія однихъ чиселъ вида $4m + 1$ даетъ $4.7z + 1$, или $28z + 1$.

Поступая также съ формулами

$$7n + 4, 7n + 2,$$

мы изъ нихъ выводимъ $4.7z + 7r + 4, 4.7z + 7r' + 2$, гдѣ r, r' , суть тѣ изъ чиселъ 0, 1, 2, 3, которыя съ $7(1 - 4), 7(1 - 2)$ сравнимы по модулю 4. Но такія числа суть 3, 1. Слѣд. для опредѣленія однихъ чиселъ вида $4m + 1$ формулы $7n + 4, 7n + 2$ даютъ

$$4.7z + 3.7 + 4, 4.7z + 7 + 2,$$

или

$$28z + 25, 28z + 9.$$

Итакъ всѣ числа вида $4m + 1$, удовлетворяющія уравненію

$$\left(\frac{p}{7}\right) = 1$$

и слѣд. способныя быть дѣлителями формы $x^2 - 7y^2$, опредѣляются формулами

$$28z + 1, 28z + 9, 28z + 25.$$

Переходимъ теперь къ дѣлителямъ вида $4m + 3$. Они опредѣляются уравненіемъ

$$\left(\frac{p}{7}\right) = -1.$$

Чтобы найти рѣшенія этого уравненія мы въ ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6 выкидываемъ тѣ, которыя равны остаткамъ отъ дѣленія

$1^2, 2^2, 3^2$ на 7. Такимъ образомъ находимъ числа 3, 5, 6, и заключаемъ, что числа, удовлетворяющія уравненію $\left(\frac{p}{7}\right) = -1$, опредѣляются формулами $7n+3, 7n+5, 7n+6$. Преобразовывая эти формулы въ такія, которыя даютъ одни числа вида $4m+3$, найдемъ

$4.7z+7r+3, 4.7z+7r_1+5, 4.7z+7r_2+6$,
гдѣ r, r_1, r_2 тѣ изъ чиселъ 0, 1, 2, 3, которыя сравнимы съ $7(3-3), 7(3-5), 7(3-6)$ по модулю 4. Замѣчая, что $r=0, r_1=2, r_2=3$, мы заключаемъ, что эти формулы суть

$4.7z+7.0+3, 4.7z+7.2+5, 4.7z+7.3+6$,
или $28z+3, 28z+19, 28z+27$.

Итакъ всѣ дѣлители формы x^2-7y^2 вида $4m+1$ опредѣляются формулами

$$28z+1, 28z+9, 28z+25,$$

дѣлители же вида $4m+3$ суть

$$28z+3, 28z+19, 28z+27.$$

Мы показали какъ опредѣляются дѣлители формы $x^2 \pm Ay^2$ при A простомъ, отличномъ отъ 2; покажемъ теперь какъ найдутся дѣлители этой формы, если A равно 2. Для этого мы докажемъ слѣдующую теорему:

56. ТЕОРЕМА.

Всѣ нечетные дѣлители x^2+2y^2 суть вида $8m+1$ или $8m+3$; всѣ нечетные дѣлители x^2-2y^2 суть вида $8m+1$ или $8m-1$.

Доказательство. Если p дѣлитель x^2+2y^2 ; то

$$x^2+2y^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Но это сравненіе предполагаетъ возможность такого

$$u^2+2 \equiv 0 \pmod{p},$$

и слѣд. предполагаетъ уравненія

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right)=1, \left(\frac{-2}{\beta}\right)=1, \left(\frac{-2}{\gamma}\right)=1, \dots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ простые числа, входящія въ составъ p . Посмотримъ же какого вида должны быть числа $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, чтобы удовлетворялись эти уравненія.

По свойству символовъ $\left(\frac{q}{p}\right)$ мы находимъ

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right) = \left(\frac{2}{\alpha}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2}}.$$

Но $\left(\frac{2}{\alpha}\right)$, какъ видѣли, опредѣляется такъ

$$\left(\frac{2}{\alpha}\right) = (-1)^{-\frac{\alpha^2-1}{8}};$$

слѣдовательно

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right) = (-1)^{-\frac{\alpha^2-1}{8} + \frac{\alpha-1}{2}} = (-1)^{\frac{-\alpha^2+4\alpha-3}{8}}.$$

Дѣлая въ этомъ уравненіи послѣдовательно $\alpha = 8m + 1$, $\alpha = 8m + 3$, $\alpha = 8m + 5$, $\alpha = 8m + 7$, находимъ

$$\left(\frac{-2}{8m+1}\right) = 1, \left(\frac{-2}{8m+3}\right) = 1, \left(\frac{-2}{8m+5}\right) = -1, \left(\frac{-2}{8m+7}\right) = -1.$$

Слѣд. для возможности уравненій

$$\left(\frac{-2}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{-2}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{-2}{\gamma}\right) = 1, \dots\dots$$

необходимо, чтобы числа α , β , γ , были вида $8m + 1$ или $8m + 3$. А потому p , равное $\alpha\beta\gamma\dots$, должно быть произведеніемъ такого вида

$$(8m+1)(8m'+1)(8m''+1)\dots(8m_1+3)(8m_2+3)\dots(8m_\sigma+3).$$

Разлагая же здѣсь скобки и собирая въ одинъ всѣ члены, имѣющіе множителемъ 8, находимъ, что

$$p = 8P + 3^\sigma.$$

Если σ число четное; то $3^\sigma \equiv 1 \pmod{8}$; ибо $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Если же σ число нечетное; то сравненіе $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$, по возведеніи обѣихъ частей въ степень $\frac{\sigma-1}{2}$ и умноженіи на 3 дасть $3^\sigma \equiv 3 \pmod{8}$. Итакъ 3^σ по модулю 8 сравнимо или съ 1 или съ 3. Откуда слѣдуетъ, что 3^σ или вида $8N+1$ или $8N+3$, а потому число p , опредѣляемое уравненіемъ

$$p = 8P + 3^\sigma,$$

будетъ или равно $8(P+N)+1$ или $8(P+N)+3$, въ чемъ и заключается первая часть предложенной нами теоремы.

Переходимъ теперь къ доказательству второй части ея.

Если p дѣлитель формы $x^2 - 2y^2$; то

$$x^2 - 2y^2 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Это же сравненіе предполагаетъ возможность сравненія

$$u^2 - 2 \equiv 0 \pmod{p},$$

и слѣд. уравненія

$$\left(\frac{2}{\alpha}\right) = 1, \left(\frac{2}{\beta}\right) = 1, \left(\frac{2}{\gamma}\right) = 1, \dots\dots$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ простые числа, входящія въ составъ p . Но по теоремѣ 32 изъ этихъ уравненій слѣдуетъ, что $\alpha, \beta, \gamma, \dots\dots$ суть числа вида $8m+1$ или $8m-1$, а потому произведеніе ихъ $\alpha\beta\gamma\dots\dots$, равное p , представится такъ

$$(8m' + 1)(8m'' + 1) \dots\dots (8m_1 - 1)(8m_2 - 1) \dots\dots$$

Но въ разложеніи этого произведенія, кромѣ членовъ кратныхъ 8, будетъ или $+1$ или -1 . Слѣд. p должно быть вида $8m+1$ или $8m-1$, что и слѣдовало доказать.

Показавши, какъ опредѣляются линейные дѣлители формы $x^2 \pm Ay^2$ при A простомъ нечетномъ и $A=2$, намъ остается тоже сдѣлать для этихъ формъ при A составномъ. Но въ этомъ случаѣ линейные дѣлители $x^2 \pm Ay^2$ удобнѣе всего выводятся изъ квадратичныхъ дѣлителей, къ нимъ мы теперь и обращаемся.

§ 45. Выраженіе вида $au^2 + 2buv + cv^2$, гдѣ a, b, c опредѣленные числа, u, v неопредѣленные, мы называемъ квадратичною формою. Двѣ квадратичныя формы $au^2 + 2buv + cv^2$, $a'u^2 + 2b'uv + c'v^2$, которыя способны выражать одни и тѣже числа, мы будемъ называть тождественными и будемъ замѣнять одну другою. Такъ формы $au^2 + 2buv + cv^2$, $au^2 - 2buv + cv^2$, различающіяся только знакомъ коэффициента uv суть тождественныя; ибо значенія первой при $u = \alpha, v = \beta$ равны значеніямъ второй при $u = -\alpha, v = \beta$.

Изъ этого видно, что знакъ коэффициента b въ формѣ $au^2 + 2buv + cv^2$ можетъ быть всегда переимѣненъ и слѣд. этотъ коэффициентъ можетъ быть обращенъ въ количество положительное: такимъ мы его и будемъ всегда предполагать.

Число равное $b^2 - ac$ мы будемъ называть *опредѣлителемъ*

формы $au^2 + 2buv + cv^2$. Такъ опредѣлитель формы $3u^2 + 10uv + 7v^2$ будетъ $5^2 - 3.7$, или 4; опредѣлитель формы $3u^2 + 10uv - 7v^2$ будетъ $5^2 + 3.7$, или 46.

Двѣ формы, имѣющія равныхъ опредѣлителей, мы будемъ называть *подобными*. Такъ формы $3u^2 + 10uv + 7v^2$, $3u^2 + 2uv - v^2$ подобны; ибо какъ опредѣлитель первой $5^2 - 3.7$, такъ и опредѣлитель второй $1^2 + 1.3$ равны 4.

Согласившись въ этихъ названіяхъ, мы докажемъ слѣдующую теорему, весьма важную по своимъ приложеніямъ.

57. ТЕОРЕМА.

*Если въ формѣ $au^2 + 2buv + cv^2$ коэффициентъ $2b$ превосходитъ a или c , то эта форма можетъ быть преобразована въ другую $a'u^2 + 2b'uv + c'v^2$, подобную $au^2 + 2buv + cv^2$, гдѣ $2b'$ не будетъ превосходить ни a' , ни c' . *)*

Доказательство. Для доказательства этой теоремы мы покажемъ, какимъ образомъ при $2b > a$ или $2b > c$ форма $au^2 + 2buv + cv^2$ можетъ быть преобразована въ другую $a_0u^2 + 2b_0uv + c_0v^2$, подобную первой, гдѣ численная величина b_0 меньше b . Но такъ какъ уменьшеніе численной величины коэффициента b не можетъ идти далѣе нуля; то мы необходимо дойдемъ до такой формы $a'u^2 + 2b'uv + c'v^2$, гдѣ дальнѣйшее уменьшеніе коэффициента b' не можетъ имѣть мѣста и слѣд. $2b'$ не $> a'$ и не $> c'$.

Чтобы преобразовать форму $au^2 + 2buv + cv^2$ въ другую $a_0u^2 + 2b_0uv + c_0v^2$, гдѣ бы b_0 было меньше b , пусть будетъ a наименьшее изъ двухъ чиселъ a и c (въ случаѣ равенства ихъ мы можемъ взять то или другое безъ различія) и цѣлое число, которое разнится съ $\frac{b}{a}$ не болѣе какъ $\frac{1}{2}$, пусть будетъ m : очевидно, m будетъ цѣлое число, получаемое при дѣленія b на a , если остатокъ не превосходитъ $\frac{1}{2}a$; въ противномъ случаѣ m

*) Здѣсь мы разумѣемъ численную величину a, b, c, a', b', c' , не обращая вниманія на знаки этихъ количествъ.

будетъ цѣлое число, получаемое при дѣленіи b на a и сложенное съ 1. Полагаемъ $u + tv = U$, и на основаніи этого уравненія исключаемъ u изъ формы $au^2 + 2buv + cv^2$. Такимъ образомъ находимъ

$$a(U - tv)^2 + 2b(U - tv)v + cv^2,$$

или

$$aU^2 + 2(b - at)Uv + (c - 2bt + at^2)v^2.$$

Не трудно убѣдиться, что эта форма подобна $au^2 + 2buv + cv^2$, и что въ ней коэффициентъ Uv меньше $2b$. Въ самомъ дѣлѣ, опредѣлитель этой формы есть

$$(b - at)^2 - a(c - 2bt + at^2),$$

что приводится по раскрытіи скобокъ къ $b^2 - ac$, а это есть опредѣлитель формы $au^2 + 2buv + cv^2$.

Съ другой стороны, такъ какъ t выбрано нами подъ условіемъ, чтобы разность $\frac{b}{a} - t$ была числомъ не превосходящимъ $\frac{1}{2}$; то $2(b - at) = 2a\left(\frac{b}{a} - t\right)$ будетъ число, непревосходящее a и потому мѣньшее $2b$; ибо мы рассматриваемъ форму $au^2 + 2buv + cv^2$, гдѣ $2b$ превосходитъ одно изъ чиселъ a и c , притомъ a или равно c или меньше c .

Слѣд. въ полученной нами формѣ

$$aU^2 + 2(b - at)Uv + (c - 2bt + at^2)v^2$$

коэффициентъ средняго члена меньше соответствующаго ему въ формѣ $au^2 + 2buv + cv^2$.

Если въ полученной нами формѣ этотъ коэффициентъ превосходитъ одинъ изъ коэффициентовъ крайнихъ членовъ; мы ее снова будемъ также преобразовать, какъ преобразовывали $au^2 + 2buv + cv^2$ и будемъ повторять это преобразование до тѣхъ поръ, пока получимъ форму, гдѣ такое преобразование невозможно и слѣд. средній коэффициентъ не превосходитъ ни одного изъ крайнихъ. Напр. пусть будетъ дана форма $3u^2 + 10uv + 6v^2$. Для преобразованія ея ищемъ цѣлое число, которое бы съ $\frac{5}{3}$ разнилось не болѣе какъ на $\frac{1}{2}$; и такъ какъ это число есть 2, то дѣлаемъ $u + 2v = U$. Внося отсюда величину u въ данную форму,

находимъ

$$3(U - 2v)^2 + 10(U - 2v)v + 6v^2,$$

что по раскрытіи скобокъ приводится къ такой формѣ

$$3U^2 - 2Uv - 2v^2.$$

Въ этой формѣ средній коэффициентъ не превосходитъ ни одного изъ крайнихъ; въ противномъ случаѣ мы бы стали ее снова преобразовывать.

Изъ доказанной нами теоремы мы выводимъ слѣдующія:

58. ТЕОРЕМА.

Если опредѣлитель формы $au^2 + 2buv + cv^2$ есть положительное число D , то она можетъ быть приведена къ виду $a_1u^2 + 2b_1uv - c_1v^2$, гдѣ $a_1c_1 + b_1^2 = D$, числа a_1, c_1 , положительные, которыя не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{5}}$.

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ по предыдущей теоремѣ форма $au^2 + 2buv + cv^2$ преобразовывается въ форму

$$a_1u^2 + 2b_1uv + c_0v^2,$$

гдѣ $2b_1$ не превосходитъ численной величины ни a_1 , ни c_0 ; притомъ въ этой формѣ, какъ подобной $au^2 + 2buv + cv^2$, опредѣлитель будетъ имѣть ту же величину D , и слѣд. будетъ $b_1^2 - a_1c_0 = D$. Но при $D > 0$ это уравненіе предполагаетъ разность $b_1^2 - a_1c_0$ количествомъ положительнымъ, что не можетъ быть, если a_1 и c_0 имѣютъ одинакіе знаки; ибо тогда произведеніе a_1c_0 будетъ количествомъ положительнымъ, превосходящимъ b_1^2 , потому что численные величины a_1 и c_0 не меньше $2b$. Итакъ въ формѣ $a_1u^2 + 2b_1uv + c_0v^2$ крайніе члены съ противными знаками. Положимъ же, что членъ a_1u^2 есть тотъ изъ крайнихъ, который имѣетъ знакъ $+$, а членъ c_0v^2 есть тотъ, который съ $-$. Называя черезъ c_1 численную величину c_0 , мы будемъ имѣть $c_0 = -c_1$; вслѣдствіе чего форма

$$a_1u^2 + 2b_1uv - c_0v^2$$

и уравненіе $b_1^2 - a_1c_0 = D$ измѣнятся въ такія

$$a_1u^2 + 2b_1uv - c_1v^2, \quad b_1^2 + a_1c_1 = D.$$

Но по свойству коэффициентовъ этой формы будетъ

$$a_1 \text{ не } < 2b_1, \quad c_1 \text{ не } < 2b_1;$$

вслѣдствіе чего изъ уравненія

$$b_1^2 + a_1 c_1 = D$$

выходить

$$D \text{ не } < b_1^2 + 2b_1, \text{ не } < 5b_1^2,$$

а потому

$$b_1 \text{ не } > \sqrt{\frac{D}{5}}.$$

Вотъ условіе, которому вмѣстѣ съ условіями

$$b_1^2 + a_1 c_1 = D, \quad a_1 \text{ не } < 2b_1, \quad c_1 \text{ не } < 2b_1$$

будутъ удовлетворять коэффициенты формы

$$a_1 u^2 + 2b_1 uv + c_1 v^2,$$

выведенной нами изъ данной

$$au^2 + 2buv + cv^2.$$

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

59. ТЕОРЕМА.

Если опредѣлитель формы $au^2 + 2buv + cv^2$ есть число отрицательное — D ; то она можетъ быть приведена къ виду $a_1 u^2 + 2b_1 uv + c_1 v^2$, гдѣ $a_1 c_1 - b_1^2 = D$, количества a_1 и c_1 съ одинаковыми знаками и не меньше $2b_1$; притомъ b_1 не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{3}}$.

Доказательство. Мы видѣли, что форма $au^2 + 2buv + cv^2$ можетъ быть приведена къ виду $a_1 u^2 + 2b_1 uv + c_1 v^2$, гдѣ $2b_1$ не превосходитъ ни a_1 , ни c_1 ; притомъ въ этой формѣ, какъ подобной $au^2 + 2buv + cv^2$, опредѣлитель будетъ имѣть ту-же величину — D , и слѣд. $b_1^2 - a_1 c_1 = -D$.

Но это уравненіе, гдѣ D число положительное, предполагаетъ одинакіе знаки въ количествахъ a_1 , c_1 . Притомъ замѣчая, что a_1 и c_1 не меньше $2b_1$, мы изъ этого уравненія выводимъ

$$2b_1 \cdot 2b_1 - b_1^2 \text{ не } > D,$$

или

$$3b_1^2 \text{ не } > D,$$

и слѣд. $b_1 \text{ не } > \sqrt{\frac{D}{3}}.$

Доказавши эту теорему, замѣтимъ, что въ разсматриваемомъ нами случаѣ форма $a_1 u^2 + 2b_1 uv + c_1 v^2$ можетъ представлять положительныя числа только въ случаѣ a_1 положительнаго.

Въ самомъ дѣлѣ, выраженіе $a_1 u^2 + 2b_1 uv + c_1 v^2$ можетъ быть такъ представлено

$$a_1 \left(u^2 + 2 \frac{b_1}{a_1} uv + \frac{c_1}{a_1} v^2 \right),$$

а это равняется

$$a_1 \left[\left(u + \frac{b_1}{a_1} v \right)^2 + \frac{a_1 c_1 - b_1^2}{a_1^2} v^2 \right],$$

и вслѣдствіе уравненія $b_1^2 - a_1 c_1 = -D$ приводится къ

$$a_1 \left[\left(u + \frac{b_1}{a_1} v \right)^2 + \frac{D}{a_1^2} v^2 \right],$$

что въ случаѣ a_1 отрицательнаго не можетъ имѣть значенія положительнаго; ибо $D > 0$, и квадраты $\left(u + \frac{b_1}{a_1} v \right)^2$, $\left(\frac{v}{a_1} \right)^2$ не могутъ имѣть значенія отрицательнаго.

§ 46. Показавши свойства квадратичныхъ формъ, необходимыя намъ впослѣдствіи, обращаемся опять къ дѣлителямъ формъ вида $x^2 \pm Ay^2$, и докажемъ слѣдующую теорему:

60. ТЕОРЕМА.

Всякій дѣлитель формы $x^2 - dy^2$ можетъ быть представленъ квадратичною формою, имѣющею определителемъ d .

Доказательство. Пусть будетъ p дѣлитель формы $x^2 - dy^2$ и P частное отъ дѣленія $x^2 - dy^2$ на p ; приравнивая дѣлимое произведенію дѣлителя на частное, имѣемъ

$$x^2 - dy^2 = pP.$$

Здѣсь y и P должны быть числа относительно другъ друга простыя; ибо по этому уравненію простое число, дѣлящее y и P , дѣлитъ x^2 и слѣд. x , что невозможно; ибо въ формѣ $x^2 - dy^2$ мы всегда предполагаемъ x и y неимѣющими общаго дѣлителя.

Но при y простомъ съ P сравненіе

$$yt \equiv x \pmod{P}$$

имѣетъ рѣшеніе, и слѣд. найдется число t , для котораго разность $yt - x$ раздѣлится на P . Полагая же частное отъ дѣленія $yt - x$ на P равнымъ u , имѣемъ

$$\frac{yt - x}{P} = u;$$

откуда выходитъ

$$x = yt - uP.$$

Внося это выраженіе x въ уравненіе

$$x^2 - dy^2 = pP,$$

найдемъ

$$(yt - uP)^2 - dy^2 = pP,$$

или

$$P^2 u^2 - 2Pytu + (t^2 - d) y^2 = pP.$$

Это уравненіе по сокращеніи на P даетъ

$$p = Pu^2 - 2ytu + \frac{t^2 - d}{P} y^2,$$

гдѣ $t^2 - d$ раздѣлится на P ; ибо это уравненіе предполагаетъ дѣлимость $(t^2 - d) y^2$ на P , а y число простое съ P . Изъ этого уравненія мы видимъ, что p выражается квадратичною формою

$$p = Pu^2 - 2ytu + \frac{t^2 - d}{P} y^2,$$

которой коэффициенты суть P , $-2t$, $\frac{t^2 - d}{P}$ и слѣд. опредѣлитель ея равенъ $t^2 - P \cdot \frac{t^2 - d}{P}$, или d , что и слѣдовало доказать.

Изъ этой теоремы въ совокупности съ показанными нами свойствами квадратичныхъ формъ легко вывести слѣдующія теоремы:

61. ТЕОРЕМА.

Дѣлитель $x^2 - Dy^2$ при $D > 0$ можетъ быть представленъ формою $au^2 + 2buv - cv^2$, гдѣ $ac + b^2 = D$, числа a и c положительныя, не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{5}}$.

Доказательство. По предыдущей теоремѣ всякій дѣлитель формы $x^2 - Dy^2$ можетъ быть представленъ формою

$$au^2 + 2bu - cv^2,$$

въ которой опредѣлитель $b^2 - ac$ будетъ равенъ D . Но такая форма по теоремѣ 58-й можетъ быть приведена къ виду

$$au^2 + 2buv - cv^2,$$

гдѣ a , b , c удовлетворяютъ уравненію $ac + b^2 = D$, числа a , c положительныя, которыя не меньше $2b$; число b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{5}}$; откуда и слѣдуетъ предложенная нами теорема.

62. ТЕОРЕМА.

Дѣлитель $x^2 + Dy^2$ при $D > 0$ можетъ быть представленъ формою $au^2 + 2buv + cv^2$, гдѣ $ac - b^2 = D$, числа a , c положительныя, не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{3}}$.

Доказательство. По теоремѣ 60-й дѣлитель $x^2 + Dy^2$ представится формою

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

которой опредѣлитель будетъ — D . Но такая форма по теоремѣ 59-й приводится къ виду

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

гдѣ $ac - b^2 = D$, численная величина a , c не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{D}{3}}$. Притомъ a и c будутъ имѣть одинъ знакъ, который здѣсь не можетъ быть —; ибо видѣли въ концѣ предыдущаго параграфа, что въ этомъ случаѣ формула $au^2 + 2buv + cv^2$ не можетъ имѣть значеній положительныхъ.

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи доказанныхъ нами теоремъ можно показать какими квадратичными формами выражаются всѣ дѣлители данной формы вида $x^2 \pm Dy^2$.

Покажемъ это на примѣрахъ.

Пусть будетъ дана форма $x^2 + y^2$. По теоремѣ 62-й дѣлители ея будутъ представляться формами

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

гдѣ $ac - b^2 = 1$, a и c положительныя числа, не меньше $2b$, и b не превосходитъ $\sqrt{\frac{1}{3}}$. Но изъ послѣдняго слѣдуетъ, что $b = 0$; уравненіе же $ac - b^2 = 1$ при $b = 0$ даетъ $ac = 1$; откуда для значеній a и c , которыя должны быть > 0 , выходитъ

$$a = 1, \quad c = 1.$$

Изъ этого мы заключаемъ, что всѣ дѣлители формы $x^2 + y^2$ представляются формою $u^2 + v^2$.

На основаніи этой же теоремы дѣлители $x^2 + 2y^2$ будутъ

представляться формами

$$au^3 + 2buv + cv^3,$$

въ которыхъ $ac - b^2 = 2$, a и c числа положительныя, не меньше $2b$ и b не $> \sqrt{\frac{2}{3}}$.

Но изъ условія b не $> \sqrt{\frac{2}{3}}$ слѣдуетъ, что $b = 0$; послѣ того изъ уравненія $ac - b^2 = 2$ выводимъ $ac = 2$. Но такъ какъ a и c должны быть числа положительныя, то это уравненіе предполагаетъ одно изъ двухъ: или $a = 2$, $c = 1$, или $a = 1$, $c = 2$. Первому предположенію соотвѣтствуетъ форма $2u^3 + v^3$, второму $u^3 + 2v^3$.

Но эти формы тождественны между собою; слѣд. всѣ дѣлители $x^2 + 2y^2$ представятся одною формою $2u^3 + v^3$.

Подобнымъ образомъ найдемъ, что дѣлители $x^2 - y^2$ представляются формою $u^3 - v^3$, дѣлители $x^2 - 2y^2$ представляются формою $u^3 - 2v^3$ или $2u^3 - v^3$, дѣлители $x^2 - 3y^2$ представляются формами $3u^3 - v^3$, $u^3 - 3v^3$. Для примѣра болѣе сложныхъ формъ возьмемъ $x^2 - 21y^2$.

По теоремѣ 61-й дѣлители этой формы будутъ представляться квадратичными формами

$$au^2 + 2buv - cv^2,$$

въ которыхъ

$$b \text{ не } > \sqrt{\frac{21}{5}}, \quad ac + b^2 = 21.$$

Первое намъ опредѣляетъ всѣ возможныя величины b ; изъ него мы заключаемъ, что b можетъ имѣть только значенія

$$0, 1, 2.$$

Предполагая b послѣдовательно равнымъ всѣмъ этимъ числамъ, мы изъ уравненія $ac + b^2 = 21$, обращая вниманіе на то, что a и c болѣе 0 и не менѣе $2b$, найдемъ всѣ значенія, которыя могутъ имѣть a , b , c въ формѣ $au^2 + 2buv - cv^2$, опредѣляющей дѣлителей $x^2 - 21y^2$. Такъ дѣлая $b = 0$, найдемъ $ac = 21$, что можетъ быть удовлетворено только предположеніями

$$\begin{array}{c|c|c|c} a = 1 & a = 3 & a = 7 & a = 21 \\ c = 21 & c = 7 & c = 3 & c = 1, \end{array}$$

которыя всё удовлетворяють условію: a и $c > 0$ и не $< 2b$, гдѣ $b = 0$.

Дѣлая $b = 1$, найдемъ $ac + 1 = 21$; откуда $ac = 20$, и это приводитъ насъ къ предположеніямъ

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} a = 1 & a = 2 & a = 4 & a = 5 & a = 10 & a = 20 \\ c = 20 & c = 10 & c = 5 & c = 4 & c = 2 & c = 1. \end{array}$$

Но первое и послѣднее не удовлетворяють условію: a и c не $< 2b$; ибо $b = 1$.

Итакъ для $b = 1$ будетъ одно изъ четырехъ

$$\begin{array}{c|c|c|c} a = 2 & a = 4 & a = 5 & a = 10 \\ c = 10 & c = 5 & c = 4 & c = 2. \end{array}$$

Наконецъ для $b = 2$ находимъ $ac + 4 = 21$; откуда $ac = 17$, и слѣд. одно изъ двухъ

$$\begin{array}{c|c} a = 1 & a = 17 \\ c = 17 & c = 1. \end{array}$$

Но оба эти случая невозможны; ибо $2b$, будучи здѣсь равно 4, въ первомъ предположеніи превосходитъ a , во второмъ c .

Итакъ всё дѣлители $x^3 - 17y^3$ должны представляться формами

$$\begin{aligned} u^2 - 21v^2, \quad 3u^2 - 7v^2, \quad 7u^2 - 3v^2, \quad 21u^2 - v^2, \\ 2u^2 + 2uv - 10v^2, \quad 4u^2 + 2uv - 5v^2, \quad 5u^2 + 2uv - 4v^2, \\ 10u^2 + 2uv - 2v^2. \end{aligned}$$

Но формы $2u^2 + 2uv - 10v^2$, $10u^2 + 2uv - 2v^2$ даютъ одни числа четныя; слѣд. всё нечетные дѣлители $x^3 - 21y^3$ будутъ представляться формами

$$\begin{aligned} u^2 - 21v^2, \quad 3u^2 - 7v^2, \quad 7u^2 - 3v^2, \quad 21u^2 - v^2, \\ 4u^2 + 2uv - 5v^2, \quad 5u^2 + 2uv - 4v^2. \end{aligned}$$

Для другаго примѣра возьмемъ форму $x^3 + 26y^3$. По теоремѣ 62-й дѣлители ея представятся формами

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

гдѣ

$$b \text{ не } > \sqrt{\frac{26}{3}}, \quad ac - b^2 = 26, \quad a \text{ и } c \text{ не } < 2b.$$

Первое неравенство предполагаетъ b однимъ изъ трехъ чиселъ

$$0, \quad 1, \quad 2.$$

Дѣлая $b = 0$, мы для опредѣленія a и c находимъ условія

$$ac = 26, a \text{ и } c \text{ не } < 0.$$

Эти условія приводятъ насъ къ предположеніямъ

$$\begin{array}{c|c|c|c} a = 1 & a = 2 & a = 13 & a = 26 \\ c = 26 & c = 13 & c = 2 & c = 1. \end{array}$$

Дѣлая $b = 1$, мы находимъ

$$ac = 27, a \text{ и } c \text{ не } < 2.$$

Уравненію $ac = 27$ удовлетворяють

$$\begin{array}{c|c|c|c} a = 1 & a = 3 & a = 9 & a = 27 \\ c = 27 & c = 9 & c = 3 & c = 1. \end{array}$$

Но изъ этихъ величинъ a и c условію

$$a \text{ не } < 2, c \text{ не } < 2$$

удовлетворяють только

$$\begin{array}{c|c} a = 3 & a = 9 \\ c = 9 & c = 3. \end{array}$$

Наконецъ для $b = 2$ находимъ

$$ac = 30, a \text{ и } c \text{ не } < 4.$$

Уравненію $ac = 30$ мы удовлетворяемъ предположеніями

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c} a = 1 & a = 2 & a = 3 & a = 5 & a = 6 & a = 10 & a = 15 & a = 30 \\ c = 30 & c = 15 & c = 10 & c = 6 & c = 5 & c = 3 & c = 2 & c = 1. \end{array}$$

Но изъ нихъ условію

$$a \text{ не } < 4, c \text{ не } < 4$$

удовлетворяють только

$$\begin{array}{c|c} a = 5 & a = 6 \\ c = 6 & c = 5. \end{array}$$

Отсюда для дѣлителей $x^2 + 26y^2$ выходятъ слѣдующія формы

$$\begin{aligned} &u^2 + 26v^2, 2u^2 + 13v^2, 13u^2 + 2v^2, 26u^2 + v^2, \\ &3u^2 + 2uv + 9v^2, 9u^2 + 2uv + 3v^2, 5u^2 + 4uv + 6v^2, \\ &6u^2 + 4uv + 5v^2. \end{aligned}$$

Замѣчая, что здѣсь $u^2 + 26v^2$ тождественно съ $26u^2 + v^2$, $2u^2 + 13v^2$ съ $13u^2 + 2v^2$, $3u^2 + 2uv + 9v^2$ съ $9u^2 + 2uv + 3v^2$, $5u^2 + 4uv + 6v^2$ съ $6u^2 + 4uv + 5v^2$, заключаемъ, что всѣ дѣлители $x^2 + 26y^2$ будутъ представляться формами

$$u^2 + 26v^2, 2u^2 + 13v^2, 3u^2 + 2uv + 9v^2, 5u^2 + 4uv + 6v^2.$$

Вотъ какимъ образомъ на основаніи доказанныхъ нами тео-

ремь могутъ быть выведены всѣ квадратичныя формы дѣлителей $x^2 \pm Dy^2$. Отсюда выходитъ много любопытныхъ предложеній относительно рѣшенія уравненій вида $ax^2 + 2bxy + cy^2 = H$, составляющихъ предметъ изслѣдованія Теоріи неопредѣленныхъ уравненій высшихъ степеней. Здѣсь же мы воспользуемся квадратичными формами дѣлителей $x^2 \pm Dy^2$ для опредѣленія его линейныхъ дѣлителей. Мы показали, какъ найдутся дѣлители $x^2 \pm Dy^2$, когда D число простое; теперь мы покажемъ, какъ найдутся дѣлители этой формы при всякомъ значеніи D , будетъ ли D число простое или составное. При этомъ мы будемъ предполагать D недѣляющимся на квадратъ какого нибудь числа; ибо для $D = D_1 k^2$ форма $x^2 \pm D_1 k^2 y^2$ приведется къ $x^2 \pm D_1 (ky)^2$, и слѣд. къ $x^2 \pm D_1 y_1^2$, полагая $y_1 = ky$. Итакъ разсматривая дѣлителей формы $x^2 \pm Dy^2$, мы можемъ выкинуть изъ состава D всѣ точные квадраты; поступая такимъ образомъ, мы будемъ имѣть формы вида $x^2 \pm Dy^2$, гдѣ D не дѣлится на квадратъ какого нибудь числа; опредѣленіемъ дѣлителей этихъ формъ мы теперь и займемся.

§ 47. Прежде чѣмъ покажемъ, какимъ образомъ изъ квадратичныхъ формъ дѣлителей могутъ быть выведены линейные дѣлители, мы докажемъ относительно формы $au^2 + 2buv + cv^2$ слѣдующія теоремы:

63. ТЕОРЕМА.

Если опредѣлитель формы $au^2 + 2buv + cv^2$ есть d , число недѣляющееся на квадратъ, то можно найти число α , для котораго $a + 2b\alpha + c\alpha^2$ будетъ число простое съ d .

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ ω общій наибольшій дѣлитель c и d ; число ω не будетъ заключать въ себѣ множителемъ никакого квадрата; ибо d не дѣлится на квадратъ. Но по значенію d мы имѣемъ $b^2 - ac = d$; откуда слѣдуетъ, что ω , общій дѣлитель c и d , дѣлитъ b^2 , и слѣд. по теоремѣ 6-й дѣлитъ b . Докажемъ же теперь, во 1-хъ) что можно всегда найти число α , для котораго выраженіе $\frac{c\alpha + b}{\omega}$ приводится къ числу про-

стому съ $\frac{d}{\omega}$, и во 2-хъ) что такое число α обращаетъ $a+2b\alpha+c\alpha^2$ въ число простое съ d .

Въ первомъ не трудно убѣдиться, замѣтивъ, что при дѣлимости b на ω , общій наибольшій дѣлитель c и d , по теоремѣ 19 можно найти число, удовлетворяющее сравненію

$$c\alpha + b \equiv \omega \pmod{d},$$

что предполагаетъ дѣлимость $c\alpha + b - \omega$ на d . Полагая же частное отъ дѣленія $c\alpha + b - \omega$ на d равнымъ N , будемъ имѣть

$$\frac{c\alpha + b - \omega}{d} = N;$$

откуда выходитъ

$$\frac{c\alpha + b}{\omega} = 1 + N \frac{d}{\omega},$$

что обнаруживаетъ въ $\frac{c\alpha + b}{\omega}$ число простое съ $\frac{d}{\omega}$.

Чтобы убѣдиться во второмъ, мы замѣчаемъ, что выраженіе $a+2b\alpha+c\alpha^2$ можетъ быть представлено такъ

$$\frac{\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2 - \frac{b^2 - ac}{\omega}}{\frac{c}{\omega}},$$

гдѣ замѣняя $b^2 - ac$ черезъ d , имѣемъ

$$\frac{\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2 - \frac{d}{\omega}}{\frac{c}{\omega}}.$$

Число же d разлагается на два множителя $\frac{d}{\omega}$ и ω , которые не могутъ имѣть общаго дѣлителя; ибо d не можетъ дѣлиться на квадратъ; притомъ $\frac{d}{\omega}$ по свойству числа α простое съ $\frac{c\alpha + b}{\omega}$. Отсюда слѣдуетъ, что ни ω , ни $\frac{d}{\omega}$ не могутъ имѣть общаго множителя съ $\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2 - \frac{d}{\omega}$; ибо простые числа, входящія въ составъ ω , дѣля $\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2$, не могутъ дѣлить $\frac{d}{\omega}$; напротивъ дѣлители $\frac{d}{\omega}$ не могутъ дѣлить $\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2$. Итакъ $\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2 - \frac{d}{\omega}$ и слѣд.

$$\frac{\omega \left(\frac{c\alpha + b}{\omega} \right)^2 - \frac{d}{\omega}}{\frac{c}{\omega}} = a + 2b\alpha + c\alpha^2$$

число простое съ ω и $\frac{d}{\omega}$, а потому и съ произведеніемъ ихъ d , что и слѣдовало доказать.

Для примѣра найдемъ число α , для котораго бы $3 + 2 \cdot 21\alpha + 217\alpha^2$ было число простое съ $21^2 - 3 \cdot 217 = -210$. Замѣчая, что общій наибольшій дѣлитель 217 и 210 есть 7, мы для опредѣленія α находимъ условіе, что $\frac{217\alpha + 21}{7}$, или $31\alpha + 3$ число простое съ $\frac{210}{7}$ или 30. Этому условію, какъ видѣли, можно всегда удовлетворить, рѣшая сравненіе

$$217\alpha + 21 \equiv 7 \pmod{210}.$$

Но въ этомъ случаѣ, какъ и въ большей части другихъ, мы можемъ легко найти α , пробуя различныя числа. Такъ находимъ, что $\alpha = -2$ обращаетъ $31\alpha + 3$ въ число простое съ 30. Слѣд. и выраженіе $3 + 2 \cdot 21\alpha + 217\alpha^2$ при $\alpha = -2$ будетъ число простое съ 210.

На основаніи доказанной нами теоремы для всякой формы $au^2 + 2buv + cv^2$ найдется число α , обращающее $a + 2b\alpha + c\alpha^2$ въ число простое съ опредѣлителемъ ея. Опредѣливши такое число, мы можемъ преобразовать форму $au^2 + 2buv + cv^2$ въ другую, гдѣ первый членъ будетъ имѣть коеффиціентомъ число простое съ опредѣлителемъ ея d . Этого мы достигнемъ всегда, дѣлая въ этой формѣ $v - \alpha u = U$, гдѣ α есть число, обращающее $a + 2b\alpha + c\alpha^2$ въ число простое съ d . Въ самомъ дѣлѣ, изъ этого уравненія найдемъ $v = \alpha u + U$, и внося эту величину въ форму $au^2 + 2buv + cv^2$, мы ее преобразуемъ въ такую

$$au^2 + 2b(\alpha u + U)u + c(\alpha u + U)^2,$$

что по раскрытіи скобокъ даетъ

$$(a + 2b\alpha + c\alpha^2)u^2 + 2(b + \alpha c)uU + cU^2,$$

гдѣ коеффиціентъ перваго члена есть $a + 2b\alpha + c\alpha^2$, число простое съ d по положенію.

Такъ чтобы сдѣлать въ формѣ $3u^2 + 2 \cdot 21uv + 217v^2$ первый коеффиціентъ числомъ простымъ съ опредѣлителемъ ея, ищемъ число α , которое бы обратило $3 + 2 \cdot 21\alpha + 217\alpha^2$ въ число простое съ 210. Этому условію, какъ видѣли,

удовлетворяетъ $\alpha = -2$. Поэтому для преобразованія формы $3u^2 + 2.21uv + 217v^2$ дѣлаемъ $v + 2u = U$, и на мѣсто v въ форму $3u^2 + 2.21uv + 217v$ вносимъ $U - 2u$. Это даетъ намъ

$$3u^2 + 2.21(U - 2u)u + 217(U - 2u)^2,$$

или

$$787u^2 - 826Uu + 217U^2.$$

Такимъ образомъ данная форма

$$3u^2 + 2.21uv + 217v^2$$

преобразовывается въ форму

$$787u^2 - 826uU + 217U^2.$$

Послѣдняя форма сложнѣе первой; но она имѣетъ ту выгоду, что въ ней коэффициентъ u^2 число простое съ опредѣлителемъ. Это послужитъ значительнымъ облегченіемъ при опредѣленіи линейныхъ дѣлителей, и теперь вездѣ мы будемъ предполагать квадратичныя формы преобразованными такъ, что въ нихъ первый коэффициентъ число простое съ опредѣлителемъ. Въ этомъ предположеніи мы докажемъ слѣдующія теоремы относительно квадратичныхъ формъ:

64. ТЕОРЕМА.

Если въ формѣ $au^2 + 2buv + cv^2$ число a простое съ опредѣлителемъ $b^2 - ac = d$, то можно найти число l , удовлетворяющее сравненію

$$au^2 + 2buv + cv^2 \equiv al^2 + 2bl + c \pmod{d}.$$

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ, при a простомъ съ d сравненіе

$$a (au^2 + 2buv + cv^2) \equiv a (al^2 + 2bl + c) \pmod{d}$$

можетъ быть сокращено на a ; вслѣдствіе чего оно приводится къ

$$au^2 + 2buv + cv^2 \equiv al^2 + 2bl + c \pmod{d},$$

которое хотимъ доказать. Но сравненіе

$$a (au^2 + 2buv + cv^2) \equiv a (al^2 + 2bl + c) \pmod{d}$$

можетъ быть такъ представлено:

$$(au + bv)^2 - (b^2 - ac) v^2 \equiv (al + b)^2 - (b^2 - ac) \pmod{d},$$

что по равенству $b^2 - ac^2$ съ модулемъ d приводится къ слѣдующему

$$(au + bv)^2 \equiv (al + b)^2 \pmod{d},$$

а это удовлетворяется, если

$$al + b \equiv au + bv \pmod{d}.$$

Но послѣднему сравненію мы всегда можемъ удовлетворить; ибо оно первой степени и a простое съ d ; откуда и выходитъ предложенная нами теорема.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что если при всѣхъ величинахъ l значенія $al^2 + 2bl + c$ по модулю d сравнимы съ числами

$$r_1, r_2, \dots, r_n;$$

то съ ними сравнимы также и всѣ значенія $au^2 + 2buv + cv^2$, и слѣд. всѣ числа, опредѣляемые этою формою будутъ одного изъ слѣдующихъ видовъ

$$md + r_1, md + r_2, \dots, md + r_n,$$

гдѣ m произвольное число. Что же касается до чиселъ $r_1, r_2, \dots, r_n$, съ которыми сравнимы по модулю d всѣ значенія $al^2 + 2al + c$; то мы ихъ найдемъ, опредѣляя числа, сравнимыя съ этимъ выраженіемъ при $l = 0, 1, 2, \dots, d - 1$; ибо съ этими значеніями $al^2 + 2bl + c$ по модулю d будутъ сравнимы всѣ другія.

Такъ для выраженія чиселъ, опредѣляемыхъ формою

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

найдемъ линейныя формы

$$md + r_1, md + r_2, \dots, md + r_n.$$

Но каждая изъ этихъ формъ приводится къ четыремъ, смотря по виду числа m . Такъ предполагая въ первой формѣ m равнымъ $4z, 4z + 1, 4z + 2, 4z + 3$, мы изъ нея выведемъ четыре

$$4dz + r_1, 4dz + d + r_1, 4dz + 2d + r_1, 4dz + 3d + r_1,$$

и ограничиваясь одними нечетными значеніями $au^2 + 2buv + cv^2$, посмотримъ, которыя изъ этихъ формъ должны быть выкинуты.

Начнемъ съ d нечетнаго. При d нечетномъ между числами $r_1, d + r_1, 2d + r_1, 3d + r_1$ будетъ два четныхъ и два нечетныхъ (см. теор. 10). Ограничиваясь однимъ нечетными значеніями $au^2 + 2buv + cv^2$, мы изъ четырехъ формъ

$$4dz + r_1, 4dz + d + r_1, 4dz + 2d + r_1, 4dz + 3d + r_1$$

выкинемъ двѣ, въ которыхъ члены не содержащіе z будутъ чет-

ные. Затѣмъ для выраженія нечетныхъ значеній $au^2 + 2buv + cv^2$ останутся двѣ формы, изъ которыхъ одна будетъ давать числа вида $4m + 1$, другая вида $4m + 3$ (см. § 44).

Изъ этихъ формъ мы оставимъ или одну только или обѣ, смотря потому даетъ ли форма $au^2 + 2buv + cv^2$ одни числа вида $4m + 1$ или одни числа вида $4m + 3$ или тѣ и другія вмѣстѣ. Но это узнаемъ мы, замѣчая, что относительно u и v можно сдѣлать четыре предположенія

$$\begin{array}{l|l|l|l} u = 2k & u = 2k + 1 & u = 2k + 1 & u = 2k \\ v = 2s & v = 2s & v = 2s + 1 & v = 2s + 1. \end{array}$$

Внеся же эти значенія u и v въ форму $au^2 + 2buv + cv^2$, находимъ результаты такого вида

$$4N, 4N_1 + a, 4N_2 + a + 2b + c, 4N_3 + c,$$

гдѣ называемъ черезъ $4N, 4N_1, 4N_2, 4N_3$ совокупность членовъ, имѣющихъ множителемъ 4.

Изъ этого видно, что если ни одно изъ чиселъ $a, c, a + 2b + c$ не есть вида $4m + 1$ или $4m + 3$, то форма $au^2 + 2buv + cv^2$ не даетъ чиселъ этого вида.

Обращаемся теперь къ случаю d четнаго.

При d четномъ всѣ числа $r_1, d + r_1, 2d + r_1, 3d + r_1$ или будутъ четныя или всѣ будутъ нечетныя. Въ первомъ случаѣ мы заключимъ, что форма $au^2 + 2buv + cv^2$ не даетъ чиселъ нечетныхъ; во второмъ же по виду чиселъ $r_1, d + r_1, 2d + r_1, 3d + r_1$ мы узнаемъ какого изъ четырехъ видовъ: $8m + 1, 8m + 3, 8m + 5, 8m + 7$ числа выражаются каждою изъ линейныхъ формъ $4dz + r_1, 4dz + d + r_1, 4dz + 2d + r_1, 4dz + 3d + r_1$, и мы увидимъ, которыя изъ нихъ должны быть выкинуты, опредѣливъ, какихъ изъ четырехъ видовъ $8m + 1, 8m + 3, 8m + 5, 8m + 7$ получаются числа изъ формы $au^2 + 2buv + cv^2$. Для этого мы замѣчаемъ, что относительно u и v можно сдѣлать только девять предположеній:

$$\begin{array}{l|l|l|l|l} u = 2k + 1 & u = 2k + 1 & u = 2k + 1 & u = 4k & u = 4k \\ v = 2s + 1 & v = 4s & v = 4s + 2 & v = 2s + 1 & v = 4s \\ u = 4k & u = 4k + 2 & u = 4k + 2 & u = 4k + 2 & \\ v = 4s + 2 & v = 2s + 1 & v = 4s + 2 & v = 4s & \end{array}$$

изъ которыхъ четыре

$$\begin{array}{l|l|l|l} u = 4k & u = 4k & u = 4k + 2 & u = 4k + 2 \\ v = 4s & v = 4s + 2 & v = 4s + 2 & v = 4s \end{array}$$

не должны имѣть мѣста; ибо въ нихъ значеніе $au^2 + 2buv + cv^2$ будетъ всегда число четное. Что же касается до остальныхъ предположеній, то дѣлая въ формѣ $au^2 + 2buv + cv^2$

$$\begin{array}{l|l|l|l|l|l} u = 2k + 1 & u = 2k + 1 & u = 2k + 1 & u = 4k + 2 & u = 4k \\ v = 2s + 1 & v = 4s & v = 4s + 2 & v = 2s + 1 & v = 2s + 1, \end{array}$$

мы находимъ результаты такого вида

$$8N + a \mp 2b + c, \quad 8N_1 + a, \quad 8N_2 + a + 4b + 4c, \\ 8N_3 + 4a + 4b + c, \quad 8N_4 + c,$$

гдѣ $8N, 8N_1, 8N_2, 8N_3, 8N_4$ означаетъ совокупность всѣхъ членовъ, имѣющихъ множителемъ 8; сюда же относятся члены $4(k^2 + k)$, $4(s^2 + s)$, которые на 8, очевидно, дѣлятся.

Отсюда слѣдуетъ, что числа, опредѣляемые формою

$$au^2 + 2buv + cv^2,$$

могутъ имѣть какой либо изъ видовъ $8m + 1, 8m + 3, 8m + 5, 8m + 7$ только тогда, когда этого вида есть число между $a, c, a \mp 2b + c, 4a + 4b + c, a + 4b + 4c$, и этимъ опредѣляется, которыя изъ четырехъ формъ

$$4dz + r_1, \quad 4dz + d + r_1, \quad 4dz + 2d + r_1, \quad 4dz + 3d + r_1$$

могутъ выражать нечетныя значенія $au^2 + 2buv + cv^2$ и которыя должны быть откинута.

Покажемъ это на примѣрѣ.

Мы видѣли, что всѣ нечетные дѣлители $x^2 + 26y^2$ представляются формами

$$u^2 + 26v^2, \quad 2u^2 + 13v^2, \quad 3u^2 + 2uv + 9v^2, \quad 5u^2 + 4uv + 6v^2.$$

Чтобы опредѣлить линейныя формы чиселъ, представляемыхъ первою, мы замѣчаемъ, что въ ней коэффициентъ u^2 не имѣетъ общаго дѣлителя съ опредѣлителемъ формы; поэтому къ ней можетъ быть приложена теорема 64. На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что всѣ значенія $u^2 + 26v^2$ по модулю 26 будутъ сравнимы съ тѣми же числами, съ которыми сравнимы значенія $l^2 + 26$ при $l = 0, 1, 2, \dots, 25$. Но наименьшія

числа, сравнимыя съ

$$0^2 + 26, 1^2 + 26, 2^2 + 26, \dots, 25^2 + 26$$

по модулю 26, мы находимъ въ остаткѣ, получаемомъ при дѣленіи этихъ чиселъ на 26. Опредѣляя эти остатки, находимъ, что всѣ они равны

$$0, 1, 4, 9, 16, 25, 10, 23, 12, 3, 22, 17, 14, 13.$$

Откуда заключаемъ, что съ этими числами по модулю 26 сравнимы и всѣ значенія $u^2 + 26v^2$, а потому эти значенія должны представляться формами

$$\begin{aligned} &26m + 0, 26m + 1, 26m + 4, 26m + 9, 26m + 16, \\ &26m + 25, 26m + 10, 26m + 23, 26m + 12, 26m + 3, \\ &26m + 22, 26m + 17, 26m + 14, 26m + 13. \end{aligned}$$

Но изъ нихъ только формы

$$\begin{aligned} &26m + 1, 26m + 9, 26m + 25, 26m + 23 \\ &26m + 3, 26m + 17 \end{aligned}$$

даютъ числа нечетныя и простыя съ 26; ихъ мы только и оставимъ. Дѣлая здѣсь $m = 4z$, $4z + 1$, $4z + 2$, $4z + 3$, мы выводимъ

$$\begin{aligned} &104z + 1, 104z + 27, 104z + 53, 104z + 79, \\ &104z + 9, 104z + 35, 104z + 61, 104z + 87, \\ &104z + 25, 104z + 51, 104z + 77, 104z + 103, \\ &104z + 23, 104z + 49, 104z + 75, 104z + 101, \\ &104z + 3, 104z + 29, 104z + 55, 104z + 81, \\ &104z + 17, 104z + 43, 104z + 69, 104z + 95. \end{aligned}$$

Но чтобы узнать, которыя изъ этихъ формъ должно оставить и которыя выкинуть, мы должны опредѣлить, какіе изъ четырехъ видовъ $8m + 1$, $8m + 3$, $8m + 5$, $8m + 7$ имѣютъ числа, получаемыя изъ формы $u^2 + 26v^2$. Мы видѣли, что вообще для формы $au^2 + 2buv + cv^2$ это опредѣляется видами чиселъ

$$a, c, a - 2b + c, 4a + 4b + c, a + 4b + 4c.$$

Отсюда для формы $u^2 + 26v^2$ выходитъ

$$1, 26, 1 + 26, 4 + 26, 1 + 4 \cdot 26.$$

Но здѣсь нѣтъ чиселъ вида $8m + 5$ и $8m + 7$. Слѣд. въ найденныхъ нами формахъ мы должны откинуть тѣ, которыя даютъ числа этого вида.

Такъ замѣчая, что 53, 61, 77, 29, 101, 69 суть вида $8m+5$, а числа 79, 87, 103, 55, 23, 95 вида $8m+7$, мы откидываемъ формы

$$\begin{aligned} 104z+53, & 104z+61, 104z+77, 104z+29, \\ 104z+101, & 104z+69, 104z+79, 104z+87, \\ 104z+103, & 104z+55, 104z+23, 104z+95, \end{aligned}$$

и у насъ остаются слѣдующія:

$$\begin{aligned} 104z+1, & 104z+27, 104z+9, 104z+35, \\ 104z+25, & 104z+51, 104z+49, 104z+75, 104z+3, \\ 104z+81, & 104z+17, 104z+43. \end{aligned}$$

Раскроемъ теперь линейныя формы чиселъ, опредѣляемыхъ квадратичною формою $2u^2+13v^2$. Но къ этой формѣ нельзя прямо приложить теорему 64; ибо въ ней коэффициентъ u^2 есть 2, число простое съ опредѣлителемъ—26.

Поэтому мы должны предварительно эту форму преобразовать по способу показанному нами выше. Для этого, замѣчая, что общій наибольшій дѣлитель 2 и 26 есть 2, мы ищемъ α , которое бы обратило $\frac{2x+0}{2}$, или α , въ число простое съ 13. Этому условію удовлетворяетъ 1, а потому для преобразованія формы $2u^2+13v^2$ вносимъ въ нее $U+u$ на мѣсто v , черезъ что она обращается въ слѣдующую

$$15u^2+26uU+13U^2.$$

Получивъ такимъ образомъ форму, въ которой первый коэффициентъ число простое съ опредѣлителемъ—26, мы на основаніи теоремы 64 заключаемъ, что ея значенія по модулю 26 будутъ сравнимы съ остатками, получаемыми при дѣленіи $15.0^2+26.0+13$, $15.1^2+26.1+13$, ..., $15.25^2+26.25+13$ на 26.

Но эти остатки мы находимъ равными числамъ

$$13, 2, 21, 18, 19, 24, 7, 20, 11, 6, 5, 8, 15, 0;$$

слѣд. по модулю 26 сравнимы съ ними всѣ значенія $15u^2+26uU+13U^2$, а потому они могутъ быть представлены формами

$$\begin{aligned} 26m+13, & 26m+2, 26m+21, 26m+18, \\ 26m+19, & 26m+24, 26m+7, 26m+20, 26m+11, \\ 26m+6, & 26m+5, 26m+8, 26m+15, 26m+0. \end{aligned}$$

Но изъ этихъ формъ только

$26m+21$, $26m+19$, $26m+7$, $26m+11$, $26m+5$, $26m+15$
даютъ числа нечетныя и простыя съ опредѣлителемъ—26; ихъ
мы только и оставляемъ. Дѣлая здѣсь $m=4z$, $4z+1$, $4z+2$,
 $4z+3$, мы изъ этихъ формъ выводимъ

$$\begin{aligned} &104z+21, 104z+47, 104z+73, 104z+99, \\ &104z+19, 104z+45, 104z+71, 104z+97, \\ &104z+7, 104z+33, 104z+59, 104z+85, \\ &104z+11, 104z+37, 104z+63, 104z+89, \\ &104z+5, 104z+31, 104z+57, 104z+83, \\ &104z+15, 104z+41, 104z+67, 104z+93. \end{aligned}$$

Но числа, выражаемыя формою

$$15u^2+26uU+13U^2,$$

не могутъ быть вида $8m+1$ и $8m+3$; ибо ни одно изъ чиселъ

$$15, 13, 15-26+13, 4.15+2.26+13, 15+2.26+4.13$$

не есть этого вида. Поэтому изъ найденныхъ линейныхъ формъ
мы должны выкинуть всѣ, которыя даютъ числа или вида $8m+1$
или $8m+3$.

Затѣмъ для выраженія чиселъ нечетныхъ и простыхъ съ
опредѣлителемъ, получаемыхъ изъ формы $15u^2+26uU+13U^2$,
остаются

$$\begin{aligned} &104z+21, 104z+47, 104z+45, 104z+71, \\ &104z+7, 104z+85, 104z+37, 104z+63, \\ &104z+5, 104z+31, 104z+15, 104z+93. \end{aligned}$$

Чтобы найти всѣ линейные дѣлители x^2+26y^2 намъ остается
найти линейныя формы для выраженія чиселъ, опредѣляемыхъ
формами

$$3u^2+2uv+9v^2, 5u^2+4uv+6v^2.$$

Но при этомъ мы находимъ для формы $3u^2+2uv+9v^2$ тѣ
же линейныя формы, какія нашли для u^2+26v^2 , а для формы
 $5u^2+4uv+6v^2$ тѣ же, какія нашли для $2u^2+13v^2$.

И такъ всѣ нечетные дѣлители формы x^2+26y^2 , простые
съ 26, опредѣляются слѣдующими формами

104z+1, 104z+3, 104z+5, 104z+7,
 104z+9, 104z+15, 104z+17, 104z+21,
 104z+25, 104z+27, 104z+31, 104z+35,
 104z+37, 104z+43, 104z+45, 104z+47,
 104z+49, 104z+51, 104z+63, 104z+71,
 104z+75, 104z+81, 104z+85, 104z+93.

Такъ съ помощію квадратичныхъ формъ могутъ быть опре-
 дѣлены линейные дѣлители $x^2 \pm Dy^2$, будетъ ли D число простое
 или составное. Но чтобы при опредѣленіи ихъ не дѣлать лиш-
 нихъ выкладокъ, мы покажемъ теперь средство узнавать, что
 двѣ квадратичныя формы дѣлителей $x^2 \pm Dy^2$ приводятся къ
 однимъ линейнымъ формамъ, какъ въ предыдущемъ примѣры
 u^2+26v^2 и $3u^2+2uv+9v^2$, $2u^2+13v^2$ и $5u^2+4u^2v+6v^2$.

Для этого мы докажемъ слѣдующую теорему:

65. ТЕОРЕМА.

*Если $au^2+2buv+cv^2$, $a_1 U^2+2b_1 UV+c_1 V^2$ суть квадра-
 тичныя формы дѣлителей x^2-dy^2 , и a , a_1 числа простые съ d ;
 притомъ $a_1 \equiv al^2+2bl+c \pmod{d}$, гдѣ l какое нибудь число; то
 можно найти x , удовлетворяющій сравненію*

$$a_1 x^2 + 2b_1 x + c_1 \equiv a\alpha^2 + 2b\alpha + c \pmod{d}.$$

Доказательство. Въ самомъ дѣлѣ при a и a_1 простыхъ съ
 d сравненіе

$$a^2 a_1 (a_1 x^2 + 2b_1 x + c_1) \equiv a^2 a_1 (a\alpha^2 + 2b\alpha + c) \pmod{d}$$

можетъ быть сокращено на $a^2 a_1$ и такимъ образомъ оно при-
 водится къ

$$a_1 x^2 + 2b_1 x + c_1 \equiv a\alpha^2 + 2b\alpha + c \pmod{d},$$

котораго возможность имѣемъ въ виду доказать. Но сравненіе

$$a^2 a_1 (a_1 x + 2b_1 x + c_1) \equiv a^2 a_1 (a\alpha^2 + 2b\alpha + c) \pmod{d}$$

можетъ быть такъ представлено:

$$(aa_1 x + ab_1)^2 - a^2 (b_1^2 - a_1 c_1) \equiv aa_1 (a\alpha + b)^2 - aa_1 (b^2 - ac) \pmod{d},$$

гдѣ $b_1^2 - a_1 c_1$, $b^2 - ac$ равны d ; ибо по положенію

$$a_1 U^2 + 2b_1 UV + c_1 V^2, \quad au^2 + 2buv + cv^2$$

суть квадратичныя формы дѣлителей $x^2 - dy^2$ (см. теор. 60).

Вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе приводится къ такому

$$(aa_1x + ab_1)^2 \equiv aa_1(a\alpha + b)^2 \pmod{d}.$$

Это же сравненіе удовлетворяется, если

$$aa_1x + ab_1 \equiv (a\alpha + b)(a\ell + b) \pmod{d}.$$

Чтобы убѣдиться въ этомъ замѣтимъ, что для этой величины $aa_1x + ab_1$ оно приводится къ

$$(a\alpha + b)^2(a\ell + b)^2 \equiv aa_1(a\alpha + b)^2 \pmod{d}.$$

Но $(a\ell + b)^2$ сравнимо съ aa_1 по модулю d ; ибо по положенію

$$a_1 \equiv a\ell^2 + 2b\ell + c \pmod{d};$$

откуда выходитъ

$$aa_1 \equiv a(a\ell^2 + 2b\ell + c) \pmod{d},$$

или

$$aa_1 \equiv (a\ell + b)^2 - (b^2 - ac) \pmod{d},$$

и слѣд. $aa_1 \equiv (a\ell + b)^2$, потому что $b^2 - ac$ есть d .

Итакъ, чтобы удовлетворить сравненію

$$a_1x^2 + 2b_1x + c_1 \equiv a\alpha^2 + 2b\alpha + c \pmod{d}$$

необходимо только найти x , для котораго

$$aa_1x + ab_1 \equiv (a\alpha + b)(a\ell + b) \pmod{d},$$

что не представляетъ ни какой трудности; ибо здѣсь x въ первой степени и коэффициентъ его aa_1 число простое съ модулемъ d .

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

На основаніи ея и теоремы 63-й мы заключаемъ, что если a_1 будетъ сравнимо по модулю d съ какимъ либо значеніемъ $a\ell^2 + 2a\ell + c$, то числа, опредѣляемыя формамя

$$au^2 + 2buv + cv^2, \quad a_1U^2 + 2b_1UV + c_1V^2,$$

будутъ сравнимы съ одними и тѣми же числами; а потому какъ для той, такъ и для другой линейныя формы вида $m\ell + r$ будутъ однѣ и тѣже.

Что же касается до формъ вида $4md + r$, то мы ихъ легко выведемъ изъ формъ вида $m\ell + r$, и на основаніи показаннаго нами способа выводять эти формы видно, что онѣ для $au^2 + 2buv + cv^2$ и $a_1U^2 + 2b_1UV + c_1V^2$ будутъ различныя или одинакія, смотря по виду чиселъ $a, c, a + 2b + c, a_1, c_1, a_1 + 2b_1 + c_1$ при d нечетномъ и по виду чиселъ $a, c, a \mp 2b + c, 4a + 4b + c,$

$a+4b+4c$, a_1 , c_1 , $a_1-2b_1+c_1$, $4a_1+4b_1+c_1$, $a_1+4b_1+4c_1$ при d четномъ. Этимъ мы оканчиваемъ теорію дѣлителей $x^2\pm dy^2$. Въ концѣ книги помѣщены таблицы линейныхъ дѣлителей формы $x^2\pm dy^2$ для всѣхъ значеній d , не дѣлящихся на квадратъ, отъ $d=1$ до $d=101$. Эти таблицы имѣютъ весьма важныя приложенія, какъ мы увидимъ въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА VIII.

Приложеніе теоріи сравненій къ разложенію чиселъ на простые множители.

§ 48. Въ заключеніе Теоріи сравненій, мы покажемъ какимъ образомъ, на основаніи ея, можетъ быть упрощено разложеніе чиселъ на простые множители.

Извѣстно, что для разложенія числа A на простые множители мы должны отыскать наименьшее простое число, которое дѣлитъ A ; если это число есть α , то дѣлить A на α и искать наименьшее простое число, которое дѣлитъ $\frac{A}{\alpha}$; если это число есть β , то искать наименьшаго дѣлителя $\frac{A}{\alpha\beta}$; и продолжать это до тѣхъ поръ, пока дойдемъ до частнаго, которое не дѣлится на всѣ простыя числа, не превосходящія его квадратнаго корня. Это частное будетъ число простое, и произведеніе его на $\alpha.\beta\ldots$ будетъ искомое разложеніе числа A . Такимъ образомъ разложеніе чиселъ на простые множители приводится къ изслѣдованіямъ, что данное число имѣетъ-ли дѣлителей или нѣтъ, и если имѣетъ, то какой наименьшій изъ нихъ. Но эти изслѣдованія представляють большія трудности для чиселъ значительныхъ. Такъ на началахъ Ариметики наименьшаго дѣлителя числа N мы должны искать между всѣми простыми числами, меньшими $\sqrt{N}$, пробуя на нихъ дѣлить N . Но такихъ чиселъ будетъ много, если N велико, и намъ не рѣдко придется испытать значительную часть ихъ, прежде чѣмъ попадемъ на дѣлителя N . Еще болѣе трудности

встрѣчаемъ при N простомъ; въ этомъ случаѣ мы должны будемъ испытать дѣлимость N на всѣ простыя числа до $\sqrt{N}$. Такъ на началахъ Арифметики изслѣдованіе состава какого нибудь числа, превосходящаго 1000000, потребуетъ не рѣдко болѣе 160 дѣленій; ибо чиселъ простыхъ меньшихъ $\sqrt{1000000}$, или 1000, находимъ 168. На основаніи Теоріи сравненій эти изысканія значительно облегчаются; мы можемъ по виду даннаго числа опредѣлить видъ всѣхъ возможныхъ дѣлителей его, и намъ останется только испытать числа этого вида.

§ 49. Мы начнемъ съ частнаго случая, особенно замѣчательнаго, и покажемъ, какъ могутъ быть опредѣлены формы дѣлителей чиселъ вида $a^m \pm 1$, для которыхъ, на основаніи теоремъ V-й главы, не трудно доказать слѣдующее:

66. ТЕОРЕМА.

Если p простое нечетное число и дѣлитъ $a^m - 1$; то p можетъ быть выражено формою $\omega z + 1$, гдѣ ω дѣлитель m (включая сюда и 1), z число простое съ $\frac{m}{\omega}$; притомъ p должно дѣлить $a^\omega - 1$.

Доказательство. Если ω есть общій наибольшій дѣлитель $p - 1$ и m ; то числа $\frac{p-1}{\omega}$, $\frac{m}{\omega}$ цѣлыя и простыя между собою. Полагая первое изъ нихъ равнымъ z , будемъ имѣть

$$\frac{p-1}{\omega} = z;$$

откуда $p = \omega z + 1$.

Намъ остается теперь доказать, что p будетъ дѣлить $a^\omega - 1$. Для этого мы замѣчаемъ, что дѣлимость $a^m - 1$ на p выражается сравненіемъ

$$a^m - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

которое по теоремѣ 36-й при $p - 1$ и m имѣющихъ общимъ наибольшимъ дѣлителемъ ω предполагаетъ

$$a^\omega - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

и слѣд. дѣлимость $a^\omega - 1$ на p , что и слѣдовало доказать.

Изъ этой теоремы легко вывести слѣдующую:

67. ТЕОРЕМА.

Если $2n+1$ число простое, то простые нечетные делители $a^{2n+1}-1$ должны быть вида $2(2n+1)z+1$ или делить $a-1$; притомъ они должны быть делителями формы x^2-ay^2 .

Доказательство. Если p нечетное число; то оно можетъ быть такъ представлено $2N+1$. Но эта форма при дѣлимости N на $2n+1$ приводится къ такой $2(2n+1)z+1$. Въ томъ же случаѣ, когда N не дѣлится на простое число $2n+1$, число $2N$ будетъ простое съ $2n+1$. Но если p дѣлится $a^{2n+1}-1$ и выражается черезъ $2N+1$, гдѣ $2N$ простое съ $2n+1$; то по предыдущей теоремѣ оно должно дѣлить $a-1$. Итакъ p должно быть вида $2(2n+1)z+1$ или дѣлить $a-1$.

Докажемъ же теперь, что p должно быть дѣлителемъ формы x^2-ay^2 . Въ этомъ не трудно убѣдиться: p дѣлится $a^{2n+1}-1$, и слѣд. дѣлится $a(a^{2n+1}-1)$, а это приводится къ $(a^{n+1})^2-a$, выраженію вида x^2-ay^2 .

Замѣчая, что при $a=2$ никакое число не дѣлится $a-1$; дѣлители же x^2-ay^2 по 56-й теоремѣ должны быть одного изъ двухъ видовъ: $8m+1$ или $8m-1$, мы на основаніи доказаннаго нами заключаемъ, что всѣ простые дѣлители $2^{2n+1}-1$ при $2n+1$ простомъ должны быть вида $2(2n+1)z+1$, и въ тоже время должны быть одного изъ двухъ видовъ: $8m+1$ или $8m-1$. Опредѣливши такимъ образомъ видъ дѣлителей числа $2^{2n+1}-1$, не трудно найти ихъ во всякомъ частномъ случаѣ, или убѣдиться въ отсутствіи ихъ.

Для примѣра возьмемъ число $2^{23}-1$, равное 8388607. Такъ какъ 23 число простое, то дѣлители $2^{23}-1$ должны быть вида $46z+1$ и въ тоже время одного изъ двухъ видовъ: $8m+1$ или $8m-1$. Чтобы соединить эти два свойства, мы замѣчаемъ, что z можетъ быть одного изъ четырехъ видовъ

$$4x, 4x+1, 4x+2, 4x+3.$$

Для этихъ значеній z форма $46z+1$ приводится къ такимъ четыремъ

$$184z+1, 184z+47, 184z+93, 184z+139,$$

изъ которыхъ послѣднія двѣ не даютъ чиселъ вида $8m + 1$ и $8m - 1$. Слѣд. для дѣлителей числа 8388607 возможны только двѣ формы

$$184z + 1, 184z + 47.$$

На основаніи ихъ не трудно показать всѣ простыя числа, между которыми должно искать дѣлителей 8388607. Для этого ограничиваясь дѣлителями, не превосходящими $\sqrt{8388607}$, мы опредѣляемъ значенія

$$184x + 1, 184x + 47$$

при $x = 0, 1, 2, \dots, 15$. Между ними находимъ слѣдующія простыя числа 599, 967, 1151, 1289, 1657, 2393.

Но дѣля на нихъ 8388607, мы замѣчаемъ, что ни одно изъ нихъ не дѣлитъ 8388607; откуда заключаемъ, что 8388607 число простое.

Такимъ же образомъ Ейлеръ нашелъ, что

$$2^{31} - 1 = 2147483647$$

есть число простое, и это есть самое большое простое число, доселѣ извѣстное.

Подобнымъ образомъ на основаніи доказанныхъ нами теоремъ легко изслѣдовать составъ всякаго числа, опредѣляемаго формулою $a^m - 1$.

Переходимъ теперь къ числамъ вида $a^m + 1$, и относительно ихъ дѣлителей докажемъ слѣдующую теорему:

68. ТЕОРЕМА.

Если p простое нечетное число и дѣлитъ $a^m + 1$, то p можетъ быть такъ представлено: $2\omega z + 1$, гдѣ ω дѣлитель m (не исключая 1), который въ частномъ $\frac{m}{\omega}$ даетъ число нечетное, z число простое съ $\frac{m}{\omega}$, притомъ p должно дѣлить $a^\omega + 1$.

Доказательство. Дѣлимость $a^m + 1$ на p выражается сравненіемъ

$$a^m + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

которое по 40-й теоремѣ предполагаетъ

$$a^\omega + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

гдѣ ω общій наибольшій дѣлитель m и $p-1$, который въ частномъ $\frac{p-1}{\omega}$ долженъ дать число четное. Полагая это частное равнымъ $2z$, найдемъ

$$\frac{p-1}{\omega} = 2z;$$

и слѣдовательно

$$p = 2\omega z + 1.$$

Но нетрудно убѣдиться, что здѣсь z число простое съ $\frac{m}{\omega}$, и частное $\frac{m}{\omega}$ число нечетное. Въ самомъ дѣлѣ, число ω , будучи общимъ наибольшимъ дѣлителемъ $p-1$ и m , въ частныхъ $\frac{p-1}{\omega}$, $\frac{m}{\omega}$ должно дать числа простые между собою. Но первое есть $2z$, и оно не иначе можетъ быть простымъ съ $\frac{m}{\omega}$, какъ при недѣлимости $\frac{m}{\omega}$ на 2, и отсутствіи общихъ дѣлителей въ $\frac{m}{\omega}$ и z .

Намъ остается доказать, что p долженъ дѣлить $a^\omega + 1$; но это слѣдуетъ изъ сравненія

$$a^\omega + 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

которое мы вывели выше.

Изъ этой теоремы, какъ частный случай, выходятъ такіа:

69. ТЕОРЕМА.

Простые нечетные дѣлители числа $a^{2n+1} + 1$ при $2n + 1$ простымъ должны быть вида $2(2n+1)z + 1$ или дѣлить $a + 1$.

Доказательство. Если p нечетное число, то оно можетъ быть такъ представлено $2N + 1$. Но эта форма при дѣлимости N на $2n + 1$ приводится къ $2(2n + 1)z + 1$. Въ томъ же случаѣ, когда N не дѣлится на простое число $2n + 1$, число N простое съ $2n + 1$, и дѣлимость $a^{2n+1} + 1$ на $p = 2N + 1$, по предыдущей теоремѣ, предполагаетъ дѣлимость $a + 1$ на это число, что и слѣдовало доказать.

70. ТЕОРЕМА.

Всѣ нечетные дѣлители числа $2^{2^n} + 1$ должны быть вида $2 \cdot 2^n + 1$.

Доказательство. По теоремѣ 68-й всѣ нечетные дѣлители $2^{2^n} + 1$ могутъ быть такъ представлены

$$2. \omega z + 1,$$

гдѣ ω есть дѣлитель 2^n , который въ частномъ $\frac{2^n}{\omega}$ даетъ число нечетное. Но этому условію удовлетворяетъ только $\omega = 2^n$, слѣд. всѣ нечетные дѣлители $2^{2^n} + 1$ должны представляться такъ

$$2. 2^n z + 1,$$

что и слѣдовало доказать. На основаніи трехъ послѣднихъ теоремъ легко найти дѣлителей числа, имѣющаго видъ $a^m + 1$, или убѣдиться, что оно не имѣетъ дѣлителей.

Для примѣра возьмемъ числа 65537 и 4294967297, изъ которыхъ первое равно $2^{2^4} + 1$; второе равно $2^{2^5} + 1$.

По послѣдней изъ доказанныхъ нами теоремъ дѣлители 65537 должны быть вида $32z + 1$. Дѣлая здѣсь $z = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, мы находимъ, что всѣ числа этого вида и меньшія $\sqrt{65537}$ суть 33, 65, 97, 129, 161, 193, 225.

Но изъ нихъ только 97 и 193 числа простые, и такъ какъ эти числа не дѣлятъ 65537, то мы заключаемъ, что 65537 есть число простое.

По той же теоремѣ для дѣлителей числа 4294967297 имѣемъ форму $64z + 1$. Дѣлая здѣсь $z = 1, 2, \dots, 1023$, мы найдемъ всѣ числа этого вида и меньшія $\sqrt{4294967297}$. Между этими числами мы находимъ такіа простые

$$193, 257, 449, 577, 641, \dots$$

Дѣлая на нихъ 4294967297, мы замѣчаемъ, что это число дѣлится на 641.

Этотъ примѣръ особенно замѣчателенъ тѣмъ, что онъ опровергаетъ мнѣніе Фермата, будто бы всѣ числа вида $2^{2^n} + 1$ суть простые.

§ 50. Мы видѣли, какимъ образомъ теорія двучленныхъ сравненій облегчаетъ изслѣдованія состава чиселъ, подходящихъ подъ форму $a^m \pm 1$. Теперь покажемъ, какимъ образомъ для всякаго числа A можетъ быть найдено множество формъ вида $x^2 \pm ay^2$ съ незначительными величинами a , которыя будутъ вы-

ражать или данное число A , или кратное его. Во всякомъ случаѣ, будутъ ли эти формы выражать A , или кратное A , дѣлители A будутъ дѣлителями этихъ формъ, и слѣд. видъ ихъ опредѣлится по способамъ показаннымъ въ предыдущей главѣ, или найдется изъ нашихъ таблицъ дѣлителей $x^2 \pm ay^2$, если a не превосходить 101.

Какое бы ни было число A , или кратное его kA , можно всегда выразить его формою вида $x^2 \pm ay^2$. Такъ принимая за x какое нибудь число, за y наибольшее число, квадратъ котораго дѣлитъ разность $A - x^2$, и полагая частное $\frac{A - x^2}{y^2}$ равнымъ a , будемъ имѣть

$$\frac{A - x^2}{y^2} = a;$$

откуда получаемъ для A такое выраженіе

$$A = x^2 + ay^2.$$

Подобнымъ образомъ могутъ быть выражены $2A, 3A, \dots$. Всѣ полученные такимъ образомъ формы будутъ служить для опредѣленія дѣлителей A . Но изъ нихъ наиболѣе выгодны тѣ, въ которыхъ a имѣетъ незначительную величину; ибо, какъ можно было замѣтить въ теоріи дѣлителей квадратичныхъ формъ, чѣмъ меньше a , тѣмъ проще формы дѣлителей $x^2 \pm ay^2$. Поэтому изъ всѣхъ возможныхъ выраженій A , или кратнаго A , формами вида $x^2 \pm ay^2$ мы должны выбрать тѣ, въ которыхъ a незначительное число. Для нѣкоторыхъ чиселъ эти формы легко могутъ быть найдены непосредственно. Такъ не трудно замѣтить, что $10001 = 100^2 + 1$, $3.3337 = 100^2 + 11$, и т. п. Но вообще такія формы могутъ быть найдены на основаніи слѣдующей теоремы:

71. ТЕОРЕМА.

Если $d_0, d_1, d_2, \dots$ есть рядъ чиселъ, въ которомъ каждый членъ d_{n+1} по двумъ предыдущимъ опредѣляется уравненіемъ

*$\sqrt{A - d_{n+1}d_n} = d_n E \frac{\sqrt{A - d_n d_{n-1}} + \sqrt{A}}{d_n} - \sqrt{A - d_n d_{n-1}}$; *)*
первые же два суть 1, $A - (E\sqrt{A})^2$; то всякая изъ формъ

*) Знакомъ E мы означаемъ здѣсь тоже, что въ § 26.

$x^2 - Dy^2$, где D равно

$$(-1)^{\alpha+\beta+\gamma} \dots d_{\alpha} \cdot d_{\beta} \cdot d_{\gamma} \dots$$

способна выразить A или кратное A .

Доказательство. Прежде чѣмъ приступимъ къ этому доказательству, замѣтимъ, что ряды

$$d_0, d_1, d_2, \dots, \sqrt{A - d_1 d_0}, \sqrt{A - d_2 d_1}, \sqrt{A - d_3 d_2}, \dots$$

состоятъ изъ чиселъ цѣлыхъ.

По положенію $d_0 = 1$, $d_1 = A - (E\sqrt{A})^2$; отсюда слѣдуетъ, что $d_0, d_1, \sqrt{A - d_1 d_0}$ суть числа цѣлыя. Но если эти количества суть числа цѣлыя; то и всѣ остальные, заключающіяся въ рядахъ

$$d_0, d_1, d_2, \dots, \sqrt{A - d_1 d_0}, \sqrt{A - d_2 d_1}, \sqrt{A - d_3 d_2}, \dots$$

не могутъ имѣть значеній дробныхъ или ирраціональных; ибо по уравненію

$$\sqrt{A - d_{n+1} d_n} = d_n E^{\frac{\sqrt{A - d_n d_{n-1}} + \sqrt{A}}{d_n}} - \sqrt{A - d_n d_{n-1}},$$

изъ котораго выходитъ также

$$d_{n+1} = d_{n-1} + 2 \sqrt{A - d_n d_{n-1}} E^{\frac{\sqrt{A - d_n d_{n-1}} + \sqrt{A}}{d_n}} - d_n \left[E^{\frac{\sqrt{A - d_n d_{n-1}} + \sqrt{A}}{d_n}} \right]^2,$$

количества $d_{n+1}, \sqrt{A - d_n d_{n+1}}$ не могутъ имѣть значеній дробныхъ или ирраціональных, если $d_{n-1}, d_n, \sqrt{A - d_n d_{n-1}}$ суть числа цѣлыя.

На основаніи этого, зная, что $d_0, d_1, \sqrt{A - d_0 d_1}$ числа цѣлыя, мы заключаемъ, что $d_2, \sqrt{A - d_1 d_2}$ имѣютъ значенія цѣлыя; зная, что $d_1, d_2, \sqrt{A - d_1 d_2}$ имѣютъ значенія цѣлыя, заключаемъ, что $d_3, \sqrt{A - d_2 d_3}$ числа цѣлыя, и т. д.

Приступимъ теперь къ доказательству предложенной нами теоремы, и изобразимъ буквами $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-2}, x_{n-1}$ значенія $\sqrt{A - d_1 d_0}, \sqrt{A - d_2 d_1}, \sqrt{A - d_3 d_2}, \dots, \sqrt{A - d_{n-1} d_{n-2}}, \sqrt{A - d_n d_{n-1}}$,

которыя, какъ видѣли, всѣ суть числа цѣлыя. Имѣя такимъ об-

разомъ

$$\begin{aligned}\sqrt{A - d_1 d_0} &= x_0, \\ \sqrt{A - d_2 d_1} &= x_1, \\ \sqrt{A - d_3 d_2} &= x_2, \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ \sqrt{A - d_{n-1} d_{n-2}} &= x_{n-2}, \\ \sqrt{A - d_n d_{n-1}} &= x_{n-1},\end{aligned}$$

мы изъ этихъ уравненій выводимъ

$$\begin{aligned}x_0^2 - A &= -d_1 d_0, \\ x_1^2 - A &= -d_2 d_1, \\ x_2^2 - A &= -d_3 d_2, \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ x_{n-2}^2 - A &= -d_{n-1} d_{n-2}, \\ x_{n-1}^2 - A &= -d_n d_{n-1},\end{aligned}$$

которыя иначе напишутся такъ

$$\begin{aligned}(x_0 + \sqrt{A})(x_0 - \sqrt{A}) &= -d_1 d_0, \\ (x_1 + \sqrt{A})(x_1 - \sqrt{A}) &= -d_2 d_1, \\ (x_2 + \sqrt{A})(x_2 - \sqrt{A}) &= -d_3 d_2, \\ &\dots\dots\dots \\ &\dots\dots\dots \\ (x_{n-2} + \sqrt{A})(x_{n-2} - \sqrt{A}) &= -d_{n-1} d_{n-2}, \\ (x_{n-1} + \sqrt{A})(x_{n-1} - \sqrt{A}) &= -d_n d_{n-1}.\end{aligned}$$

Перемножая всё эти уравненія между собою, находимъ

$$\begin{aligned}(x_0 + \sqrt{A})(x_1 + \sqrt{A})(x_2 + \sqrt{A}) \dots (x_{n-2} + \sqrt{A})(x_{n-1} + \sqrt{A}) \times \\ (x_0 - \sqrt{A})(x_1 - \sqrt{A})(x_2 - \sqrt{A}) \dots (x_{n-2} - \sqrt{A})(x_{n-1} - \sqrt{A}) = \\ (-1)^n d_0 d_1^2 d_2^2 \dots d_{n-1}^2 d_n.\end{aligned}$$

Но перемножая между собою выраженія

$$x_0 \pm \sqrt{A}, x_1 \pm \sqrt{A}, x_2 \pm \sqrt{A}, \dots, x_{n-2} \pm \sqrt{A}, x_{n-1} \pm \sqrt{A},$$

мы находимъ произведеніе такого вида $X_n \pm Y_n \sqrt{A}$, гдѣ X_n и Y_n числа цѣлыя.

Вслѣдствіе этого предыдущее уравненіе приводится къ такому

$$(X_n + Y_n \sqrt{A}) (X_n - Y_n \sqrt{A}) = (-1)^n d_0 d_1^2 d_2^2 \dots d_{n-1}^2 d_n.$$

Полагая же здѣсь $d_1 d_2 \dots d_{n-1} = Z_n$, и замѣчая, что $d_0 = 1$, мы находимъ

$$(X_n + Y_n \sqrt{A}) (X_n - Y_n \sqrt{A}) = (-1)^n Z_n^2 d_n.$$

Такое уравненіе мы найдемъ для всякаго значенія n . Дѣлая здѣсь $n = \alpha$, $n = \beta$, $n = \gamma, \dots$, мы будемъ имѣть

$$(X_\alpha + Y_\alpha \sqrt{A}) (X_\alpha - Y_\alpha \sqrt{A}) = (-1)^\alpha Z_\alpha^2 d_\alpha,$$

$$(X_\beta + Y_\beta \sqrt{A}) (X_\beta - Y_\beta \sqrt{A}) = (-1)^\beta Z_\beta^2 d_\beta,$$

$$(X_\gamma + Y_\gamma \sqrt{A}) (X_\gamma - Y_\gamma \sqrt{A}) = (-1)^\gamma Z_\gamma^2 d_\gamma,$$

.....

и эти уравненія по перемноженіи дадутъ

$$(X_\alpha + Y_\alpha \sqrt{A}) (X_\beta + Y_\beta \sqrt{A}) (X_\gamma + Y_\gamma \sqrt{A}) \dots \times \\ (X_\alpha - Y_\alpha \sqrt{A}) (X_\beta - Y_\beta \sqrt{A}) (X_\gamma - Y_\gamma \sqrt{A}) \dots = \\ (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\dots} \dots Z_\alpha^2 Z_\beta^2 Z_\gamma^2 \dots d_\alpha d_\beta d_\gamma \dots$$

Но перемножая между собою выраженія

$$X_\alpha \pm Y_\alpha \sqrt{A}, X_\beta \pm Y_\beta \sqrt{A}, X_\gamma \pm Y_\gamma \sqrt{A}, \dots,$$

мы находимъ произведеніе такого вида $X \pm Y \sqrt{A}$, гдѣ X , Y числа цѣлыя. Вслѣдствіе чего предыдущее уравненіе приводится къ такому

$$(X + Y \sqrt{A}) (X - Y \sqrt{A}) = (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\dots} Z_\alpha^2 Z_\beta^2 Z_\gamma^2 \dots d_\alpha d_\beta d_\gamma \dots,$$

а это по раскрытіи скобокъ даетъ

$$X^2 - Y^2 A = (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\dots} Z_\alpha^2 Z_\beta^2 Z_\gamma^2 \dots d_\alpha d_\beta d_\gamma \dots,$$

$$\text{или } X^2 - (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\dots} d_\alpha d_\beta d_\gamma \dots (Z_\alpha Z_\beta Z_\gamma \dots)^2 = A Y^2.$$

Откуда видимъ, что форма

$$x^2 - ay^2$$

при $a = (-1)^{\alpha+\beta+\gamma+\dots} d_\alpha d_\beta d_\gamma \dots$ будетъ выражать число кратное A , если x примемъ равнымъ X , и y равнымъ $Z_\alpha Z_\beta Z_\gamma \dots$, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы, опредѣливши числа

$$d_0, d_1, d_2, \dots$$

мы найдемъ множество формъ вида $x^2 \pm ay^2$, которыя будутъ способны выразить кратныя A .

Въ этихъ формахъ a опредѣляется произведеніемъ какихъ-либо изъ чиселъ

$$d_0, d_1, d_2, \dots,$$

и между различными сочетаніями этихъ чиселъ мы выберемъ такія, которыхъ бы произведеніе привелось къ точному квадрату съ незначительнымъ множителемъ. Принимая такія произведенія для опредѣленія a въ формѣ $x^2 \pm ay^2$, и выкидывая изъ состава a точные квадраты по § 46, мы получимъ формы съ незначительными коэффициентами, и эти то формы, на основаніи сказаннаго нами, послужатъ для опредѣленія дѣлителей A *). Если бы мы не нашли такимъ образомъ достаточнаго числа различныхъ формъ; то мы бы стали по предыдущей теоремѣ искать формы, выражающія кратныя $2A, 3A, 4A, \dots$ и между ними выбрали бы удобныя для опредѣленія дѣлителей A .

Для примѣра возьмемъ число 8520191. Не останавливаясь на формахъ, которыя могли бы быть открыты непосредственно для выраженія 8520191 или кратнаго 8520191, мы будемъ искать ихъ на основаніи предыдущей теоремы. Для этого мы опредѣлимъ числа

$$d_0, d_1, d_2, d_3, \dots$$

по уравненіямъ

$$\begin{aligned} d_0 &= 1, \quad d_1 = 8520191 - (E\sqrt{8520191})^2, \\ \sqrt{8520191 - d_{n+1}d_n} &= d_n E^{\frac{\sqrt{8520191 - d_n d_{n-1}} + \sqrt{8520191}}{d_n}} \\ &\quad - \sqrt{8520191 - d_n d_{n-1}}. \end{aligned}$$

Изъ этихъ уравненій находимъ

$$\begin{array}{l} d_0 = 1, \quad \left| \begin{array}{l} d_4 = 1313, \\ d_5 = 5467, \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} d_8 = 1169, \\ d_9 = 4523, \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} d_{12} = 593, \\ d_{13} = 2854, \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} d_{16} = 1210, \\ \dots \end{array} \right| \\ d_2 = 370, \quad \left| \begin{array}{l} d_6 = 3185, \\ d_7 = 4319, \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} d_{10} = 242, \\ d_{11} = 1855, \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} d_{14} = 2965, \\ d_{15} = 371, \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right| \end{array}$$

*) Въ этихъ формахъ не будетъ заключаться числа $d_1, d_2, d_3, \dots$, входящія въ составъ a ; но они могутъ дѣлить A , и мы ихъ должны предварительно испытать.

Разлагая здѣсь числа на простые множители, что не представляетъ большой трудности *), получаемъ

$$\begin{array}{l|l|l|l} d_0=1, & d_4=13.101, & d_8=7.167, & d_{12}=593, \\ d_1=7.11.71, & d_5=2.5.263, & d_9=4523, & d_{13}=2.1427, \\ d_2=2.5.37, & d_6=5.7^2.13, & d_{10}=2.11^2, & d_{14}=5.593, \\ d_3=7.617, & d_7=7.29, & d_{11}=5.7.53, & d_{15}=7.53, \\ & & & d_{16}=2.5.11^2. \end{array}$$

Разсматривая составъ чиселъ $d_0, d_1, d_2, \dots, d_{16}$, мы замѣчаемъ, что числа

$$d_6, d_{10}, d_{13}, d_{10}d_{16}, d_6d_{10}d_{16}, d_2d_{16}, d_4d_6d_{10}d_{16},$$

по исключеніи изъ состава ихъ точныхъ квадратовъ, приводятся къ незначительнымъ числамъ.

Поэтому на основаніи доказанной нами теоремы для опредѣленія дѣлителей разсматриваемаго нами числа 8520191, принимаемъ формы вида $x^2 - ay^2$, гдѣ a имѣетъ такія значенія

$$a = (-1)^6 d_6 = 5.7^2.13,$$

$$a = (-1)^{10} d_{10} = 2.11^2,$$

$$a = (-1)^{16} d_{16} = 2.5.11^2,$$

$$a = (-1)^{10+16} d_{10}d_{16} = 2^2.5.11^4,$$

$$a = (-1)^{6+10+16} d_6d_{10}d_{16} = 5^2.7^2.13.2^2.11^4,$$

$$a = (-1)^{2+16} d_2d_{16} = 2^2.5^2.37.11^2,$$

$$a = (-1)^{4+6+10+16} d_4d_6d_{10}d_{16} = 13^2.101.5^2.7^2.2^2.11^4.$$

Исключая въ этихъ величинахъ a всѣ множители, составляющіе точные квадраты, находимъ для a слѣдующія величины

$$5.13, 2, 2.5, 5, 13, 37, 101.$$

Откуда видимъ, что дѣлители 8520191, должны имѣть видъ дѣлителей каждой изъ формъ

$$\begin{array}{l} x^2 - 5.13y^2, \quad x^2 - 2y^2, \quad x^2 - 2.5y^2, \quad x^2 - 5y^2, \quad x^2 - 13y^2, \\ \quad \quad \quad x^2 - 37y^2, \quad x^2 - 101y^2. \end{array}$$

На этомъ основаніи мы и будемъ искать дѣлителей 8520191.

Для этого по таблицамъ линейныхъ дѣлителей, мы замѣчаемъ, что дѣлители $x^2 - 5.13y^2$ суть

*) При этомъ можно съ выгодною пользоваться таблицами Вега, въ которыхъ находимъ для всѣхъ чиселъ меньшихъ 102000 разложеніе на простые множители.

260 z +1, 7, 9, 29, 33, 37, 47, 49, 51, 57, 61, 63, 67, 69, 73,
79, 81, 83, 93, 97, 101, 121, 123, 129, 131, 137, 139,
159, 163, 167, 177, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199,
203, 209, 211, 213, 223, 227, 231, 251, 253, 259.

Но изъ нихъ дѣлителями $x^2 - 5y^2$ могутъ быть только тѣ,
которые при дѣленіи на 20 даютъ остатки равные 1, 9, 11, 19;
ибо для дѣлителей $x^2 - 5y^2$ находимъ

$$20z + 1, 9, 11, 19.$$

Выкидывая изъ предыдущихъ формъ всѣ, которыя не да-
ютъ въ остаткѣ 1, 9, 11, 19, мы находимъ, что дѣлителями
 $x^2 - 5.13y^2$ и $x^2 - 5y^2$ вмѣстѣ могутъ быть числа вида

$$260z + 1, 9, 29, 49, 51, 61, 69, 79, 81,
101, 121, 129, 131, 139, 159, 179, 181, 191,
199, 209, 211, 231, 251, 259.$$

Но изъ этихъ чиселъ могутъ быть дѣлителями формы
 $x^2 - 2y^2$ только тѣ, которыя вида $8z + 1$ или $8z + 7$, и слѣд. при
дѣленіи на 8 даютъ въ остаткѣ 1 или 7. Чтобы вывести изъ
найденныхъ нами формъ дѣлителей $x^2 - 5.13y^2$ и $x^2 - 5y^2$ такія,
которыя бы давали одни числа вида $8z + 1$ и $8z + 7$, мы пре-
образуемъ ихъ такъ, чтобы коеффиціентъ при переменномъ z
былъ кратнымъ 8. Для этого мы замѣчаемъ, что z будетъ или
вида $2u$, или вида $2u + 1$. Внося эти величины въ найденныя
нами формы дѣлителей $x^2 - 15y^2$ и $x^2 - 5y^2$, мы ихъ пред-
ставимъ такъ

$$520u + 1, 9, 29, 49, 51, 61, 69, 79, 81, 101,
121, 129, 131, 139, 159, 179, 181,
191, 199, 209, 211, 231, 251, 259,
261, 269, 289, 309, 311, 321, 329,
339, 341, 361, 381, 389, 391, 399,
419, 439, 441, 451, 459, 469, 471,
491, 511, 519.$$

Выкидывая здѣсь тѣ формы, которыя при дѣленіи на 8 да-
ютъ остатки, отличные отъ 1 и 7, находимъ, что общіе дѣлители
формъ $x^2 - 5.13y^2$, $x^2 - 5y^2$, $x^2 - 2y^2$ должны быть вида

520и+1, 9, 49, 79, 81, 121, 129, 159, 191, 199,
209, 231, 289, 311, 321, 329, 361, 391,
399, 439, 441, 471, 511, 519.

У насъ остается еще для опредѣленія дѣлителей числа 8520191 четыре формы

$$x^2 - 2.5y^2, x^2 - 13y^2, x^2 - 37y^2, x^2 - 101y^2.$$

Изъ нихъ первыя двѣ имѣють дѣлителями всѣ числа, дѣлящія $x^2 - 5.13y^2$, $x^2 - 5y^2$, $x^2 - 2y^2$, въ чемъ не трудно убѣдиться, замѣтивъ, что дѣлимость $x_1^2 - 5.13y_1^2$, $x_2^2 - 5y_2^2$, $x_3^2 - 2y_3^2$ на p предполагаетъ

$$x_1^2 \equiv 5.13y_1^2, x_2^2 \equiv 5y_2^2, x_3^2 \equiv 2y_3^2 \pmod{p};$$

откуда слѣдуетъ $x_1^2 x_2^2 \equiv 5^2.13y_1^2 y_2^2$, $x_2^2 x_3^2 \equiv 2.5y_2^2 y_3^2 \pmod{p}$, и слѣдов. дѣлимость формъ $x^2 - 13y^2$ и $x^2 - 2.5y^2$ на p .

Что же касается до формъ

$$x^2 - 37y^2, x^2 - 101y^2;$$

то опредѣляя ихъ дѣлителей и выкидывая изъ формъ

520и+1, 9, 49, 79, 81, 121, 129, 159, 191, 199,
209, 231, 289, 311, 321, 329, 361, 391,
399, 439, 441, 471, 511, 519.

тѣ, которыя не согласны съ ихъ видомъ, мы ограничили бы еще болѣе числа, между которыми должны искать дѣлителей 8520191. Для этого мы найденныя формы должны преобразовать такъ, чтобы коеффиціентъ при переменномъ $и$ былъ кратнымъ 4.37 и 4.101. Послѣ чего дѣленіемъ этихъ формъ на 4.37 и 4.101 мы узнаемъ, которыя изъ нихъ подходятъ подъ формы дѣлителей $x^2 - 37y^2$, $x^2 - 101y^2$. Но при этомъ мы получимъ чрезвычайно много линейныхъ формъ для опредѣленія дѣлителей 8520131. Поэтому, не пользуясь пока формами $x^2 - 37y^2$, $x^2 - 101y^2$ для опредѣленія дѣлителей 8520191, мы остановимся на найденныхъ нами линейныхъ дѣлителяхъ общихъ формамъ $x^2 - 5.13y^2$, $x^2 - 5y^2$, $x^2 - 2y^2$, и по нимъ опредѣлимъ всѣ простыя числа меньшія $\sqrt{8520191}$.

Эти числа суть

79	521	719	919	1231	1511	1889	2129	2521	2791.
191	569	751	991	1249	1559	1951	2161	2551	
199	599	809	1031	1361	1609	1999	2239	2591	
311	601	881	1039	1439	1759	2081	2311	2609	
439	641	911	1049	1481	1871	2089	2441	2729	

Между этими-то числами мы должны искать наименьшаго дѣлителя 8520191. Но по значительному количеству ихъ это было бы довольно продолжительно. Для этого мы предварительно исключимъ изъ нихъ тѣ, которыя не могутъ быть дѣлителями квадратичныхъ формъ $x^2 - 37y^2$, $x^2 - 101y^2$. Для этого мы замѣчаемъ изъ таблицъ, что дѣлители $x^2 - 37y^2$ при дѣленіи на 148 должны давать остатки

1, 3, 7, 9, 11, 21, 25, 27, 33,
41, 47, 49, 53, 63, 65, 67, 71,
73, 75, 77, 81, 83, 85, 95, 99,
101, 107, 115, 121, 123, 127,
137, 139, 141, 145, 147.

Но между найденными нами простыми числами этому условію удовлетворяютъ только только числа

521	751	1439	2081
599	881	1481	2441
601	1039	1871	2591
641	1231	1951	2729
719	1249	1999	2791.

Такимъ же образомъ находимъ, что изъ этихъ чиселъ дѣлителями $x^2 - 101y^2$ могутъ быть только

521, 601, 1231, 1249, 1439 1999, 2441, 2791.

Пробуя дѣлить на эти числа 8520191, замѣчаемъ, что они его не дѣлятъ; откуда заключаемъ, что 8520191 число простое.

Такимъ образомъ, на основаніи теоріи дѣлителей квадратичныхъ формъ, мы можемъ изслѣдовать составъ всякаго числа, опредѣливши рядъ чиселъ

$$d_0, d_1, d_2, \dots$$

по уравненіямъ: $d_0 = 1$, $d_1 = A - (E\sqrt{A})^2$,

$$\sqrt{A - d_{n+1}d_n} = d_n E \frac{\sqrt{A - d_n d_{n-1}} + \sqrt{A}}{d_n} - \sqrt{A - d_n d_{n-1}}.$$

ПРИБАВЛЕНІЯ.

І.

О квадратичныхъ вычетахъ.

Въ IV-й главѣ мы видѣли, какъ опредѣляется величина символа $\left(\frac{a}{p}\right)$, и черезъ это узнаемъ, имѣетъ ли сравненіе $x^2 \equiv a \pmod{p}$ рѣшеніе или нѣтъ. Но этотъ способъ опредѣленія величины $\left(\frac{a}{p}\right)$ можетъ быть значительно упрощенъ; можно опредѣлить значеніе $\left(\frac{a}{p}\right)$, не разлагая ни a , ни другихъ чиселъ на простые множители. Такое упрощеніе особенно важно при a большомъ; въ этомъ случаѣ разложеніе a на простые множители бываетъ очень трудно, и требуетъ гораздо болѣе времени, чѣмъ самое опредѣленіе $\left(\frac{a}{p}\right)$ по способу, который мы теперь покажемъ.

Слѣдуя Лежандру, мы изображаемъ символомъ $\left(\frac{a}{p}\right)$, при p простымъ, нечетномъ, недѣлящемъ a , единицу съ тѣмъ изъ двухъ знаковъ, съ которымъ она удовлетворяетъ сравненію

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

Согласимся же теперь съ Якоби изображать произведеніе такихъ символовъ $\left(\frac{a}{p_1}\right), \left(\frac{a}{p_2}\right), \left(\frac{a}{p_3}\right), \dots$ символомъ $\left(\frac{a}{p_1 p_2 p_3 \dots}\right)$.

Допустивши такое знакоположеніе, мы въ величинѣ символа $\left(\frac{a}{N}\right)$ при N нечетномъ, простомъ съ a , будемъ имѣть произведеніе символовъ $\left(\frac{a}{\alpha}\right), \left(\frac{a}{\beta}\right), \left(\frac{a}{\gamma}\right), \dots$, гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ суть простые множители, составляющіе N . Въ случаѣ N простого этотъ символъ будетъ тождественъ символу Лежандра, и имъ опредѣлится возможность или невозможность сравненія $x^2 \equiv a \pmod{N}$.

Докажемъ же теперь, что символъ $\left(\frac{a}{N}\right)$ будетъ удовлетворять всѣмъ тѣмъ уравненіямъ, которыя служили намъ для опредѣленія величины символа $\left(\frac{a}{p}\right)$ при p простомъ.

Не трудно убѣдиться, что $\left(\frac{a' \cdot a'' \cdot \dots}{N}\right)$ равно $\left(\frac{a'}{N}\right) \left(\frac{a''}{N}\right) \dots$. Въ самомъ дѣлѣ, если

$$N = \alpha \beta \gamma \dots,$$

гдѣ $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ простые числа; то

$$\left(\frac{a' a'' \dots}{\alpha}\right) = \left(\frac{a'}{\alpha}\right) \left(\frac{a''}{\alpha}\right) \dots,$$

$$\left(\frac{a' a'' \dots}{\beta}\right) = \left(\frac{a'}{\beta}\right) \left(\frac{a''}{\beta}\right) \dots,$$

$$\left(\frac{a' a'' \dots}{\gamma}\right) = \left(\frac{a'}{\gamma}\right) \left(\frac{a''}{\gamma}\right) \dots,$$

$$\dots \dots \dots$$

Перемножая эти уравненія, находимъ

$$\left(\frac{a' a'' \dots}{\alpha}\right) \left(\frac{a' a'' \dots}{\beta}\right) \left(\frac{a' a'' \dots}{\gamma}\right) \dots = \left(\frac{a'}{\alpha}\right) \left(\frac{a'}{\beta}\right) \left(\frac{a'}{\gamma}\right) \dots \left(\frac{a''}{\alpha}\right) \left(\frac{a''}{\beta}\right) \left(\frac{a''}{\gamma}\right) \dots,$$

что по принятому нами знакоположенію представится такъ

$$\left(\frac{a' a'' \dots}{\alpha \beta \gamma \dots}\right) = \left(\frac{a'}{\alpha \beta \gamma \dots}\right) \left(\frac{a''}{\alpha \beta \gamma \dots}\right) \dots$$

Замѣчая же, что здѣсь $\alpha \beta \gamma \dots$ равно N , найдемъ

$$\left(\frac{a' a'' \dots}{N}\right) = \left(\frac{a'}{N}\right) \left(\frac{a''}{N}\right) \dots,$$

что и хотѣли доказать. На основаніи этого мы заключаемъ, что

$$\left(\frac{a'^2}{N}\right) = 1,$$

и слѣд.

$$\left(\frac{a'^2 a''}{N}\right) = \left(\frac{a''}{N}\right).$$

На этомъ основаніи мы можемъ въ символѣ $\left(\frac{N}{a}\right)$ выкидывать изъ состава a точные квадраты.

Также не трудно доказать, что при a сравнимомъ съ a' по модулю N значеніе $\left(\frac{a}{N}\right)$ равно $\left(\frac{a'}{N}\right)$. Въ самомъ дѣлѣ, если a и a' сравнимы по модулю N и $N = \alpha\beta\gamma\dots$, то a и a' сравнимы по модулямъ α , β , $\gamma, \dots$, и слѣд.

$$\left(\frac{a}{\alpha}\right) = \left(\frac{a'}{\alpha}\right), \quad \left(\frac{a}{\beta}\right) = \left(\frac{a'}{\beta}\right), \quad \left(\frac{a}{\gamma}\right) = \left(\frac{a'}{\gamma}\right) \dots$$

Перемножая эти уравненія между собою, найдемъ

$$\left(\frac{a}{\alpha}\right) \left(\frac{a}{\beta}\right) \left(\frac{a}{\gamma}\right) \dots = \left(\frac{a'}{\alpha}\right) \left(\frac{a'}{\beta}\right) \left(\frac{a'}{\gamma}\right) \dots, \text{ или } \left(\frac{a}{\alpha\beta\gamma\dots}\right) = \left(\frac{a'}{\alpha\beta\gamma\dots}\right).$$

Но $\alpha\beta\gamma\dots = N$, слѣдовательно

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{a'}{N}\right).$$

На основаніи этого мы можемъ въ символѣ $\frac{a}{N}$ число a замѣнить остаткомъ отъ дѣленія a на N , или абсолютно малымъ вычетомъ a по модулю N .

Значенія $\left(\frac{a}{N}\right)$ при $a=1$ и $a=-1$ опредѣляются также какъ значенія $\left(\frac{a}{p}\right)$ при p простомъ уравненіями

$$\left(\frac{1}{N}\right) = 1, \quad \left(\frac{-1}{N}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}.$$

Въ самомъ дѣлѣ, если $N = \alpha\beta\gamma\dots$, гдѣ α , β , $\gamma, \dots$ простыя числа; то

$$\left(\frac{1}{N}\right) = \left(\frac{1}{\alpha}\right) \left(\frac{1}{\beta}\right) \left(\frac{1}{\gamma}\right) \dots = 1,$$

$$\left(\frac{-1}{N}\right) = \left(\frac{-1}{\alpha}\right) \left(\frac{-1}{\beta}\right) \left(\frac{-1}{\gamma}\right) \dots = (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots}.$$

Но $\frac{N-1}{2} = \frac{\alpha\beta\gamma\dots-1}{2}$, что можетъ быть представлено такъ

$$\frac{\left(2^{\frac{\alpha-1}{2}} + 1\right) \left(2^{\frac{\beta-1}{2}} + 1\right) \left(2^{\frac{\gamma-1}{2}} + 1\right) \dots - 1}{2},$$

а это за исключеніемъ членовъ, имѣющихъ множителемъ 2, приводится къ

$$\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots$$

Вслѣдствіе этого предыдущее выраженіе $\left(\frac{-1}{N}\right)$ приводится къ такому

$$\left(\frac{-1}{N}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}.$$

На основаніи этого и уравненія $\left(\frac{\alpha\alpha'}{N}\right) = \left(\frac{\alpha}{N}\right) \left(\frac{\alpha'}{N}\right)$ значеніе $\left(\frac{-\alpha}{N}\right)$ выразится такъ

$$\left(\frac{-\alpha}{N}\right) = \left(\frac{\alpha}{N}\right) (-1)^{\frac{N-1}{2}}.$$

Переходимъ теперь къ уравненію, связывающему значенія $\left(\frac{a}{N}\right)$, $\left(\frac{N}{a}\right)$. Это уравненіе подобно тому, которое мы нашли для символа $\left(\frac{a}{p}\right)$ при a , p простыхъ, и назвали законъ взаимности двухъ простыхъ чиселъ. Пусть будетъ $N = \alpha\beta\gamma\dots$, $a = \alpha'\beta'\gamma'\dots$, гдѣ α' , β' , γ' ,..... подобно α , β , γ ,..... простые числа. По закону взаимности простыхъ чиселъ находимъ

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha'}{\alpha}\right) &= \left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right) (-1)^{\frac{\alpha-1}{2} \cdot \frac{\alpha'-1}{2}}, & \left(\frac{\alpha'}{\beta}\right) &= \left(\frac{\beta}{\alpha'}\right) (-1)^{\frac{\beta-1}{2} \cdot \frac{\alpha'-1}{2}}, \\ \left(\frac{\alpha'}{\gamma}\right) &= \left(\frac{\gamma}{\alpha'}\right) (-1)^{\frac{\gamma-1}{2} \cdot \frac{\alpha'-1}{2}}, & \dots, \end{aligned}$$

Перемножая же эти уравненія между собою, получаемъ

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\alpha'}{\alpha}\right) \left(\frac{\alpha'}{\beta}\right) \left(\frac{\alpha'}{\gamma}\right) \dots = \\ &\left(\frac{\alpha}{\alpha'}\right) \left(\frac{\beta}{\alpha'}\right) \left(\frac{\gamma}{\alpha'}\right) \dots (-1)^{\frac{\alpha'-1}{2} \left(\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots\right)}, \end{aligned}$$

или

$$\left(\frac{\alpha'}{\alpha\beta\gamma\dots}\right) = \left(\frac{\alpha\beta\gamma\dots}{\alpha'}\right) (-1)^{\frac{\alpha'-1}{2} \left(\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots\right)}.$$

Но произведение $\alpha\beta\gamma\dots\dots$ равно N ; значение же

$$\frac{\alpha-1}{2} + \frac{\beta-1}{2} + \frac{\gamma-1}{2} + \dots,$$

какъ замѣтили, разнится съ $\frac{N-1}{2}$ числомъ четнымъ; вслѣдствіе этого предыдущее уравненіе приводится къ такому

$$\left(\frac{\alpha'}{N}\right) = \left(\frac{N}{\alpha'}\right)(-1)^{\frac{\alpha'-1}{2} \cdot \frac{N-1}{2}}.$$

Подобнымъ образомъ находимъ

$$\left(\frac{\beta'}{N}\right) = \left(\frac{N}{\beta'}\right)(-1)^{\frac{\beta'-1}{2} \cdot \frac{N-1}{2}},$$

$$\left(\frac{\gamma'}{N}\right) = \left(\frac{N}{\gamma'}\right)(-1)^{\frac{\gamma'-1}{2} \cdot \frac{N-1}{2}},$$

.....

Перемножая всѣ эти уравненія между собою, получаемъ

$$\left(\frac{\alpha'}{N}\right)\left(\frac{\beta'}{N}\right)\left(\frac{\gamma'}{N}\right)\dots = \left(\frac{N}{\alpha'}\right)\left(\frac{N}{\beta'}\right)\left(\frac{N}{\gamma'}\right)\dots(-1)^{\frac{N-1}{2}\left(\frac{\alpha'-1}{2} + \frac{\beta'-1}{2} + \frac{\gamma'-1}{2} + \dots\right)},$$

что подобно предыдущему приводится къ

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2} \cdot \frac{a-1}{2}};$$

ибо $\alpha'\beta'\gamma'\dots\dots = a$.

Намъ остается теперь показать уравненіе, опредѣляющее значеніе $\left(\frac{a}{N}\right)$ при $a=2$. Это уравненіе, на основаніи выведенныхъ нами, можетъ быть опредѣлено очень просто независимо отъ уравненія, выражающаго величину $\left(\frac{2}{p}\right)$ при p простымъ.

Для этого мы замѣчаемъ, что уравненіе

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2} \cdot \frac{a-1}{2}}$$

при $a = 2n - 1$, $N = 2n + 1$ даетъ

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right) = \left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)(-1)^{n(n-1)};$$

откуда слѣдуетъ

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right) = \left(\frac{2n+1}{2n-1}\right).$$

Но по доказанному нами

$$\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right) = \left(\frac{2n-1-2n-1}{2n+1}\right) = \left(\frac{-2}{2n+1}\right) = \left(\frac{2}{2n+1}\right)(-1)^n,$$

$$\left(\frac{2n+1}{2n-1}\right) = \left(\frac{2n+1-2n+1}{2n-1}\right) = \left(\frac{2}{2n-1}\right).$$

Вслѣдствіе этого предыдущее уравненіе даетъ

$$\left(\frac{2}{2n+1}\right) : \left(\frac{2}{2n-1}\right) = (-1)^n.$$

Дѣлая здѣсь $n = 2, 3, \dots, \frac{N-1}{2}$ и перемножая уравненія при этомъ получаемыя, находимъ

$$\left(\frac{2}{N}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)(-1)^{2+3+\dots+\frac{N-1}{2}}.$$

Но $\left(\frac{2}{3}\right)$ равно -1 ; вслѣдствіе этого предыдущее уравненіе даетъ

$$\left(\frac{2}{N}\right) = (-1)^{1+2+3+\dots+\frac{N-1}{2}},$$

что приводится къ такому уравненію

$$\left(\frac{2}{N}\right) = (-1)^{\frac{N^2-1}{8}}.$$

На основаніи выведенныхъ нами уравненій, мы можемъ съ выгодною ввести символъ $\left(\frac{a}{N}\right)$, съ N составнымъ, для опредѣленія значеній $\left(\frac{a}{p}\right)$ при p простомъ. Для этого мы будемъ поступать при опредѣленіи $\left(\frac{a}{p}\right)$ такимъ образомъ:

Если a больше p ; то символъ $\left(\frac{a}{p}\right)$ замѣняемъ символомъ $\left(\frac{r}{p}\right)$, гдѣ r остатокъ отъ дѣленія a на p (вмѣсто остатка отъ дѣленія a на p мы можемъ взять за r абсолютно малый вы-

четь a по модулю p); если r число четное; то разлагаемъ его на произведение степени 2 и числа нечетнаго; чрезъ это значеніе $\left(\frac{r}{p}\right)$ представится произведеніемъ символовъ $\left(\frac{2}{p}\right)$ и $\left(\frac{r'}{p}\right)$. Символы $\left(\frac{2}{p}\right)$, будучи въ четномъ числѣ, дадутъ произведеніе равное 1; въ противномъ случаѣ мы его найдемъ по уравненію

$\left(\frac{2}{N}\right) = (-1)^{\frac{N^2-1}{8}}$. Обращаемся къ символу $\left(\frac{r'}{p}\right)$, гдѣ $r' < p$ и r' число нечетное. По выведенному нами уравненію

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{N}{a}\right) (-1)^{\frac{N-1}{2} \cdot \frac{a-1}{2}}$$

найдемъ

$$\left(\frac{r'}{p}\right) = \left(\frac{p}{r'}\right) (-1)^{\frac{r'-1}{2} \cdot \frac{p-1}{2}}.$$

Потомъ поступаемъ съ $\left(\frac{p}{r'}\right)$, какъ поступали съ $\left(\frac{a}{p}\right)$, и уменьшая такимъ образомъ послѣдовательно числа, входящія въ этотъ символъ, дойдемъ до символовъ, которыхъ значенія найдутся на основаніи уравненій

$$\left(\frac{1}{N}\right) = 1, \left(\frac{-1}{N}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}, \left(\frac{2}{N}\right) = (-1)^{\frac{N^2-1}{8}}.$$

При этомъ мы будемъ выкидывать въ символѣ $\left(\frac{a}{N}\right)$ множителей a и N , составляющихъ точные квадраты, когда такіе множители легко обнаруживаются.

Для примѣра возьмемъ символъ

$$\left(\frac{884257967}{2147483647}\right).$$

Здѣсь верхнее число меньше нижняго и притомъ нечетное; поэтому на основаніи уравненія

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{N}{a}\right) (-1)^{\frac{N-1}{2} \cdot \frac{a-1}{2}}$$

ВЫВОДИМЪ

$$\left(\frac{884257967}{2147483647}\right) = -\left(\frac{2147483647}{884257967}\right).$$

Потомъ, дѣля 2147483647 на 884257967 и находя въ остаткѣ 378967713, заключаемъ, что

$$\left(\frac{2147483647}{884257967}\right) = \left(\frac{378967713}{884257967}\right).$$

Но опять на основаніи того же уравненія

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{N}{a}\right)(-1)^{\frac{N-1}{2} \frac{a-1}{2}}$$

находимъ

$$\left(\frac{378967713}{884257967}\right) = \left(\frac{884257967}{378967713}\right).$$

А такъ какъ остатокъ отъ дѣленія 884257967 на 378967713 есть 126322541; то

$$\left(\frac{884257967}{378967713}\right) = \left(\frac{126322541}{378967713}\right).$$

Продолжая такимъ образомъ, выводимъ

$$\left(\frac{126322541}{378967713}\right) = \left(\frac{378967713}{126322541}\right) = \left(\frac{90}{126322541}\right);$$

$$\left(\frac{90}{126322541}\right) = \left(\frac{3}{126322541}\right)^2 \left(\frac{10}{126322541}\right) = \left(\frac{10}{126322541}\right);$$

$$\left(\frac{10}{126322541}\right) = \left(\frac{2}{126322541}\right) \left(\frac{5}{126322541}\right).$$

Но величина $\left(\frac{2}{126322541}\right)$ по уравненію $\left(\frac{2}{N}\right) = (-1)^{\frac{N^2-1}{8}}$ есть—1; слѣд.

$$\left(\frac{10}{126322541}\right) = -\left(\frac{5}{126322541}\right) = -\left(\frac{126322541}{5}\right) = -\left(\frac{1}{5}\right) = -1.$$

Итакъ величина $\left(\frac{884257967}{2147483647}\right)$ есть 1.

Если бы мы стали опредѣлять значеніе этого символа по способу Лежандра, изложенному нами въ IV главѣ, мы должны бы были, приступая къ этому опредѣленію, разложить число

884257967 на простые множители, что представляет большія трудности.

Принятое нами знакоположеніе для означенія произведенія символовъ $\left(\frac{a}{p_1}\right)$, $\left(\frac{a}{p_2}\right)$, $\left(\frac{a}{p_3}\right)$, и вслѣдствіе того данное нами значеніе символу $\left(\frac{a}{N}\right)$ при N составномъ, можетъ быть также съ пользою употреблено въ теоріи дѣлителей квадратичной формы $x^2 \pm ay^2$. Такъ если форма $x^2 - iay^2$, гдѣ $i = \pm 1$ имѣетъ дѣлителемъ число N , и N есть произведеніе простыхъ чиселъ $\alpha\beta\gamma$; то $\left(\frac{ia}{\alpha}\right) = 1$, $\left(\frac{ia}{\beta}\right) = 1$, $\left(\frac{ia}{\gamma}\right) = 1$,..... откуда слѣдуетъ, что $\left(\frac{ia}{\alpha}\right)\left(\frac{ia}{\beta}\right)\left(\frac{ia}{\gamma}\right).... = 1$, и слѣд. по нашему знакоположенію

$$\left(\frac{ia}{N}\right) = 1.$$

Откуда выходитъ

$$\left(\frac{i}{N}\right)\left(\frac{a}{N}\right) = 1.$$

Умножая это уравненіе на $\left(\frac{i}{N}\right)$ и замѣчая что $\left(\frac{i}{N}\right)^2 = 1$, находимъ

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{i}{N}\right).$$

Предполагая же a числомъ нечетнымъ, по доказанному нами имѣемъ

$$\left(\frac{N}{a}\right) = \left(\frac{a}{N}\right)(-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{N-1}{2}}.$$

Это уравненіе вмѣстѣ съ предыдущимъ даетъ

$$\left(\frac{N}{a}\right) = \left(\frac{i}{N}\right)(-1)^{\frac{a-1}{2} \cdot \frac{N-1}{2}}.$$

Отсюда для $i = 1$, $a = 4n + 1$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right) = 1$; для $i = 1$,

$a = 4n + 3$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}$; для $i = -1$,

$a=4n+1$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right)=(-1)^{\frac{N-1}{2}}$; для $i=-1$, $a=4n+3$ выводимъ $\left(\frac{N}{a}\right)=1$.

Вотъ уравненія, которымъ должны удовлетворять дѣлители формы $x^2 \pm ay^2$; въ нихъ, какъ частный случай, заключаются уравненія, которыя въ VII-й главѣ мы нашли для опредѣленія дѣлителей $x^2 \pm ay^2$ при a простомъ нечетномъ.



II.

Объ опредѣленіи первообразныхъ корней.

Въ VI-й главѣ мы показали два способа опредѣлять первообразные корни простыхъ чиселъ. Оба эти способа для чиселъ большихъ приводятся къ огромнымъ выкладкамъ. Теперь мы докажемъ нѣсколько теоремъ, на основаніи которыхъ можно для многихъ чиселъ по виду ихъ узнать ихъ первообразный корень.

ТЕОРЕМА.

Первообразный корень числа $2^{2^n} + 1$ есть 3.

Доказательство. Если $p = 2^{2^n} + 1$; то въ составъ $p - 1$ входитъ только простое число 2; а потому (см. 49 теорему) число a будетъ первообразный корень $2^{2^n} + 1$, если сравненіе $x^2 \equiv a \pmod{2^{2^n} + 1}$ не имѣетъ рѣшенія. Докажемъ же теперь, что это сравненіе не имѣетъ рѣшенія при $a = 3$. Для этого мы замѣчаемъ, что $\left(\frac{3}{2^{2^n} + 1}\right)$ по закону взаимности чиселъ, равно $\left(\frac{2^{2^n} + 1}{3}\right)$, а это равно $\left(\frac{-1}{3}\right)$; ибо возводя члены сравненія $4 \equiv 1 \pmod{3}$ въ степень n находимъ $4^n \equiv 1 \pmod{3}$; откуда ясно, что -1 по модулю 3 сравнимо съ $4^n + 1$, или $2^{2^n} + 1$. Но $\left(\frac{-1}{3}\right) = -1$. Слѣд. $\left(\frac{3}{2^{2^n} + 1}\right) = -1$; а потому сравненіе

$x^2 \equiv 3 \pmod{2^{2n}+1}$ не имѣетъ рѣшенія, и 3 есть первообразный корень числа $2^{2n}+1$.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что 3 есть первообразный корень 5, 17, 257, 65537.

ТЕОРЕМА.

Первообразный корень числа $2(4n+1)+1$ при $4n+1$ простомъ есть 2, а числа $2(4n+3)+1$ при $4n+3$ простымъ есть $2(4n+3)-1$.

Доказательство. Если $p = 2(4n+1)+1$ и $4n+1$ число простое, большее 1; то въ составъ $p-1$ входятъ два простых числа: 2, $4n+1$; поэтому (см. 49 теор.) число a будетъ первообразный корень числа $2(4n+1)+1$, если сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^{4n+1} \equiv a \pmod{2(4n+1)+1}$$

не имѣютъ рѣшенія. Докажемъ же теперь, что эти сравненія не имѣютъ рѣшенія при $a = 2$. Невозможность перваго очевидна; оно приводится къ

$$x^2 \equiv 2 \pmod{8n+3}$$

а по 32-й теоремѣ $\left(\frac{2}{8n+3}\right)$ есть -1 .

Что-же касается до втораго, оно будетъ

$$x^{4n+1} \equiv 2 \pmod{8n+3};$$

откуда, возводя обѣ части сравненія въ квадратъ, находимъ

$$x^{8n+2} \equiv 4 \pmod{8n+3}.$$

Этому сравненію не удовлетворяютъ числа кратныя $8n+3$, а при x недѣлящемся на $8n+3$ по теоремѣ Фермата будетъ

$$x^{8n+2} \equiv 1 \pmod{8n+3}.$$

Вслѣдствіе чего предыдущее сравненіе приводится къ такому

$$1 \equiv 4 \pmod{8n+3},$$

или

$$3 \equiv 0 \pmod{8n+3}.$$

Это сравненіе могло бы имѣть мѣсто только при $n = 0$,

но случай $n = 0$, и слѣд. $4n + 1 = 1$ мы исключаемъ. Итакъ оба сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^{4n+1} \equiv a \pmod{2(4n+1)+1}$$

при $a = 2$, $n > 0$ не имѣютъ рѣшенія, и слѣд. первообразный корень $2(4n+1)+1$ въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ есть 2.

Переходимъ теперь къ $p = 2(4n+3)+1$. Въ этомъ случаѣ $p-1$ будетъ заключать простыя числа 2 и $4n+3$, и a будетъ первообразный корень $2(4n+3)+1$, если сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^{4n+3} \equiv a \pmod{2(4n+3)+1}$$

не имѣютъ рѣшенія. Докажемъ же, что это случается для $a = 2(4n+3)-1$. Первое сравненіе приводится къ

$$x^2 \equiv 8n+5 \pmod{8n+7},$$

и оно не имѣетъ рѣшеній; ибо

$$\left(\frac{8n+5}{8n+7}\right) = \left(\frac{8n+5-8n-7}{8n+7}\right) = \left(\frac{-2}{8n+7}\right) = -1.$$

Второе будетъ

$$x^{4n+3} \equiv 8n+5 \pmod{8n+7},$$

или

$$x^{4n+3} \equiv -2 \pmod{8n+7}.$$

Возводя обѣ части этого сравненія въ квадратъ и замѣчая, что по теоремѣ Фермата $x^{8n+6} \equiv 1 \pmod{8n+7}$, находимъ

$$1 \equiv 4 \pmod{8n+7},$$

что невозможно. Итакъ оба сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^{4n+3} \equiv a \pmod{2(4n+3)+1}$$

при $a = 2(4n+3)-1$ не имѣютъ рѣшенія, и слѣд. $2(4n+3)+1$ есть первообразный корень числа $2(4n+3)+1$.

На основаніи этой теоремы мы заключаемъ, что 2 есть первообразный корень 11, 59, 83, 107, 123, а 7 имѣетъ первообразнымъ корнемъ 5; 23 имѣетъ первообразнымъ корнемъ 21; 47 имѣетъ первообразнымъ корнемъ 45 и т. д.

ТЕОРЕМА.

Первообразный корень $4N+1$, при N простомъ и больше 2, есть 2.

Доказательство. Если $p=4N+1$, и N простое, большее 2; то $p-1$ заключаетъ два простыхъ числа: 2 и N ; поэтому a будетъ первообразнымъ корнемъ $4N+1$, если сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^N \equiv a \pmod{4N+1}$$

не имѣютъ рѣшенія. Докажемъ же, что это случается при $a=2$. При $a=2$ первое сравненіе будетъ

$$x^2 \equiv 2 \pmod{4N+1}.$$

Но N нечетное число; слѣд. вида $2n+1$, а потому $4N+1=8n+1$, въ этомъ же случаѣ по 32-й теоремѣ

$$\left(\frac{2}{4N+1}\right) = -1,$$

и слѣд. сравненіе

$$x^2 \equiv 2 \pmod{4N+1}$$

не имѣетъ рѣшенія. Чтоже касается до втораго, оно приводится къ

$$x^N \equiv 2 \pmod{4N+1}.$$

Возведя обѣ части этого сравненія въ четвертую степень и замѣтивъ, что по теоремѣ Фермата $x^{4N} \equiv 1 \pmod{4N+1}$, находимъ

$$1 \equiv 16 \pmod{4N+1},$$

или

$$3.5 \equiv 0 \pmod{4N+1}.$$

Но это сравненіе невозможно; ибо оно предполагаетъ 3 или 5 дѣлящимся на простое число $4N+1$, гдѣ $N > 2$. Слѣд. оба сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^N \equiv a \pmod{4N+1}$$

при $a=2$ не имѣютъ рѣшенія, а потому 2 есть первообразный корень числа $4N+1$.

Такъ числа 13, 29, 53, 149, 173, 269, 293, 317,..... будутъ имѣть первообразнымъ корнемъ 2.

Т Е О Р Е М А.

Число $4.2^m N + 1$, при N простомъ превосходящемъ $\frac{92^m}{4.2^m}$, $m > 0$, будетъ имѣть первообразнымъ корнемъ 3.

Доказательство. Если $p = 4.2^m N + 1$ и N простое; то $p - 1$ заключаетъ только два простыхъ числа: 2 и N . Въ этомъ случаѣ a будетъ первообразнымъ корнемъ числа p , если сравненія

$$x^3 \equiv a, \quad x^N \equiv a \pmod{4.2^m N + 1}$$

не имѣютъ рѣшенія. Посмотримъ же могутъ ли они имѣть рѣшеніе при $a = 3$, когда N , по положенію, число простое, болѣе $\frac{92^m}{4.2^m}$ и слѣд. болѣе 3 и на 3 не дѣлится. Въ этомъ случаѣ N будетъ или вида $3n + 1$ или $3n - 1$. Слѣд. будетъ

$$N \equiv \pm 1 \pmod{3}.$$

Но изъ сравненія $2 \equiv -1 \pmod{3}$, возводя его въ степень $m + 2$, выводимъ

$$2^{m+2} \equiv \pm 1 \pmod{3}.$$

Откуда слѣдуетъ, что

$$2^{m+2} N \equiv \pm 1 \pmod{3}$$

а потому $4.2^m N + 1$ будетъ сравнимо по модулю 3 или съ 0, или съ 2. Первое не можетъ имѣть мѣста; ибо оно предполагаетъ дѣлимость простого числа $4.2^m N + 1$ на 3; во второмъ же случаѣ $\left(\frac{4.2^m N + 1}{3}\right)$ равно $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$. Но по закону взаимности двухъ простыхъ чиселъ имѣемъ

$$\left(\frac{4.2^m N + 1}{3}\right) = \left(\frac{3}{4.2^m N + 1}\right). \text{ Слѣд. } \left(\frac{3}{4.2^m N + 1}\right) = -1,$$

что обнаруживаетъ невозможность сравненія

$$x^3 \equiv 3 \pmod{4.2^m N + 1}.$$

Намъ остается доказать, что сравненіе

$$x^N \equiv 3 \pmod{4.2^m N + 1}$$

въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ не имѣеть рѣшенія. Для этого мы возводимъ обѣ части его въ степень $4 \cdot 2^m$ и замѣчая, что по теоремѣ Фермата $x^{4 \cdot 2^m N} \equiv 1 \pmod{4 \cdot 2^m N + 1}$, получаемъ

$$1 \equiv 3^{4 \cdot 2^m} \pmod{4 \cdot 2^m N + 1};$$

откуда слѣдуетъ

$$(3^{2 \cdot 2^m} + 1)(3^{2 \cdot 2^m} - 1) \equiv 0 \pmod{4 \cdot 2^m N + 1},$$

что предполагаетъ дѣлимость одного изъ чиселъ $3^{2 \cdot 2^m} + 1$, $3^{2 \cdot 2^m} - 1$ на $4 \cdot 2^m N + 1$, а это невозможно; ибо N по положенію болѣе $\frac{9^{2^m}}{4 \cdot 2^m}$, и слѣд. $4 \cdot 2^m N + 1$ превосходитъ $9^{2^m} + 1$, или $3^{2 \cdot 2^m} + 1$.

Итакъ въ сдѣланныхъ нами предположеніяхъ оба сравненія

$$x^2 \equiv a, \quad x^N \equiv a \pmod{4 \cdot 2^m N + 1}$$

при $a = 3$ не имѣють рѣшенія; слѣд. число $4 \cdot 2^m N + 1$ имѣеть первообразнымъ корнемъ 3.

Такъ числа 89, 137 233, 569, 809, 857 вида $8N + 1$ и 6737 вида $16N + 1$ имѣють первообразнымъ корнемъ 3.



III.

Объ опредѣленіи числа простыхъ чиселъ, не превосходящихъ данной величины.

Мы видѣли (§ 2), какъ могутъ быть опредѣлены всѣ простые числа отъ 1 до даннаго числа. Такимъ образомъ можно опредѣлить, сколько простыхъ чиселъ меньшихъ даннаго предѣла. Но такое опредѣленіе числа простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла, представляетъ большія трудности, когда за предѣлъ принимаемъ большое число. Мы займемся теперь опредѣленіемъ этого числа по приближенію, и покажемъ на основаніи этого рѣшеніе нѣкоторыхъ вопросовъ.

Во второмъ томѣ Теоріи чиселъ Лежандръ предлагаетъ формулу для приближеннаго опредѣленія числа простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго числа. Свою формулу Лежандръ повѣряетъ таблицею простыхъ чиселъ отъ 10000 до 1000000, и потомъ прилагаетъ ее къ рѣшенію нѣкоторыхъ вопросовъ Теоріи чиселъ. Не смотря на видимое согласіе формулы Лежандра съ таблицею простыхъ чиселъ, мы не можемъ не изъяснить сомнѣнія на счетъ строгости ея, и вслѣдствіе того не можемъ признать вѣрными выводы, на ней основанные. Къ такому заключенію приводитъ насъ одна теорема относительно свойствъ функціи, опредѣляющей число простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго числа, теорема, изъ которой могутъ быть выведены многія любопытныя предложенія.

Мы займемся теперь изложеніемъ этой теоремы, а потомъ покажемъ нѣкоторыя изъ ея приложеній.

Теорема, которая будетъ предметомъ нашихъ изслѣдованій, заключается въ слѣдующемъ:

I. ТЕОРЕМА.

Если $\varphi(x)$ означаетъ число простыхъ чиселъ меньшихъ x , n какое либо число цѣлое, ρ количество > 0 ; то въ суммѣ

$$\sum_{x=2}^{\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

мы будемъ имѣть такую функцію, которая съ приближеніемъ ρ къ 0, приближается къ конечному предѣлу.

Доказательство. Мы докажемъ сначала, что такое свойство принадлежитъ функціямъ, получаемымъ черезъ дифференцированіе нѣсколько разъ выраженій

$$\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}, \quad \log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right),$$

$$\sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right) + \sum \frac{1}{\mu^{1+\rho}}$$

по ρ , предполагая здѣсь и вездѣ въслѣдствіи суммированіе по m распространеннымъ на всѣ числа отъ $m=2$ до $m=\infty$, суммирование же по μ распространеннымъ на одни простые числа отъ $\mu=2$ до $\mu=\infty$.

Начнемъ съ перваго. Не трудно убѣдиться, что

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{e^x - 1} x^{\rho} dx = \sum \frac{1}{m^{1+\rho}} \cdot \int_0^{\infty} e^{-x} x^{\rho} dx,$$

$$\int_0^{\infty} e^{-x} x^{-1+\rho} dx = \frac{1}{\rho} \int_0^{\infty} e^{-x} x^{\rho} dx$$

а потому

$$\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho} = \frac{\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^{\rho} dx}{\int_0^{\infty} e^{-x} x^{\rho} dx}.$$

Изъ этого уравненія видно, что производная n порядка отъ $\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$ по ρ будетъ выражаться дробью, у которой зна-

менателемъ будетъ $[\int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx]^{n+1}$, а числителемъ цѣлая функція интеграловъ

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho dx, \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho \log x dx, \\ & \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho \log^2 x dx, \dots\dots\dots \\ & \dots\dots\dots, \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho \log^n x dx, \int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx, \\ & \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log x dx, \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log^2 x dx, \dots, \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log^n x dx. \end{aligned}$$

Но такая дробь, будетъ ли $n=0$ или >0 , приближается къ конечному предѣлу съ приближеніемъ ρ къ 0; ибо предѣлъ интеграла $\int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx$ при $\rho=0$ есть 1; интегралы же

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho dx, \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho \log x dx, \\ & \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho \log^2 x dx, \dots \int_0^\infty \left(\frac{1}{e^x-1} - \frac{1}{x} \right) e^{-x} x^\rho \log^n x dx, \\ & \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log x dx, \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log^2 x dx, \dots \int_0^\infty e^{-x} x^\rho \log^n x dx \end{aligned}$$

при $\rho=0$, очевидно, сохраняютъ конечную величину.

Итакъ съ приближеніемъ ρ къ 0 всѣ производныя отъ $\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$, также какъ и сама $\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$, будутъ имѣть предѣлами величины конечныя.

Обращаемся теперь къ функціи

$$\log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right).$$

Извѣстно, что

$$\begin{aligned} & \left[\left(1 - \frac{1}{2^{1+\rho}} \right) \left(1 - \frac{1}{3^{1+\rho}} \right) \left(1 - \frac{1}{5^{1+\rho}} \right) \dots\dots \right]^{-1} \\ & = 1 + \frac{1}{2^{1+\rho}} + \frac{1}{3^{1+\rho}} + \frac{1}{4^{1+\rho}} + \dots\dots; \end{aligned}$$

откуда выходитъ

$$\begin{aligned} & -\log \left(1 - \frac{1}{2^{1+\rho}} \right) - \log \left(1 - \frac{1}{3^{1+\rho}} \right) - \log \left(1 - \frac{1}{5^{1+\rho}} \right) \dots \\ & = \log \left(1 + \frac{1}{2^{1+\rho}} + \frac{1}{3^{1+\rho}} + \frac{1}{4^{1+\rho}} + \dots \right), \end{aligned}$$

что по нашему знакоположенію напишется такъ

$$-\sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right) = \log \left(1 + \sum \frac{1}{m^{1+\rho}} \right);$$

слѣдовательно

$$\log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right) = \log \left(1 + \sum \frac{1}{m^{1+\rho}} \right) \rho;$$

а потому

$$\log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right) = \log \left[1 + \rho + \left(\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho} \right) \rho \right].$$

Изъ этого уравненія видно, что производныя

$$\log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right)$$

по ρ выразятся конечнымъ числомъ дробей, у которыхъ знаменателями будутъ цѣлыя, положительныя степени

$$1 + \rho + \left(\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho} \right) \rho,$$

а числители будутъ цѣлыя функціи количества ρ , выраженія $\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$ и производныхъ его по ρ . Но такія дроби съ приближеніемъ ρ къ 0 приближаются къ конечному предѣлу; ибо выраженіе $1 + \rho + \left(\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho} \right) \rho$, составляющее знаменателей этихъ дробей, съ приближеніемъ ρ къ 0 приближается къ 1 (потому, что $\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$, какъ доказали, при этомъ остается конечною величиною); функція же $\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}$ и производныя ея, входящія въ составъ числителей этихъ дробей, по доказанному нами, съ приближеніемъ ρ къ 0 приближаются къ конечнымъ предѣламъ.

Намъ остается теперь доказать это же относительно производныхъ

$$\sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right) + \sum \frac{1}{\mu^{1+\rho}}.$$

Для этого мы замѣчаемъ, что первая производная этой функціи есть

$$\sum \frac{1}{\mu^{2+\rho}} \cdot \frac{\log \mu}{1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}}.$$

По виду же этой функции не трудно замѣтить, что ея высшія производныя выразятся конечнымъ числомъ членовъ вида

$$\sum \frac{1}{\mu^{2+2\rho}} \cdot \frac{\log^p \mu}{1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}} \cdot \frac{1}{\mu^s \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right)^r},$$

гдѣ p, q, r, s , не ≤ 0 . Но каждый изъ такихъ членовъ для $\rho = 0$ и $\rho > 0$ имѣетъ конечную величину; ибо для $\rho = 0$ и $\rho > 0$ функция, состоящая подъ знакомъ $\sum$, относительно $\frac{1}{\mu}$ будетъ безконечно-малое порядка не ниже втораго.

Убѣдившись такимъ образомъ, что производныя отъ выраженій

$$\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho}, \quad \log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right), \\ \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) + \sum \frac{1}{\mu^{1+\rho}},$$

съ приближеніемъ ρ къ 0 приближаются къ конечнымъ предѣламъ, мы заключаемъ тоже и о выраженіи

$$\frac{d^n \left[\sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) + \sum \frac{1}{\mu^{1+\rho}} \right]}{d\rho^n} + \frac{d^n \left[\log \rho - \sum \log \left(1 - \frac{1}{\mu^{1+\rho}}\right) \right]}{d\rho^n} \\ + \frac{d^{n-1} \left(\sum \frac{1}{m^{1+\rho}} - \frac{1}{\rho} \right)}{d\rho^{n-1}},$$

которое по выполненіи дифференцірованія и сокращенія приводится къ слѣдующему

$$+ \left(\sum \frac{\log^n \mu}{\mu^{1+\rho}} - \sum \frac{\log^{n-1} m}{m^{1+\rho}} \right),$$

въ чемъ и заключается предложенная нами теорема; ибо, какъ не трудно замѣтить, по нашему знакоположенію выраженіе

$$\sum \frac{\log^n \mu}{\mu^{1+\rho}} - \sum \frac{\log^{n-1} m}{m^{1+\rho}}$$

тождественно выраженію

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

Въ самомъ дѣлѣ, послѣднее выраженіе есть разность двухъ

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} [\varphi(x+1) - \varphi(x)] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}, \quad \sum_{x=2}^{x=\infty} \frac{\log^{n-1} x}{x^{1+\rho}},$$

изъ которыхъ первое приводится къ $\sum \frac{\log^n \mu}{\mu^{1+\rho}}$ (суммѣ значеній $\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$, соотвѣствующихъ простымъ числамъ); ибо $\varphi(x+1)$ и $\varphi(x)$, означая число простыхъ чиселъ, меньшихъ $x+1$ и x , въ разности $\varphi(x+1) - \varphi(x)$ даютъ 1, когда x число простое и 0, если x число составное; второе же переменною x на m обращается въ $\sum \frac{\log^{n-1} m}{m^{1+\rho}}$.

Такъ убѣждаемся въ справедливости предложенной нами теоремы.

Изъ доказанной нами теоремы можно вывести многія любопытныя свойства функции, опредѣляющей число простыхъ чиселъ, меньшихъ даннаго предѣла. Для этого мы замѣчаемъ, что разность $\frac{1}{\log x} - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}$, при x большомъ, есть бесконечно малое относительно $\frac{1}{x}$ порядка перваго; а потому выраженіе

$$\left(\frac{1}{\log x} - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right) \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

при x большомъ будетъ относительно $\frac{1}{x}$ порядка $2+\rho$, и слѣд. при $\rho \neq -1$, сумма

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left(\frac{1}{\log x} - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right) \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

будетъ имѣть значеніе конечное. Складывая же эту сумму съ выраженіемъ

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

о которомъ сейчасъ доказали теорему 1-ю, на основаніи ея заключаемъ, что значеніе

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \frac{1}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}} dx$$

съ приближеніемъ ρ къ 0 приближается къ конечному предѣлу. А отсюда не трудно вывести слѣдующую теорему:

II. Т Е О Р Е М А.

Отъ $x=2$ до $x=\infty$ функція $\varphi(x)$, означающая число простыхъ чиселъ меньшихъ x , удовлетворяетъ безконечное число разъ и неравенству $\varphi(x) > \int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}$ и неравенству $\varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}$, какъ бы α , оставаясь количествомъ положительнымъ, ни было мало, а n ни было велико.

Доказательство. Мы ограничимся здѣсь доказательствомъ второго неравенства, первое докажется подобнымъ образомъ. Для доказательства, что неравенству

$$\varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x} \quad (1)$$

удовлетворяетъ безконечное множество чиселъ, допустимъ противное, и посмотримъ къ чему приведетъ насъ это допущеніе. Допустивъ, что неравенству (1) удовлетворяетъ конечное число чиселъ, положимъ, что a есть цѣлое число, превосходящее и количество e^n и наибольшее число, удовлетворяющее неравенству (1). Въ этомъ предположеніи для $x > a$ будетъ

$$\varphi(x) \geq \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}, \quad \log x > n,$$

и слѣд.

$$\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \geq \frac{\alpha x}{\log^n x}, \quad \frac{n}{\log x} < 1 \quad (2)$$

Но въ этомъ случаѣ, какъ сейчасъ увидимъ, въ противность доказанному нами значеніе выраженія

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

будетъ приближаться къ $+\infty$ съ приближеніемъ ρ къ 0.

Въ самомъ дѣлѣ, это выраженіе мы можемъ разсматривать какъ предѣлъ

$$\sum_{x=2}^{x=s} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}$$

при $s = \infty$. Предполагая же $s > a$, это выражение мы можем разсматривать какъ сумму

$$C + \sum_{x=a+1}^{x=s} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}}, \quad (3)$$

называя черезъ C сумму

$$\sum_{x=2}^{x=a} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

которая, очевидно, сохраняетъ конечное значеніе при $\rho = 0$ и $\rho > 0$.

Далѣе, по формулѣ

$$\sum_{a+1}^s u_x (v_{x+1} - v_x) = u_s v_{s+1} - u_a v_{a+1} - \sum_{a+1}^s v_x (u_x - u_{x-1}),$$

полагая

$$v_x = \varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}, \quad u_x = \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

выраженіе (3) преобразуемъ въ такое

$$C - \left[\varphi(a+1) - \int_2^{a+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n a}{a^{1+\rho}} + \left[\varphi(s+1) - \int_2^{s+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n s}{s^{1+\rho}} - \sum_{x=a+1}^{x=s} \left[\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right] \left[\frac{\log^n x}{x^{1+\rho}} - \frac{\log^n (x-1)}{(x-1)^{1+\rho}} \right],$$

а это, называя черезъ θ количество > 0 и < 1 , можемъ написать такъ

$$C - \left[\varphi(a+1) - \int_2^{a+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n a}{a^{1+\rho}} + \left[\varphi(s+1) - \int_2^{s+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n s}{s^{1+\rho}} + \sum_{x=a+1}^{x=s} \left[\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right] \left[1 + \rho - \frac{n}{\log(x-\theta)} \right] \frac{\log^n (x-\theta)}{(x-\theta)^{2+\rho}}.$$

Полагая же два первые члена этого выраженія равными F , и замѣчая по (2), что третій членъ > 0 , мы убѣждаемся, что все это выраженіе болѣе

$$F + \sum_{x=a+1}^{x=s} \left[\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right] \left[1 + \rho - \frac{n}{\log(x-\theta)} \right] \frac{\log^n (x-\theta)}{(x-\theta)^{2+\rho}}.$$

Изъ тѣхъ же неравенствъ (2) видно, что здѣсь подѣ знакомъ суммы, въ предѣлахъ суммированія, функція сохраняетъ

знакъ $+$. Притомъ въ предѣлахъ суммированія будетъ во 1-хъ) $1 + \rho - \frac{n}{\log(x-\theta)}$ болѣе $1 - \frac{n}{\log a}$; ибо $\rho > 0$, x не $< a + 1$, $\theta < 1$; во 2) $\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}$ болѣе $\frac{\alpha(x-\theta)}{\log^n(x-\theta)}$; ибо $\varphi(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x}$ не меньше $\frac{\alpha x}{\log^n x}$ по первому изъ неравенствъ (2), а по второму производная $\frac{\alpha x}{\log^n x}$, которая есть $\frac{\alpha}{\log^n x} \left(1 - \frac{n}{\log x}\right)$, болѣе 0, вслѣдствіе чего $\frac{\alpha x}{\log^n x} > \frac{\alpha(x-\theta)}{\log^n(x-\theta)}$.

А потому предыдущее выраженіе болѣе

$$F + \sum_{x=a+1}^{x=s} \frac{\alpha(x-\theta)}{\log^n(x-\theta)} \left(1 - \frac{n}{\log a}\right) \frac{\log^n(x-\theta)}{(x-\theta)^{2+\rho}}.$$

Но это по сокращеніи приводится къ слѣдующему

$$F + \alpha \left(1 - \frac{n}{\log a}\right) \sum_{x=a+1}^{x=s} \frac{1}{(x-\theta)^{1+\rho}},$$

что, очевидно, болѣе

$$F + \alpha \left(1 - \frac{n}{\log a}\right) \sum_{x=a+1}^{x=s} \frac{1}{x^{1+\rho}}.$$

А это для $s = \infty$ будетъ

$$F + \alpha \left(1 - \frac{n}{\log a}\right) \sum_{x=a+1}^{x=\infty} \frac{1}{x^{1+\rho}},$$

и съ помощію опредѣленныхъ интеграловъ напишется такъ

$$F + \alpha \left(1 - \frac{n}{\log a}\right) \frac{\int_0^\infty \frac{e^{-ax}}{e^x - 1} x^\rho dx}{\int_0^\infty e^{-x} x^\rho dx}.$$

Но это выраженіе, очевидно, съ уменьшеніемъ ρ приближается къ $+\infty$; ибо $\int_0^\infty \frac{e^{-ax}}{e^x - 1} dx = +\infty$, $\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$, а α по положенію и $1 - \frac{n}{\log a}$ вслѣдствіе (2) суть количества положительныя.

Убѣдившись такимъ образомъ, что въ сдѣланномъ нами предположеніи не только сумма

$$\sum_{x=2}^{x=\infty} \left[\varphi(x+1) - \varphi(x) - \int_2^{x+1} \frac{dx}{\log x} \right] \frac{\log^n x}{x^{1+\rho}},$$

но и количество меньшее его съ приближеніемъ ρ къ 0 приближается къ $-\infty$, мы заключаемъ о несправедливости его, что и слѣдовало доказать.

На основаніи предыдущей теоремы легко доказать слѣдующую:

III. Т Е О Р Е М А.

Выраженіе $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x = \infty$ не можетъ имѣть предѣловъ количество отличное отъ -1 .

Доказательство. Пусть будетъ L предѣлъ значенія $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x = \infty$. Въ этомъ предположеніи мы всегда найдемъ число N столь большое, что при $x > N$ значеніе $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ не будетъ выходить изъ предѣловъ $L - \varepsilon$ и $L + \varepsilon$, какъ бы ε ни было мало. Слѣд. для такихъ величинъ x , при $\varepsilon > 0$, будетъ

$$\frac{x}{\varphi(x)} - \log x > L - \varepsilon, \quad \frac{x}{\varphi(x)} - \log x < L + \varepsilon \quad (4)$$

Но по предыдущей теоремѣ, неравенства

$$\varphi(x) > \int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}, \quad \varphi(x) < \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}$$

удовлетворяются при безконечномъ множествѣ величинъ x и слѣд. при нѣкоторыхъ числахъ $x > N$, для которыхъ имѣютъ мѣсто неравенства (4). Но эти неравенства въ соединеніи съ послѣдними даютъ

$$\frac{x}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}} - \log x > L - \varepsilon, \quad \frac{x}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}} - \log x < L + \varepsilon;$$

откуда выходитъ

$$L + 1 < \frac{x - (\log x - 1) \left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x} \right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} - \frac{\alpha x}{\log^n x}} + \varepsilon,$$

$$L + 1 > \frac{x - (\log x - 1) \left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x} \right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}} - \varepsilon.$$

Изъ этихъ неравенствъ видно, что численная величина $L+1$ не превосходитъ численной величины одного изъ выражений

$$\frac{x - (\log x - 1) \left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} \pm \frac{\alpha x}{\log^n x} \right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} \pm \frac{\alpha x}{\log^n x}} \pm \varepsilon.$$

Но количество ε можетъ быть сдѣлано, какъ замѣтили, по произволу мало предположеніемъ N чрезвычайно большимъ, тоже случается при увеличиваніи x съ выраженіемъ

$$\frac{x - (\log x - 1) \left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} \pm \frac{\alpha x}{\log^n x} \right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} \pm \frac{\alpha x}{\log^n x}};$$

ибо въ предѣлѣ этихъ выраженій для $x = \infty$ по извѣстнымъ приѣмамъ дифференціального исчисления мы открываемъ 0.

Убѣдясь такимъ образомъ, что выраженіе

$$\frac{x - (\log x - 1) \left(\int_2^x \frac{dx}{\log x} \pm \frac{\alpha x}{\log^n x} \right)}{\int_2^x \frac{dx}{\log x} \pm \frac{\alpha x}{\log^n x}} \pm \varepsilon,$$

опредѣляющее высшій предѣлъ численной величины $L+1$, можетъ быть сдѣлано по произволу малымъ, мы по способу предѣловъ заключаемъ, что $L+1=0$, а потому $L=-1$, что и слѣдовало доказать.

Доказанное нами относительно предѣла значеній $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x = \infty$ противорѣчитъ формулѣ, предложенной Лежандромъ для приближеннаго опредѣленія числа простыхъ чиселъ меньшихъ даннаго. По его мнѣнію при x большомъ значеніе $\varphi(x)$ можетъ быть опредѣлено съ достаточною точностію уравненіемъ

$$\varphi(x) = \frac{x}{\log x - 1,08366}.$$

Но отсюда для предѣла $\frac{x}{\varphi(x)} - \log x$ при $x = \infty$ находимъ $-1,08366$, вмѣсто -1 .

На основаніи теоремы II можно показать высшій предѣлъ точности, съ которою функція $\varphi(x)$, опредѣляющая число про-

стыхъ чиселъ меньшихъ x , можетъ быть представлена какою либо данною функциею fx . При этомъ разность $fx - \varphi(x)$ мы будемъ сравнивать съ выраженіями

$$\frac{x}{\log x}, \frac{x}{\log^2 x}, \frac{x}{\log^3 x}, \dots$$

и для сокращенія будемъ называть A количествомъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$, если отношеніе A къ $\frac{x}{\log^m x}$ при $x = \infty$ будетъ ∞ для $m > n$ и 0 для $m < n$. Условившись въ этомъ, мы докажемъ слѣдующую теорему:

IV. ТЕОРЕМА.

Если выраженіе

$$\frac{\log^n x}{x} \left(fx - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right),$$

при $x = \infty$ имѣетъ предѣломъ количество конечное или безконечность; то fx не можетъ представить $\varphi(x)$ вѣрно до количества порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно.

Доказательство. Пусть будетъ L предѣлъ, къ которому значеніе

$$\frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right)$$

приближается съ приближеніемъ x къ ∞ . Количество L , не будучи 0 по положенію, можетъ быть или количествомъ положительнымъ, или отрицательнымъ. Мы его предположимъ, количествомъ положительнымъ; но сужденія наши безъ затрудненія приложатся и къ случаю $L < 0$.

Если значеніе

$$\frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right)$$

съ приближеніемъ x къ ∞ имѣетъ предѣломъ L , большее 0, то мы найдемъ число N столь большое, что для $x > N$ значеніе $\frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right)$ останется постоянно болѣе нѣкотораго

положительнаго количества l . Слѣд. предполагая $x > N$, мы будемъ имѣть

$$\frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right) > l \quad (5)$$

Но по II теоремѣ, какъ бы $\alpha = \frac{l}{2}$ ни было мало, для безконечнаго множества чиселъ будетъ имѣть мѣсто такое неравенство

$$\varphi(x) \leq \int_2^x \frac{dx}{\log x} + \frac{\alpha x}{\log^n x}, \quad (6)$$

которое дастъ

$$f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} < f(x) - \varphi(x) + \frac{\alpha x}{\log^n x},$$

что по умноженіи на $\frac{\log^n x}{x}$ и по положеніи $\alpha = \frac{l}{2}$ будетъ

$$\frac{\log^n x}{x} \left[f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right] < \frac{\log^n x}{x} [f(x) - \varphi(x)] + \frac{l}{2},$$

а отсюда вслѣдствіе неравенства (5) выходитъ

$$\frac{\log^n x}{x} [f(x) - \varphi(x)] > \frac{l}{2}.$$

Но это неравенство, существуя вмѣстѣ съ неравенствами (5) и (6) для безконечнаго множества чиселъ, по причинѣ $\frac{l}{2} > 0$ обнаруживаетъ, что предѣлъ

$$\frac{\log^n x}{x} [f(x) - \varphi(x)]$$

при $x = \infty$ не есть нуль. Если же этотъ предѣлъ отличенъ отъ 0; то разность $f(x) - \varphi(x)$ по сдѣланному нами опредѣленію есть количество порядка $\frac{x}{\log^n x}$ или низшаго; и слѣд. $f(x)$ разнится съ $\varphi(x)$ или количествомъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$, или порядка низшаго, что и слѣдовало доказать.

На основаніи этой теоремы мы узнаемъ, что формула Лезандра $\frac{x}{\log x - 1,08366}$, для которой

$$\frac{\log^2 x}{x} \left(\frac{x}{\log x - 1,08366} - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right)$$

при $x = \infty$ имѣетъ предѣломъ величину 0,08366, не можетъ

выражать $\varphi(x)$, число простых чиселъ, меньшихъ x , вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^2 x}$ включительно.

Также не трудно показать на основаніи этой теоремы величины постоянныхъ A и B , при которыхъ функція $\frac{x}{A \log x + B}$ могла бы выражать $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^2 x}$ включительно. По предыдущей теоремѣ такія величины A и B должны удовлетворять уравненію

$$\lim. \left[\frac{\log^2 x}{x} \left(\frac{x}{A \log x + B} - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right) \right]_{x=\infty} = 0.$$

Но разложеніемъ $\frac{x}{A \log x + B}$ въ рядъ находимъ

$$\frac{x}{A \log x + B} = \frac{1}{A} \cdot \frac{x}{\log x} - \frac{B}{A^2} \cdot \frac{x}{\log^2 x} + \frac{B^2}{A^3} \cdot \frac{x}{\log^3 x} - \dots$$

Интегрируя же $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ по частямъ, имѣемъ

$$\int_2^x \frac{dx}{\log x} = \frac{x}{\log x} + \frac{x}{\log^2 x} + 2 \int_2^x \frac{dx}{\log^3 x} + C.$$

Вслѣдствіе чего предыдущее уравненіе измѣняется въ слѣдующее

$$\lim. \left\{ \frac{\log^2 x}{x} \left(\frac{1}{A} \cdot \frac{x}{\log x} - \frac{B}{A^2} \cdot \frac{x}{\log^2 x} + \frac{B^2}{A^3} \cdot \frac{x}{\log^3 x} - \dots \right) - \dots - \frac{x}{\log x} - \frac{x}{\log^2 x} - 2 \int_2^x \frac{dx}{\log^3 x} - C \right\}_{x=\infty} = 0,$$

что приводится къ такому уравненію

$$\lim. \left\{ \left(\frac{1}{A} - 1 \right) \log x - \left(\frac{B}{A^2} + 1 \right) + \frac{B^2}{A^3} \frac{1}{\log x} - \dots \right\}_{x=\infty} = 0.$$

Замѣчая же, что здѣсь всѣ члены, начиная съ третьяго, приближаются къ 0 съ увеличеніемъ x , мы убѣждаемся, что это уравненіе можетъ быть удовлетворено только предположеніемъ $\frac{1}{A} - 1 = 0$, $\frac{B}{A^2} + 1 = 0$. Откуда $A = 1$, $B = -1$.

Итакъ изъ функцій вида $\frac{x}{A \log x + B}$ одна функція $\frac{x}{\log x - 1}$

могла бы выразить $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^2 x}$ включительно.

Что же касается до выбора функціи, наиболее выражающей $\varphi(x)$, число простыхъ чиселъ меньшихъ даннаго числа, то относительно ея можно доказать такую теорему.

V. Т Е О Р Е М А.

Если функція $\varphi(x)$, определяющая число простыхъ чиселъ меньшихъ x , можетъ быть выражена вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно алгебраически въ x , $\log x$, e^x ; то такое выраженіе ея есть

$$\frac{x}{\log x} + \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} + \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x} + \dots + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \cdot x}{\log^n x}.$$

Доказательство. Пусть будетъ $f(x)$ та функція, которая, заключая алгебраически x , $\log x$, e^x , выражаетъ $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно; выраженіе

$$\frac{\log^n x}{x} \left[f(x) - \frac{x}{\log x} - \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} - \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x} - \dots - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \cdot x}{\log^n x} \right]$$

съ увеличеніемъ x должно приближаться къ какому либо предѣлу конечному или бесконечно великому; ибо въ противномъ случаѣ первая производная этого выраженія съ увеличеніемъ x до ∞ мѣняла бы свой знакъ бесконечное число разъ; а это, какъ легко замѣтить, не можетъ случиться съ функціею алгебраическою отъ x , $\log x$, e^x *).

*) Что алгебраическая функція отъ x , $\log x$, e^x перестаетъ мѣнять свой знакъ при x , превосходящемъ нѣкоторый предѣлъ, въ этомъ не трудно убѣдиться. Для функціи цѣлой это ясно; знакъ такой функціи при довольно большомъ x будетъ зависѣть отъ одного члена вида $kx^m \cdot \log^m x \cdot e^{m'x}$, который не мѣняетъ знака при $x > 1$. Для всякой же другой алгебраической функціи x , $\log x$, e^x , которая пусть будетъ y , это докажется такимъ образомъ. Функція y вообще будетъ корнемъ уравненія $u_0 y^m + u_1 y^{m-1} + \dots + u_{m-1} y + u_m = 0$, и если v будетъ функція, получаемая черезъ исключеніе y изъ предыдущаго уравненія и первой производной его по x , то

Итакъ для $\varphi(x)$ необходимо будетъ

$$\lim. \left\{ \frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \frac{x}{\log x} - \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} - \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x} - \dots \right) \right\}_{x=\infty} = L \quad (7)$$

Но съ другой стороны не трудно убѣдиться, что

$$\lim. \left[\frac{\log^n x}{x} \left(\frac{x}{\log x} + \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} + \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x} + \dots \right. \right. \\ \left. \left. \dots + \frac{1 \cdot 2 \dots (n-1)x}{\log^n x} - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right) \right]_{x=\infty} = 0,$$

а это уравненіе, сложенное съ предыдущимъ, даетъ

$$\lim. \left[\frac{\log^n x}{x} \left(f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right) \right]_{x=\infty} = L.$$

Но такъ какъ по положенію $f(x)$ выражаетъ $\varphi(x)$ вѣрно до количества порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно; а по предыдущей теоремѣ это не можетъ имѣть мѣсто, если предѣлъ значенія

$$\frac{\log^n x}{x} \left[f(x) - \int_2^x \frac{dx}{\log x} \right],$$

при $x = \infty$ не есть 0. Слѣд. $L = 0$, и уравненіе (7) даетъ

$$\lim. \left\{ \frac{\log^n x}{x} \left[f(x) - \frac{x}{\log x} - \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} - \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x} - \dots \right. \right. \\ \left. \left. \dots - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1)x}{\log^n x} \right] \right\}_{x=\infty} = 0,$$

а это показываетъ, что функція

$$\frac{x}{\log x} + \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} + \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x} + \dots + \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1)x}{\log^n x}$$

не разнится съ $f(x)$ количествами порядка $\frac{x}{\log^n x}$ и низшими, и слѣд. что она подобно $f(x)$ можетъ выражать $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log^n x}$ включительно, что и требовалось доказать.

Функціи u_0 , u_m , v , какъ цѣлыя, перестанутъ мѣнять свой знакъ и обращаться въ 0 при x превосходящемъ нѣкоторый предѣлъ; а при этомъ и y будетъ сохранять свой знакъ; ибо при величинахъ x , необращающихъ v въ нуль, не можетъ имѣть уравненіе равныхъ корней; а при неравенствѣ корней знакъ одного изъ нихъ можетъ перемѣниться только съ перемѣною знака u_0 или u_m . Это свойства можетъ быть также доказано и для многихъ другихъ функцій и на всѣ эти функціи будетъ распространяться теорема V и заключенія изъ нея вытекающія.

На основаніи доказанной нами теоремы мы заключаемъ, что если $\varphi(x)$, функція, опредѣляющая число простыхъ чиселъ менѣшихъ x , можетъ быть выражена алгебраически въ x , $\log x$, e^x вѣрно до количествъ порядковъ $\frac{x}{\log x}$, $\frac{x}{\log^2 x}$, $\frac{x}{\log^3 x}$, включительно; то такое выраженіе ея есть

$$\frac{x}{\log x}, \frac{x}{\log x} + \frac{1 \cdot x}{\log^2 x}, \frac{x}{\log x} + \frac{1 \cdot x}{\log^2 x} + \frac{1 \cdot 2 \cdot x}{\log^3 x}, \dots$$

А такъ какъ эти функціи суть ничто иное, какъ значеніе интеграла $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ вѣрно до количествъ порядка $\frac{x}{\log x}$, $\frac{x}{\log^2 x}$, $\frac{x}{\log^3 x}$, . . .; то во всѣхъ этихъ предположеніяхъ интегралъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ будетъ выражать $\varphi(x)$ вѣрно до количествъ такого порядка, до какого она способна выразиться алгебраически въ x , $\log x$, e^x . Что интегралъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ при x большомъ выражаетъ довольно близко число простыхъ чиселъ, меньшихъ x , въ этомъ мы легко убѣждаемся помощію таблицъ простыхъ чиселъ. Но эти таблицы, доселѣ составленныя, слишкомъ малы, чтобы видѣть изъ нихъ превосходство формулы $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ предъ формулою Лежандра $\frac{x}{\log x - 1,08366}$ или подобными ей. Въ предѣлахъ этихъ таблицъ функція $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$, $\frac{x}{\log x - 1,08366}$ мало разнятся; но разность ихъ $\frac{x}{\log x - 1,08366} - \int_2^x \frac{dx}{\log x}$, имѣя *minimum* при $x = e^{\frac{(1,08366)^2}{0,08366}} = 1247689$, послѣ него постоянно возрастаетъ до ∞ и при $x > 10000000$ получаетъ уже довольно большую величину. При этихъ-то величинахъ x можно будетъ обнаружить преимущество формулы $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$ предъ $\frac{x}{\log x - 1,08366}$. Но для этого потребна таблица простыхъ чиселъ гораздо обширнѣе тѣхъ, которыя мы до сихъ поръ имѣемъ.

Принявши для приближеннаго опредѣленія $\varphi(x)$ интегралъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$, мы должны будемъ измѣнить всѣ формулы Лежандра,

выведенныя имъ въ предположеніи $\varphi(x) = \frac{x}{\log x - 1,08366}$, и формулы наши будутъ не сложнѣе его. Вслѣдствіе же доказанныхъ нами теоремъ онѣ должны быть ближе къ истинѣ.

Для примѣра мы найдемъ здѣсь приближенныя формулы для опредѣленія значеній

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{X},$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{X}\right)$$

при X большомъ.

Для опредѣленія перваго мы замѣчаемъ, что по нашему зна-
коположенію будетъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=X} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x},$$

ибо $\varphi(x)$, означая число простыхъ чиселъ меньшихъ x , въ разности $\varphi(x+1) - \varphi(x)$ даетъ 0, когда x число составное и 1, когда оно простое.

Предполагая X числомъ большимъ, назовемъ λ какое нибудь число менѣе X , но еще довольно значительное, дабы въ предѣлахъ $x = \lambda$ и $x = X$, мы могли съ достаточною точностію замѣнить $\varphi(x)$ интеграломъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$. Въ этомъ предположеніи предыдущее уравненіе напишется такъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} +$$

$$\sum_{x=\lambda}^{x=X} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x}.$$

Замѣняя же здѣсь во второй суммѣ $\varphi(x)$ интеграломъ $\int_2^x \frac{dx}{\log x}$, найдемъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} + \sum_{x=\lambda}^{x=X} \frac{\int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}}{x}.$$

Но вѣрно до количества порядка $\frac{1}{x}$ интеграль $\int_x^{x+1} \frac{dx}{\log x}$

можетъ быть замѣненъ выраженіемъ $\frac{1}{\log x}$, и съ такою же точностью сумма $\sum_{x=\lambda}^{x=X} \frac{1}{x \log x}$ можетъ быть замѣнена интеграломъ $\int_{\lambda}^X \frac{dx}{x \log x}$.

Но такую переменную предыдущее уравненіе приводится къ слѣдующему

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} + \int_{\lambda}^X \frac{dx}{x \log x},$$

что по выполненіи интегрированія даетъ

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} = \sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} - \log \log \lambda + \log \log X,$$

или

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} = C + \log \log X \quad (8),$$

полагая C равнымъ количеству $\sum_{x=2}^{x=\lambda-1} \frac{\varphi(x+1) - \varphi(x)}{x} - \log \log \lambda$, не зависящему отъ X .

Вотъ уравненіе, которое по опредѣленіи постояннаго C , можетъ намъ служить для приближеннаго вычисленія суммы

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X},$$

когда X велико.

Наше выраженіе этой суммы проще выраженія ея у Лежандра, которое такого вида

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} = \log (\log X - 0,08366) + C.$$

Теперь переходимъ къ опредѣленію произведенія

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{X}\right) = P.$$

Полагая это произведеніе равнымъ P , и взявъ логарифмы отъ обѣихъ частей уравненія

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{X}\right) = P,$$

находимъ

$$\log P = \log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \dots \\ \dots + \log\left(1 - \frac{1}{X}\right),$$

что иначе напишется такъ

$$\log P = -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X}\right) + \frac{1}{2} + \log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \\ \frac{1}{3} + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \log\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \dots + \frac{1}{X} + \log\left(1 - \frac{1}{X}\right).$$

А здѣсь вѣрно до количествъ порядка $\frac{1}{X}$ можемъ замѣнить конечный рядъ

$$\frac{1}{2} + \log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3} + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \log\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \dots \\ \dots + \frac{1}{X} + \log\left(1 - \frac{1}{X}\right)$$

рядомъ безконечнымъ

$$\frac{1}{2} + \log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3} + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \log\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \dots;$$

ибо, по числовой величинѣ, разность этихъ рядовъ меньше

$$\frac{1}{X+1} + \log\left(1 - \frac{1}{X+1}\right) + \frac{1}{X+2} + \log\left(1 - \frac{1}{X+2}\right) + \dots,$$

а это меньше интеграла $\int_X^\infty \left[\frac{1}{x} + \log\left(1 - \frac{1}{x}\right)\right] dx$, который равенъ $-1 - (X-1) \log\left(1 - \frac{1}{X}\right)$, и котораго величина при X большомъ есть безконечно малое относительно $\frac{1}{X}$ первого порядка.

Итакъ до количества порядка $\frac{1}{X}$ въ предыдущемъ выраженіи $\log P$ мы можемъ замѣнить конечную сумму

$$\frac{1}{2} + \log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3} + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \log\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \dots \\ \dots + \frac{1}{X} + \log\left(1 - \frac{1}{X}\right)$$

безконечнымъ рядомъ

$$\frac{1}{2} + \log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3} + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \log\left(1 - \frac{1}{5}\right) + \dots,$$

и называя для сокращенія величину послѣдняго черезъ C' , мы предыдущее выраженіе $\log P$ представимъ такъ

$$\log P = - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X} \right) + C'.$$

Внеся же сюда значеніе

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{X}$$

изъ (8), найдемъ

$$\log P = - C - \log \log X + C',$$

откуда выходитъ

$$P = \frac{e^{C'-C}}{\log X};$$

полагая же для сокращенія $e^{C'-C} = C_0$ и замѣняя P его величиною $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{X}\right)$, имѣемъ

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{X}\right) = \frac{C_0}{\log X}.$$

Вмѣсто этой формулы Лежандръ нашелъ такую

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{X}\right) = \frac{C_0}{\log X - 0,08366}.$$



ТАБЛИЦА ПРОСТЫХЪ ЧИСЕЛЪ,

НЕ ПРЕВОСХОДЯЩИХЪ 6000.

2	127	283	467	661	877	1087
3	131	293	479	673	881	1091
5	137	307	487	677	883	1093
7	139	311	491	683	887	1097
11	149	313	499	691	907	1103
13	151	317	503	701	911	1109
17	157	331	509	709	919	1117
19	163	337	521	719	929	1123
23	167	347	523	727	937	1129
29	173	349	541	733	941	1151
31	179	353	547	739	947	1153
37	181	359	557	743	953	1163
41	191	367	563	751	967	1171
43	193	373	569	757	971	1181
47	197	379	571	761	977	1187
53	199	383	577	769	983	1193
59	211	389	587	773	991	1201
61	223	397	593	787	997	1213
67	227	401	599	797	1009	1217
71	229	409	601	809	1013	1223
73	233	419	607	811	1019	1229
79	239	421	613	821	1021	1231
83	241	431	617	823	1031	1237
89	251	433	619	827	1033	1249
97	257	439	631	829	1039	1259
101	263	443	641	839	1049	1277
103	269	449	643	853	1051	1279
107	271	457	647	857	1061	1283
109	277	461	653	859	1063	1289
113	281	463	659	863	1069	1291

1297	1523	1741	1993	2221	2437	2689
1301	1531	1747	1997	2237	2441	2693
1303	1543	1753	1999	2239	2447	2699
1307	1549	1759	2003	2243	2459	2707
1319	1553	1777	2011	2251	2467	2711
1321	1559	1783	2017	2267	2473	2713
1327	1567	1787	2027	2269	2477	2719
1361	1571	1789	2029	2273	2503	2729
1367	1579	1801	2039	2281	2521	2731
1373	1583	1811	2053	2287	2531	2741
1381	1597	1823	2063	2293	2539	2749
1399	1601	1831	2069	2297	2543	2753
1409	1607	1847	2081	2309	2549	2767
1423	1609	1861	2083	2311	2551	2777
1427	1613	1867	2087	2333	2557	2789
1429	1619	1871	2089	2339	2579	2791
1433	1621	1873	2099	2341	2591	2797
1439	1627	1877	2111	2347	2593	2801
1447	1637	1879	2113	2351	2609	2803
1451	1657	1889	2129	2357	2617	2819
1453	1663	1901	2131	2371	2621	2833
1459	1667	1907	2137	2377	2633	2837
1471	1669	1913	2141	2381	2647	2843
1481	1693	1931	2143	2383	2657	2851
1483	1697	1933	2153	2389	2659	2857
1487	1699	1949	2161	2393	2663	2861
1489	1709	1951	2179	2399	2671	2879
1493	1721	1973	2203	2411	2677	2887
1499	1723	1979	2207	2417	2683	2897
1511	1733	1987	2213	2423	2687	2903

2909	3187	3433	3659	3911	4153	4421
2917	3191	3449	3671	3917	4157	4423
2927	3203	3457	3673	3919	4159	4441
2939	3209	3461	3677	3923	4177	4447
2953	3217	3463	3691	3929	4201	4451
2957	3221	3467	3697	3931	4211	4457
2963	3229	3469	3701	3943	4217	4463
2969	3251	3491	3709	3947	4219	4481
2971	3253	3499	3719	3967	4229	4483
2999	3257	3511	3727	3989	4231	4493
3001	3259	3517	3733	4001	4241	4507
3011	3271	3527	3739	4003	4243	4513
3019	3299	3529	3761	4007	4253	4517
3023	3301	3533	3767	4013	4259	4519
3037	3307	3539	3769	4019	4261	4523
3041	3313	3541	3779	4021	4271	4547
3049	3319	3547	3793	4027	4273	4549
3061	3323	3557	3797	4049	4283	4561
3067	3329	3559	3803	4051	4289	4567
3079	3331	3571	3821	4057	4297	4583
3083	3343	3581	3823	4073	4327	4591
3089	3347	3583	3833	4079	4337	4597
3109	3359	3593	3847	4091	4339	4603
3119	3361	3607	3851	4093	4349	4621
3121	3371	3613	3853	4099	4357	4637
3137	3373	3617	3863	4111	4363	4639
3163	3389	3623	3877	4127	4373	4643
3167	3391	3631	3881	4129	4391	4649
3169	3407	3637	3889	4133	4397	4651
3181	3413	3643	3907	4139	4409	4657

4663	4943	5189	5449	5701	5953
4673	4951	5197	5471	5711	5981
4679	4957	5209	5477	5717	5987
4691	4967	5227	5479	5737	
4703	4969	5231	5483	5741	
4721	4973	5233	5501	5743	
4723	4987	5237	5503	5749	
4729	4993	5261	5507	5779	
4733	4999	5273	5519	5783	
4751	5003	5279	5521	5791	
4759	5009	5281	5527	5801	
4783	5011	5297	5531	5807	
4787	5021	5303	5557	5813	
4789	5023	5309	5563	5821	
4793	5039	5323	5569	5827	
4799	5051	5333	5573	5839	
4801	5059	5347	5581	5843	
4813	5077	5351	5591	5849	
4817	5081	5381	5623	5851	
4831	5087	5387	5639	5857	
4861	5099	5393	5641	5861	
4871	5101	5399	5647	5867	
4877	5107	5407	5651	5869	
4889	5113	5413	5653	5879	
4903	5119	5417	5657	5881	
4909	5147	5419	5659	5897	
4919	5153	5431	5669	5903	
4931	5167	5437	5683	5923	
4933	5171	5441	5689	5927	
4937	5179	5443	5693	5939	

ТАБЛИЦЫ

ПЕРВООБРАЗНЫХЪ КОРНЕЙ И УКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОСТЫХЪ МОДУЛЕЙ, НЕ ПРЕВОСХОДЯЩИХЪ 200.

Простое число 3.

ПЕРВООБР. КОРЕНЬ 2. ОСНОВАНИЕ 2.

I.

N.	1	2
	0	1

N.

I.	0	1
	1	2

Простое число 5.

Первообразные корни: 2, 3.

ОСНОВАНИЕ 2.

I.

N.	1	2	3	4
	0	1	3	2

N.

I.	0	1	2	3
	1	2	4	3

Простое число 7.

Первообразные корни: 3, 5.

ОСНОВАНИЕ 3.

I.

N.	1	2	3	4	5	6
	0	2	1	4	5	3

N.

I.	0	1	2	3	4	5
	1	3	2	6	4	5

Простое число 11.

Первообразные корни: 2, 6, 7, 8.

ОСНОВАНИЕ 2.

I.

N.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	1	8	2	4	9	7	3	6	5

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Простое число 13.

Первообразные корни: 2, 6, 7, 11.

ОСНОВАНИЕ 6.

I.

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	5	8	10	9	1	7	3	4
1	2	11	6							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	6	10	8	9	2	12	7	3	5
1	4	11								

Простое число 17.

Первообразные корни: 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	10	11	4	7	5	9	14	6
1	1	13	15	12	3	2	8			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	15	14	4	6	9	5	16	7
1	2	3	13	11	8	12				

Простое число 19.

Первообразные корни: 2, 3, 10, 13, 14, 15.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	17	5	16	2	4	12	15	10
1	1	6	3	13	11	7	14	8	9	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	5	12	6	3	11	15	17	18
1	9	14	7	13	16	8	4	2		

Простое число 23.

Первообразные корни: 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	8	20	16	15	6	21	2	18
1	1	3	14	12	7	13	10	17	4	5
2	9	19	11							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	8	11	18	19	6	14	2	20
1	16	22	13	15	12	5	4	17	9	21
2	3	7								

Простое число 29.

Первообр. корни: 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	11	27	22	18	10	20	5	26
1	1	23	21	2	3	17	16	7	9	15
2	12	19	6	24	4	8	13	25	14	

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	13	14	24	8	22	17	25	18
1	6	2	20	26	28	19	16	15	5	21
2	7	12	4	11	23	27	9	3		

Простое число 31.

Первообразные корни: 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24.

ОСНОВАНИЕ 17.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	12	13	24	20	25	4	6	26
1	2	29	7	23	16	3	18	1	8	22
2	14	17	11	21	19	10	5	9	28	27
3	15									

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	17	10	15	7	26	8	12	18	27
1	25	22	2	3	20	30	14	21	16	24
2	5	23	19	13	4	6	9	29	28	11

Простое число 37.

Первообр. корни: 2, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 3 5

ОСНОВАНИЕ 5.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	11	34	22	1	9	28	33	32
1	12	6	20	13	3	35	8	5	7	25
2	23	26	17	21	31	2	24	30	14	15
3	10	27	19	4	16	29	18			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	5	25	14	33	17	11	18	16	6
1	30	2	10	13	28	29	34	22	36	32
2	12	23	4	20	26	19	21	31	7	35
3	27	24	9	8	3	15				

Простое число 41.

Первообразные корни: 6, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35.

ОСНОВАНИЕ 6.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	26	15	12	22	1	39	38	30
1	8	3	27	31	25	37	24	33	16	9
2	34	14	29	36	13	4	17	5	11	7
3	23	28	10	18	19	21	2	32	35	6
4	20									

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	6	36	11	25	27	39	29	10	19
1	32	28	4	24	21	3	18	26	33	34
2	40	35	5	30	16	14	2	12	31	22
3	9	13	37	17	20	38	23	15	8	7

Простое число 43.

Первообр. корни: 3, 5, 12, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 33, 34.

ОСНОВАНИЕ 28.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	39	17	36	5	14	7	33	34
1	2	6	11	40	4	22	30	16	31	29
2	41	24	3	20	8	10	37	9	1	25
3	19	32	27	23	13	12	28	35	26	15
4	38	18	21							

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	28	10	22	14	5	11	7	24	27
1	25	12	35	34	6	39	17	3	41	30
2	23	42	15	33	21	29	38	32	36	19
3	16	18	31	8	9	37	4	26	40	2
4	13	20								

Простое число 47.

Первообр. корни: 5, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	30	18	14	17	2	38	44	36
1	1	27	32	3	22	35	28	42	20	29
2	31	10	11	39	16	34	33	8	6	43
3	19	5	12	45	26	9	4	24	13	21
4	15	25	40	37	41	7	23			

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	6	13	36	31	28	45	27	35
1	21	22	32	38	4	40	24	5	3	30
2	18	39	14	46	37	41	34	11	16	19
3	2	20	12	26	25	15	9	43	7	23
4	42	44	17	29	8	33				

Простое число 53.

Первообразные корни: 2, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 48, 50, 51.

ОСНОВАНИЕ 26.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	25	9	50	31	34	38	23	18
1	4	46	7	28	11	40	48	42	43	41
2	29	47	19	39	32	10	1	27	36	6
3	13	45	21	3	15	17	16	22	14	37
4	2	33	20	30	44	49	12	8	5	24
5	35	51	26							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	26	40	33	10	48	29	12	47
1	25	14	46	30	38	34	36	35	9	22
2	42	32	37	8	49	2	52	27	13	20
3	43	5	24	41	6	50	28	39	7	23
4	15	19	17	18	44	31	11	21	16	45
5	4	51								

Простое число 59.

Первообразные корни: 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 56.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	25	32	50	34	57	44	17	6
1	1	45	24	23	11	8	42	14	31	22
2	26	18	12	27	49	10	48	38	36	4
3	33	7	9	19	39	20	56	41	47	55
4	51	2	43	13	37	40	52	53	16	30
5	35	46	15	28	5	21	3	54	29	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	10	41	56	29	54	9	31	15
1	25	14	22	43	17	52	48	8	21	33
2	35	55	19	13	12	2	20	23	53	58
3	49	18	3	30	5	50	28	44	27	34
4	45	37	16	42	7	11	51	38	26	24
5	4	40	46	47	57	39	36	6		

Простое число 61.

Первообр. корни: 2, 6, 7, 10, 17, 18, 26, 30, 31, 35, 43, 44, 51, 54, 55, 59.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	47	42	34	14	29	23	21	24
1	1	45	16	20	10	56	8	49	11	22
2	48	5	32	39	3	28	7	6	57	25
3	43	13	55	27	36	37	58	33	9	2
4	35	18	52	41	19	38	26	40	50	46
5	15	31	54	51	53	59	44	4	12	17
6	30									

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	39	24	57	21	27	26	16	38
1	14	18	58	31	5	50	12	59	41	44
2	13	8	19	7	9	29	46	33	25	6
3	60	51	22	37	4	40	34	35	45	23
4	47	43	3	30	56	11	49	2	20	17
5	48	53	42	54	52	32	15	28	36	55

Простое число 67.

Первообр. корни: 2, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 28, 31, 32, 34, 41, 44, 46, 48, 50, 51, 57, 61, 63.

ОСНОВАНИЕ 12.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	29	9	58	39	38	7	21	18
1	2	61	1	23	36	48	50	8	47	26
2	31	16	24	20	30	12	52	27	65	22
3	11	43	13	4	37	46	10	44	55	32
4	60	19	45	63	53	57	49	64	59	14
5	41	17	15	3	56	34	28	35	51	54
6	40	5	6	25	42	62	33			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	12	10	53	33	61	62	7	17	3
1	36	30	25	32	49	52	21	51	9	41
2	23	8	29	13	22	63	19	27	56	2
3	24	20	39	66	55	57	14	34	6	5
4	60	50	64	31	37	42	35	18	15	46
5	16	58	26	44	59	38	54	45	4	48
6	40	11	65	43	47	28				

Простое число 71.

Первообразные корни: 7, 11, 13, 21, 22, 28, 31, 33, 35, 42, 44, 47, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69.

ОСНОВАНИЕ 62.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	58	18	46	14	6	33	34	36
1	2	43	64	27	21	32	22	7	24	38
2	60	51	31	5	52	28	15	54	9	4
3	20	13	10	61	65	47	12	30	26	45
4	48	55	39	44	19	50	63	17	40	66
5	16	25	3	59	42	57	67	56	62	29
6	8	37	1	69	68	41	49	11	53	23
7	35									

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	62	10	52	29	23	6	17	60	28
1	32	67	36	31	5	26	50	47	3	44
2	30	14	16	69	18	51	38	13	25	59
3	37	22	15	7	8	70	9	61	19	42
4	48	65	54	11	43	39	4	35	40	66
5	45	21	24	68	27	41	57	55	2	53
6	20	33	58	46	12	34	49	56	64	63

Простое число 73.

Первообразные корни: 5, 11, 13, 14, 15, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 53, 58, 59, 60, 62, 68.

ОСНОВАНИЕ 5.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	8	6	16	1	14	33	24	12
1	9	55	22	59	41	7	32	21	20	62
2	17	39	63	46	30	2	67	18	49	35
3	15	11	40	61	29	34	28	64	70	65
4	25	4	47	51	71	13	54	31	38	66
5	10	27	3	53	26	56	57	68	43	5
6	23	58	19	45	48	60	69	50	37	52
7	42	44	36							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	5	25	52	41	59	3	15	2	10
1	50	31	9	45	6	30	4	20	27	62
2	18	17	12	60	8	40	54	51	36	34
3	24	47	16	7	35	29	72	68	48	21
4	32	14	70	58	71	63	23	42	64	28
5	67	43	69	53	46	11	55	56	61	13
6	65	33	19	22	37	39	49	26	57	66
7	38	44								

Простое число 79.

Первообразные корни: 3, 6, 7, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 47, 48, 53, 54, 59, 60, 63, 66, 68, 70, 74, 75, 77.

ОСНОВАНИЕ 29.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	50	71	22	34	43	19	72	64
1	6	70	15	74	69	27	44	9	36	10
2	56	12	42	52	65	68	46	57	41	1
3	77	76	16	63	59	53	8	23	60	67
4	28	21	62	47	14	20	24	55	37	38
5	40	2	18	7	29	26	13	3	51	17
6	49	75	48	5	66	30	35	54	31	45
7	25	33	58	4	73	61	32	11	39	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	29	51	57	73	63	10	53	36
1	19	77	21	56	44	12	32	59	52	7
2	45	41	4	37	46	70	55	15	40	54
3	65	68	76	71	5	66	18	48	49	78
4	50	28	22	6	16	69	26	43	62	60
5	2	58	23	35	67	47	20	27	72	34
6	38	75	42	33	9	24	64	39	25	14
7	11	3	8	74	13	61	31	30		

Простое число 83.

Первообразные корни: 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80.

ОСНОВАНИЕ 50.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	3	52	6	81	55	24	9
1	2	72	58	67	27	51	12	4	25	59
2	5	76	75	16	61	80	70	74	30	36
3	54	32	15	42	7	23	28	60	62	37
4	8	38	79	49	78	21	19	69	64	48
5	1	56	73	13	77	71	33	29	39	20
6	57	34	35	46	18	66	45	53	10	68
7	26	17	31	43	63	50	65	14	40	47
8	11	44	41							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	50	10	2	17	20	4	34	40
1	68	80	16	53	77	32	23	71	64	46
2	59	45	9	35	7	18	70	14	36	57
3	28	72	31	56	61	62	29	39	41	58
4	78	82	33	73	81	66	63	79	49	43
5	75	15	3	67	30	6	51	60	12	19
6	37	24	38	74	48	76	65	13	69	47
7	26	55	11	52	27	22	21	54	44	42
8	25	5								

Простое число 89.

Первообразные корни: 3, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 74, 75, 76, 82, 83, 86.

ОСНОВАНИЕ 30.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	72	87	56	18	71	7	40	86
1	2	4	55	65	79	17	24	82	70	53
2	74	6	76	31	39	36	49	85	63	29
3	1	57	8	3	66	25	54	77	37	64
4	58	67	78	59	60	16	15	34	23	14
5	20	81	33	10	69	22	47	52	13	45
6	73	19	41	5	80	83	75	32	50	30
7	9	26	38	68	61	35	21	11	48	46
8	42	84	51	27	62	12	43	28	44	

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	30	10	33	11	63	21	7	32	70
1	53	77	85	58	49	46	45	15	5	61
2	50	76	55	48	16	35	71	83	87	29
3	69	23	67	52	47	75	25	38	72	24
4	8	62	80	86	88	59	79	56	78	26
5	68	82	57	19	36	12	4	31	40	43
6	44	74	84	28	39	13	34	41	73	54
7	18	6	2	60	20	66	22	37	42	14
8	64	51	17	65	81	27	9	3		

Простое число 97.

Первообразные корни: 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 71, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90, 92.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	86	2	76	11	88	53	66	4
1	1	82	78	83	43	13	56	19	90	27
2	87	55	72	79	68	22	73	6	33	47
3	3	26	46	84	9	64	80	41	17	85
4	77	71	45	44	62	15	69	60	58	10
5	12	21	63	14	92	93	23	29	37	65
6	89	32	16	57	36	94	74	51	95	81
7	54	25	70	20	31	24	7	39	75	42
8	67	8	61	91	35	30	34	49	52	18
9	5	40	59	28	50	38	48			

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	3	30	9	90	27	76	81	34
1	49	5	50	15	53	45	62	38	89	17
2	73	51	25	56	75	71	31	19	93	57
3	85	74	61	28	86	84	64	58	95	77
4	91	37	79	14	43	42	32	29	96	87
5	94	67	88	7	70	21	16	63	48	92
6	47	82	44	52	35	59	8	80	24	46
7	72	41	22	26	66	78	4	40	12	23
8	36	69	11	13	33	39	2	20	6	60
9	18	83	54	55	65	68				

Простое число 101.

Первообразные корни: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 98, 99.

ОСНОВАНИЕ 2.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25	13	71	66	10	93	4	30	39	96
2	26	78	14	86	72	48	67	7	11	91
3	94	84	5	82	31	33	40	56	97	35
4	27	45	79	42	15	62	87	58	73	18
5	49	99	68	23	8	37	12	65	92	29
6	95	77	85	47	6	90	83	81	32	55
7	34	44	41	61	57	17	98	22	36	64
8	28	76	46	89	80	54	43	60	16	21
9	63	75	88	53	59	20	74	52	19	51
10	50									

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	4	8	16	32	64	27	54	7
2	14	28	56	11	22	44	88	75	49	98
3	95	89	77	53	5	10	20	40	80	59
4	17	34	68	35	70	39	78	55	9	18
5	36	72	43	86	71	41	82	63	25	50
6	100	99	97	93	85	69	37	74	47	94
7	87	73	45	90	79	57	13	26	52	3
8	6	12	24	48	96	91	81	61	21	42
9	84	67	33	66	31	62	23	46	92	83
9	65	29	58	15	30	60	19	38	76	51

Простое число 103.

Первообразные корни: 5, 6, 11, 12, 20, 21, 35, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 54, 62, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 96, 99, 101.

ОСНОВАНИЕ 6.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	29	47	66	78	14	82	50	58	28
2	49	89	75	90	93	16	10	69	22	76
3	60	99	26	86	96	91	2	81	74	21
4	95	94	33	55	19	71	34	17	37	64
5	62	5	56	11	13	88	68	85	20	70
6	4	84	43	44	72	23	30	53	40	45
7	35	77	48	9	25	73	18	61	67	42
8	39	24	38	100	79	7	101	31	65	27
9	15	98	80	54	63	87	83	52	8	41
10	6	97	51							

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26	53	9	54	15	90	25	47	76	44
2	58	39	28	65	81	74	32	89	19	11
3	66	87	7	42	46	70	8	48	82	80
4	68	99	79	62	63	69	2	12	72	20
5	17	102	97	67	93	43	52	3	18	5
6	30	77	50	94	49	88	13	78	56	27
7	59	45	64	75	38	22	29	71	14	84
8	92	37	16	96	61	57	33	95	55	21
9	23	35	4	24	41	40	34	101	91	31
10	83	86								

Простое число 107.

Первообразные корни: 2, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 38, 43, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 84, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104.

ОСНОВАНИЕ 63.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	76	56	58	84	13	67	57	73	50
2	97	29	65	60	45	26	47	22	35	72
3	80	21	51	48	94	70	28	6	85	30
4	86	90	18	93	54	63	49	16	34	8
5	15	77	36	64	11	89	24	68	61	87
6	69	102	10	1	40	71	37	33	83	32
7	59	81	17	41	101	104	74	27	19	88
8	75	100	79	98	7	12	82	44	43	92
9	52	9	38	99	5	3	23	55	103	20
10	4	14	66	31	25	42	53			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	63	10	95	100	94	37	84	49	91	
2	99	31	27	96	56	104	25	77	36	21
3	89	103	69	67	48	28	52	66	92	18
4	64	73	105	88	87	24	14	26	33	46
5	9	32	90	106	44	97	12	7	13	70
6	23	58	16	45	53	22	102	6	57	60
7	35	65	29	8	76	80	11	51	3	82
8	30	71	86	68	4	38	40	59	79	55
9	41	15	89	43	34	2	19	20	83	93
10	81	74	61	98	75	17				

Простое число 109.

Первообразные корни: 6, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 30, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 79, 85, 91, 95, 96, 98, 99, 103.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	107	106	7	73	44	48	21	41	3
2	94	8	92	105	91	32	100	84	58	10
3	29	74	83	27	6	104	26	65	96	35
4	79	45	101	66	77	72	90	5	76	68
5	17	49	85	97	69	15	43	31	103	71
6	14	22	59	36	18	23	12	47	99	25
7	89	42	11	80	50	60	81	87	20	88
8	64	4	30	46	86	37	51	38	62	40
9	57	95	75	102	98	19	61	52	53	55
10	2	9	34	67	70	24	82	39	54	

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	19	81	47	34	13	21	101
2	29	72	66	6	60	55	5	50	64	95
3	78	17	61	65	105	69	36	33	3	30
4	82	57	25	32	102	39	63	85	87	107
5	89	18	71	56	15	41	33	67	16	51
6	74	86	97	98	108	99	9	90	28	62
7	75	96	88	8	80	37	43	108	49	54
8	104	59	45	14	31	92	48	44	4	40
9	73	76	106	79	27	52	84	77	7	70
10	46	24	22	2	20	91	38	53	94	68
10	26	42	93	58	35	23	12	11		

Простое число 113.

Первообразные корни: 3, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 54, 55, 58, 59, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 101, 103, 107, 108, 110.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	22	71	58	12	28	96	59	98	46
2	53	39	74	103	11	10	110	13	64	87
3	80	30	36	101	111	21	38	29	33	25
4	105	34	91	17	14	107	43	97	63	32
5	62	26	50	76	65	83	4	60	27	9
6	20	106	82	6	88	7	41	99	51	70
7	73	35	90	49	81	89	85	94	77	55
8	45	92	86	24	31	8	69	54	66	67
9	47	18	95	109	37	42	3	40	84	68
10	2	15	78	57	102	100	16	75	5	48
11	23	108	56							

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	96	56	108	63	65	85	59
2	25	24	14	27	44	101	106	43	91	6
3	60	35	11	110	83	39	51	58	15	37
4	31	84	49	38	41	71	32	94	36	21
5	97	66	95	46	8	80	9	90	109	73
6	52	68	2	20	87	79	112	103	13	17
7	57	5	50	48	28	54	88	89	99	86
8	69	12	7	70	22	107	53	78	102	3
9	30	74	62	55	98	76	82	29	64	75
10	72	42	81	19	77	92	16	47	18	67
11	105	33	104	23	4	40	61	45	111	93

Простое число 127.

Первообразные корни: 3, 6, 7, 12, 14, 23, 29, 39, 43, 45, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 65, 67, 78, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 106, 109, 110, 112, 114, 116, 118.

ОСНОВАНИЕ 109.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	52	59	20	17	8	72	118	64	42
2	21	22	70	11	77	96	38	69	35	79
3	26	50	90	75	10	110	82	112	60	43
4	89	76	40	121	88	31	29	120	95	124
5	114	15	56	67	87	37	53	65	97	91
6	44	30	68	45	108	5	93	107	28	34
7	2	116	100	24	4	119	78	51	61	32
8	57	92	94	25	58	103	13	102	106	123
9	49	19	47	73	12	27	113	89	16	98
10	6	101	33	14	74	7	85	84	105	1
11	55	9	71	80	83	122	115	66	109	117
12	62	104	48	99	86	81	63			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	34	23	94	86	103	51	98	14	2	91
2	13	20	21	3	73	83	30	95	68	46
3	61	45	79	102	69	28	4	55	26	40
4	42	6	19	39	60	63	9	92	122	90
5	31	77	11	56	8	110	52	80	84	12
6	38	78	120	126	18	57	117	53	62	27
7	22	112	16	93	104	33	41	24	76	29
8	113	125	36	114	107	106	124	54	44	97
9	32	59	81	66	82	43	25	58	99	123
10	72	101	87	85	121	108	88	67	64	118
11	35	5	37	96	50	116	71	119	17	75
12	47	43	115	89	49	7				

Простое число 131.

Первообразные корни: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 37, 40, 50, 54, 56, 57, 66, 67, 72, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 106, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	98	32	64	121	44	72	59	75	45
2	84	34	51	89	115	96	17	118	74	73
3	127	67	25	94	12	86	28	23	128	60
4	37	58	117	22	4	40	42	5	68	76
5	49	55	100	78	71	16	27	41	26	46
6	80	104	20	30	108	112	47	43	95	85
7	39	15	111	91	106	92	81	6	13	35
8	120	114	11	3	70	107	105	69	87	52
9	123	102	125	63	88	93	21	77	29	90
10	2	62	8	9	53	82	31	50	24	116
11	99	19	110	10	124	7	109	56	129	97
12	33	66	57	54	103	14	113	101	61	18
13	65									

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	83	44	47	77	115	102	103
2	113	82	34	78	125	71	55	26	129	111
3	62	96	43	37	108	32	58	56	36	98
4	63	106	12	120	21	79	4	40	7	70
5	45	57	46	67	15	19	59	66	5	50
6	107	22	89	104	123	51	117	122	41	17
7	39	128	101	93	13	130	121	31	48	87
8	84	54	16	29	28	18	49	97	53	6
9	60	76	105	2	20	69	35	88	94	23
10	99	73	75	95	33	68	25	119	11	110
11	52	127	91	124	61	86	74	85	64	116
12	112	72	65	126	81	24	109	42	27	8
13	80	14	9	90	114	92	3	30	38	118

Простое число 137.

Первообразные корни: 3, 5, 6, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 66, 67, 70, 71, 75, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 124, 125, 131, 132, 134.

I.

ОСНОВАНИЕ 12.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17	90	1	53	132	36	112	86	20	54
2	11	15	84	129	131	46	47	39	126	95
3	30	133	106	103	80	25	14	102	48	66
4	5	51	9	37	78	49	123	111	125	4
5	40	99	41	71	33	113	120	67	89	128
6	24	110	127	28	100	76	97	87	74	6
7	19	29	8	32	96	59	42	92	60	21
8	135	52	45	101	3	109	31	108	72	57
9	43	55	117	10	105	77	119	73	134	116
10	34	82	93	12	35	38	65	98	27	58
11	107	115	114	63	61	16	83	79	122	88
12	18	44	104	64	121	69	22	85	94	50
13	70	75	91	56	81	62	68			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	93	20	103	3	86	21	115	10	120	70
2	18	79	126	5	60	35	9	108	63	71
3	30	86	73	54	100	104	15	43	105	27
4	50	52	76	90	121	82	25	26	38	45
5	129	41	81	13	19	91	133	89	109	75
6	78	114	135	113	123	106	39	57	136	125
7	130	53	88	97	68	131	65	95	44	117
8	34	134	101	116	22	127	17	67	119	58
9	11	132	77	102	128	29	74	66	107	51
10	64	83	37	33	122	94	32	110	87	85
11	61	47	16	55	112	111	99	92	8	96
12	56	124	118	46	4	48	28	62	59	23
13	2	24	14	31	98	80				

Простое число 139.

Первообразные корни: 2, 3, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 32, 40, 50, 53, 56, 58, 61, 68, 70, 72, 73, 85, 88, 90, 92, 93, 98, 101, 102, 104, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 119, 123, 126, 128, 130, 132, 134, 135.

ОСНОВАНИЕ 92.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	74	11	26	135	71	62	37	79	83
2	122	65	55	39	130	44	7	9	116	8
3	52	40	43	123	18	38	60	136	64	75
4	103	82	46	23	36	120	20	70	111	32
5	25	86	126	73	128	96	97	132	127	15
6	33	125	21	114	24	48	104	110	137	88
7	19	68	41	35	117	93	45	90	56	102
8	84	58	63	28	27	59	4	57	17	94
9	101	42	1	89	51	105	92	115	13	34
10	6	133	67	129	107	87	54	112	109	121
11	77	47	78	76	113	61	108	124	134	53
12	14	10	106	131	2	66	95	80	5	72
13	29	12	85	99	91	31	118	50	69	

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	121	12	131	98	120	59	7	88	34	70
2	46	62	5	43	64	50	13	84	83	130
3	6	135	49	60	99	73	44	17	35	23
4	31	72	91	32	25	76	42	111	65	3
5	137	94	30	119	106	22	78	87	81	85
6	36	115	16	82	38	21	125	102	71	138
7	47	15	129	53	11	39	113	110	112	18
8	127	8	41	19	80	132	51	105	69	93
9	77	134	96	75	89	126	55	56	9	133
10	4	90	79	40	66	95	122	104	116	108
11	67	48	107	114	63	97	28	74	136	2
12	45	109	20	33	117	61	52	58	54	103
13	24	123	57	101	118	14	37	68		

Простое число 149.

Первообразные корни: 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 27, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 106, 108, 109, 111, 115, 117, 122, 126, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 146, 147.

N.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	25	53	133	7	147	32	84	38	55
2	118	5	142	15	22	64	102	24	4	51
3	116	52	141	140	121	70	20	136	29	100
4	87	61	122	77	111	114	132	14	139	76
5	33	119	71	34	18	57	93	27	97	9
6	85	6	21	120	110	17	109	104	90	130
7	39	143	137	72	105	81	146	63	69	113
8	56	16	30	35	91	36	46	95	80	11
9	83	23	101	19	131	92	108	145	45	107
10	2	65	88	58	40	37	3	48	135	13
11	26	103	62	94	144	47	66	67	126	42
12	54	50	123	28	138	96	89	68	79	44
13	134	125	78	98	73	81	59	127	99	75
14	8	129	112	10	106	12	41	43	74	

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	106	17	21	61	14	140	59
2	143	89	145	109	47	23	81	65	54	93
3	36	62	24	91	16	11	110	57	123	38
4	82	75	5	50	53	83	85	105	7	70
5	104	146	119	147	129	98	86	115	107	27
6	121	18	31	12	120	8	80	55	103	136
7	19	41	112	77	25	101	116	117	127	78
8	35	52	73	134	148	139	49	43	132	128
9	88	135	9	90	6	60	4	40	102	126
10	68	84	95	56	113	87	125	58	133	138
11	39	92	26	111	67	74	144	99	96	66
12	64	44	142	79	45	3	30	2	20	51
13	63	34	42	122	28	131	118	137	29	141
14	69	94	46	13	130	108	37	72	124	48
15	33	32	22	71	114	97	76	15		

Первообразные корни: 6, 7, 12, 13, 14, 15, 30, 35, 48, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 71, 77, 82, 89, 93, 96, 102, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 126, 129, 130, 133, 134, 140, 141, 146.

I.

Z

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0	70	141	140	82	61	37	60	132
2	72	34	131	101	107	73	130	88	52	90
3	143	58	104	115	51	14	21	123	27	54
4	142	111	98	25	8	119	122	76	10	92
5	84	79	91	38	24	64	35	86	121	74
6	63	59	91	69	43	116	97	81	124	30
7	39	137	128	19	120	33	95	93	78	106
8	62	114	42	87	146	5	80	71	12	117
9	134	138	31	3	18	20	108	45	94	53
10	4	9	105	49	6	22	41	118	144	16
11	36	67	149	46	11	110	139	99	113	23
12	133	68	17	85	1	47	44	83	100	125
13	103	147	129	102	48	96	89	126	40	29
14	109	77	15	127	13	55	148	32	26	56
15	75		57	135	112	136	7	65	66	145

[illegible]

Простое число 157.

Первообразные корни: 5, 6, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 34, 38, 43, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 114, 119, 123, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 151, 152.

ОСНОВАНИЕ 139.

N.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	152	104	180	138	11	113	57	129	88
2	149	23	143	81	95	22	121	128	79	116
3	124	58	111	118	119	68	70	54	39	15
4	140	75	14	151	134	99	72	28	107	96
5	13	94	112	25	45	7	30	76	86	114
6	115	155	49	145	102	141	109	82	6	27
7	59	64	61	83	19	144	98	12	110	47
8	131	20	66	97	5	139	142	53	87	9
9	90	31	63	24	67	137	77	137	125	32
10	4	108	85	123	103	34	16	37	105	84
11	154	150	21	56	73	92	153	91	36	8
12	106	148	146	41	40	33	136	62	18	29
13	132	43	100	17	3	65	101	46	93	117
14	50	42	55	126	52	26	74	71	38	1
15	135	35	89	60	44	69	78	80	10	51

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	139	10	134	100	84	58	55	109	79
2	148	5	67	50	42	29	106	133	118	74
3	81	112	25	21	93	53	145	59	37	119
4	56	91	89	125	105	151	108	97	138	28
5	124	123	141	131	154	54	127	69	14	62
6	140	149	144	77	27	142	113	7	31	70
7	153	72	117	92	71	135	82	94	35	155
8	36	137	46	114	146	41	47	96	156	18
9	147	23	57	73	99	102	48	78	9	152
10	90	107	115	128	51	24	39	83	76	45
11	132	136	64	104	12	98	120	38	101	66
12	68	32	52	6	49	60	19	129	33	34
13	16	26	3	103	30	88	143	95	17	8
14	13	80	130	15	44	150	126	87	4	85
15	40	65	86	22	75	63	122	2	121	20
	111	43	11	116	110	61				

Простое число 163.

Первообразные корни: 2, 3, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 29, 32, 42, 44, 45, 50, 52, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 89, 92, 94, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 128, 129, 130, 137, 139, 147, 148, 149, 153, 154, 159.

ОСНОВАНИЕ 70.

N.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	97	23	57	70	136	122	159	51	86
2	73	42	6	153	94	24	128	129	141	145
3	45	39	31	140	68	92	66	75	36	100
4	144	20	113	106	77	17	62	44	3	160
5	95	40	37	18	38	28	50	8	54	27
6	116	30	110	85	102	150	49	155	139	34
7	1	52	137	7	146	67	107	96	9	103
8	53	10	91	134	22	90	15	26	148	65
9	88	56	133	82	115	58	74	130	69	21
10	4	29	111	35	108	135	89	131	109	119
11	99	118	121	14	79	84	125	143	98	158
12	25	32	101	63	19	117	156	147	11	149
13	59	112	120	126	64	60	48	47	105	13
14	72	87	123	154	46	76	78	41	55	151
15	138	104	16	83	5	132	80	33	12	61
16	124	152	81							

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	81	128	158	139	113	86	152	45	53	124
2	41	99	84	12	25	120	87	59	55	101
3	61	32	121	157	69	103	38	52	54	31
4	51	147	21	3	47	30	144	137	136	66
5	56	8	71	80	58	148	91	13	95	130
6	135	159	46	123	134	89	36	75	34	98
7	14	2	140	20	96	37	145	44	146	114
8	156	162	93	153	115	63	9	141	90	106
9	85	82	35	5	24	50	77	11	118	110
10	39	122	64	79	151	138	43	76	104	108
11	62	102	131	42	6	94	60	125	111	109
12	132	112	16	142	160	116	133	19	26	27
13	97	107	155	92	83	105	15	72	150	68
14	33	28	4	117	40	29	74	127	88	129
15	65	149	161	23	143	67	126	18	119	17
16	49	7								

Простое число 167.

Первообразные корни: 5, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 92, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 123, 125, 129, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165.

ОСНОВАНИЕ 10. N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	110	150	43	16	59	12	64	92	122
2	87	74	30	51	70	162	129	100	102	32
3	145	152	98	88	63	11	128	127	136	21
4	7	55	160	75	116	37	137	68	156	26
5	82	121	49	31	20	25	22	28	118	23
6	65	34	72	52	18	124	8	85	149	29
7	97	159	48	71	47	140	56	40	107	119
8	93	78	141	163	80	58	161	10	36	24
9	123	139	57	130	154	131	76	14	112	66
10	2	91	41	101	135	155	117	148	106	35
11	111	105	108	103	114	132	38	165	109	73
12	151	54	120	33	158	77	138	90	104	53
13	44	45	94	146	5	15	69	62	115	19
14	17	46	79	153	134	113	157	4	133	125
15	60	95	142	99	126	67	27	84	39	9
16	13	147	164	89	61	3	83			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	165	147	134	4	40	66	159
2	87	35	16	160	97	135	14	140	64	139
3	54	39	56	59	89	55	49	156	57	69
4	22	53	29	123	61	109	88	45	116	158
5	77	102	18	13	130	131	141	74	72	52
6	19	23	63	129	121	41	76	92	85	15
7	150	164	137	34	6	60	99	155	47	136
8	24	73	62	119	21	43	96	125	81	142
9	84	5	50	166	157	67	2	20	33	163
10	127	101	8	80	132	151	7	70	32	153
11	27	103	28	113	128	111	108	78	112	118
12	11	110	98	145	114	138	44	106	58	79
13	122	51	9	90	65	149	154	37	36	26
14	93	95	115	148	144	104	38	46	126	91
15	75	82	152	17	3	80	133	161	107	68
16	12	120	31	143	94	105	48	146	124	71
	42	86	25	83	162	117				

Простое число 173.

Первообр. корни: 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 91, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 134, 141, 143, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 165, 166, 168, 170, 171.

ОСНОВАНИЕ 91.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	127	33	142	26	163	20	31	39	14
2	17	38	140	88	46	154	52	89	27	85
3	11	122	65	134	102	22	40	42	98	152
4	30	74	51	60	153	5	101	144	59	149
5	167	96	168	123	34	118	70	92	165	62
6	24	169	135	45	78	133	147	50	115	95
7	35	23	53	94	55	161	111	158	162	71
8	43	28	87	104	64	80	73	159	166	150
9	18	1	114	129	157	76	72	25	75	141
10	8	139	109	121	9	29	136	61	47	164
11	131	49	83	110	105	79	6	156	32	120
12	37	82	10	81	148	145	58	15	91	67
13	146	137	160	116	63	12	128	126	108	16
14	48	151	36	97	66	143	107	69	68	132
15	2	54	124	103	171	113	3	138	84	130
16	56	119	41	90	100	125	117	106	77	112
17	93	99	86							

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	91	150	156	10	45	116	3	100	104
2	122	30	135	2	9	127	139	20	90	59
3	40	7	118	12	54	70	4	18	81	105
4	36	162	37	80	14	63	24	120	21	8
5	67	42	16	72	151	74	160	108	140	111
6	43	107	49	134	84	32	144	28	126	48
7	56	79	96	86	41	98	95	129	148	147
8	85	123	121	112	158	19	172	82	23	115
9	163	28	57	170	73	69	51	143	38	171
10	164	46	34	153	88	114	167	146	138	102
11	113	76	169	155	92	68	133	166	55	161
12	119	103	31	53	152	165	137	11	136	93
13	159	110	149	65	33	62	106	131	157	101
14	22	99	13	145	47	125	130	66	124	39
15	89	141	29	44	25	26	117	94	77	87
16	132	75	78	5	109	58	88	50	52	61
17	15	154								

Простое число 179.

Первообр. корни: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 69, 71, 72, 73, 78, 79, 84, 86, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 143, 148, 150, 152, 154, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 174, 175, 176.

ОСНОВАНИЕ 10.

N.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	73	52	146	106	125	23	41	104
2	74	27	20	134	96	158	114	14	177	26
3	53	76	9	79	87	129	72	19	99	8
4	147	101	148	144	173	32	138	136	166	46
5	107	66	102	111	51	133	64	78	143	110
6	126	94	149	127	82	62	152	48	160	117
7	24	35	145	95	92	86	172	50	81	91
8	42	30	174	150	43	120	39	122	68	16
9	105	157	33	128	31	132	61	85	119	131
10	2	170	139	83	175	3	6	56	124	113
11	28	71	137	63	151	171	38	60	5	37
12	21	54	167	153	44	140	22	13	155	18
13	135	77	47	49	121	84	55	59	12	58
14	97	10	108	161	40	176	168	98	165	142
15	159	80	67	118	123	4	154	11	164	163
16	115	88	103	25	69	7	45	109	116	90
17	15	130	112	36	17	57	141	162	89	

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	105	155	118	106	165	39	32
2	141	157	138	127	17	170	89	174	129	37
3	81	94	45	92	25	71	173	119	110	26
4	144	8	84	80	84	124	166	49	116	86
5	77	54	3	30	121	136	107	132	67	133
6	117	96	65	113	56	23	51	152	189	137
7	29	111	36	2	20	21	31	131	57	33
8	151	78	64	103	135	97	75	34	161	178
9	169	79	74	24	61	73	14	140	147	38
10	22	41	52	162	9	90	5	50	142	167
11	59	53	172	109	16	160	168	69	153	98
12	85	134	87	154	108	6	60	63	93	35
13	171	99	95	55	13	130	47	112	46	102
14	125	176	149	58	43	72	4	40	43	62
15	83	114	66	123	156	128	27	91	15	150
16	68	143	177	159	158	148	48	122	146	28
17	101	115	76	44	82	104	145	18		

Простое число 181.

Первообразные корни: 2, 10, 18, 21, 23, 24, 28, 41, 47, 50, 53, 54, 57, 58, 63, 66, 69, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 112, 115, 118, 123, 124, 127, 128, 131, 134, 140, 153, 157, 158, 160, 163, 171, 179.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	146	133	68	86	48	21	15	39	136
2	134	83	154	32	148	116	172	55	89	135
3	69	27	125	34	8	96	165	24	101	84
4	87	59	36	140	52	63	42	38	88	100
5	49	123	118	121	157	14	54	23	60	80
6	22	65	160	151	78	80	167	66	141	97
7	16	57	175	20	171	164	41	161	53	166
8	40	92	12	73	169	103	93	152	5	25
9	137	47	115	95	62	3	13	79	163	102
10	2	130	76	143	71	131	74	81	110	85
11	147	106	7	51	156	77	170	168	61	70
12	155	112	18	127	113	144	104	67	31	28
13	33	139	120	150	19	72	94	142	50	126
14	149	177	10	178	128	132	153	98	124	35
15	117	159	174	11	114	75	6	17	119	9
16	173	44	45	179	145	82	26	58	122	64
17	56	91	46	129	105	111	138	176	158	43

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	95	45	88	156	112	34	159
2	142	153	82	96	55	7	70	157	122	134
3	73	6	60	57	27	89	166	31	129	23
4	49	128	13	130	33	149	42	58	37	8
5	80	76	36	179	161	162	172	91	5	50
6	138	113	44	78	56	17	170	71	167	41
7	48	118	94	35	169	61	67	127	3	30
8	119	104	135	83	106	155	102	115	64	97
9	65	107	165	21	29	109	4	40	38	18
10	180	171	81	86	136	93	25	69	147	22
11	39	28	99	85	126	174	111	24	59	47
12	108	175	121	124	134	92	15	150	52	158
13	132	53	168	51	148	32	139	123	144	173
14	101	105	145	2	20	19	9	90	176	131
15	43	68	137	103	125	164	11	110	14	140
16	133	63	87	146	12	120	114	54	178	151
17	62	77	46	98	75	26	79	66	117	84
18	116	74	16	160	152	72	177	141	143	163

Простое число 191.

Первообр. корни: 19, 21, 22, 28, 29, 33, 35, 42, 44, 47, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 76, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 99, 101, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 123, 124, 126, 127, 131, 132, 137, 140, 141, 143, 145, 146, 148, 151, 157, 164, 165, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 189.

I.

N.

ОСНОВАНИЕ 157.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	115	102	148	14	90	60	133	116	106
2	104	91	162	156	45	48	28	184	18	93
3	150	125	130	73	96	180	68	64	147	29
4	16	145	3	174	129	6	24	39	5	114
5	5	92	142	170	77	15	59	51	176	76
6	62	63	37	49	42	56	175	44	131	182
7	135	69	32	189	167	138	107	58	8	70
8	118	22	57	173	105	84	86	177	26	66
9	108	99	126	83	141	133	88	46	41	149
10	4	13	54	136	82	181	179	10	178	31
11	117	23	161	121	153	12	43	72	94	127
12	164	40	165	103	139	80	151	137	144	132
13	158	157	87	86	146	154	110	71	172	75
14	47	187	171	81	134	119	101	34	79	98
15	50	111	19	100	160	25	128	1	168	35
16	30	55	124	52	159	163	85	169	17	122
17	186	9	138	113	89	123	143	140	61	67
18	20	97	11	21	38	155	185	109	53	7
19	95									

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	157	10	42	100	38	45	189	68	171
2	107	182	115	101	4	55	40	168	18	152
3	180	183	81	111	46	155	78	22	16	29
4	160	99	72	35	147	159	133	62	184	47
5	121	88	64	116	67	14	97	140	15	63
6	150	57	163	188	102	161	65	82	77	56
7	6	178	60	61	27	37	79	179	26	71
8	125	143	104	93	85	165	86	132	108	148
9	5	21	50	19	118	190	34	181	149	91
10	153	146	2	123	20	84	9	76	90	187
11	136	151	23	173	39	11	8	110	80	145
12	36	113	169	175	162	31	92	119	156	44
13	32	58	129	7	144	70	103	127	75	124
14	177	94	51	176	128	41	134	28	3	89
15	30	126	109	114	135	185	13	131	130	164
16	154	112	12	165	120	122	54	74	158	167
17	52	142	138	83	43	66	48	87	98	106
18	25	105	59	95	17	186	170	141	172	73

Простое число 193.

Первообразные корни: 5, 10, 15, 17, 19, 22, 26, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 57, 58, 61, 66, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 90, 91, 102, 103, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 123, 127, 132, 135, 136, 140, 141, 142, 146, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 159, 163, 167, 171, 174, 176, 178, 183, 188.

ОСНОВАНИЕ 10.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	182	156	172	11	146	184	162	120
2	183	98	136	15	174	167	152	149	110	59
3	157	148	83	54	126	22	5	84	164	9
4	173	134	142	57	139	3	100	55	49	171
5	12	113	187	79	74	104	154	23	116	176
6	147	133	124	112	132	26	47	6	129	18
7	185	27	90	41	45	178	39	85	161	109
8	163	48	115	190	128	160	62	165	63	81
9	121	7	34	98	117	70	106	10	166	21
10	2	130	103	25	177	159	69	158	64	32
11	94	19	144	67	18	65	181	135	82	141
12	137	186	133	89	114	33	102	143	122	36
13	16	28	37	51	188	95	119	58	8	170
14	175	91	17	108	80	20	31	140	35	169
15	168	42	29	77	75	145	151	4	99	43
16	153	46	38	61	105	68	180	101	118	30
17	150	179	52	87	155	14	53	56	71	78
18	111	40	139	97	24	66	88	50	107	76
19	60	86	96							

N.

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	10	100	35	157	26	67	91	138	29
2	97	5	50	114	175	13	130	142	69	111
3	145	99	25	57	184	103	65	71	131	152
4	169	146	109	125	92	148	129	132	162	76
5	181	73	151	159	46	74	161	66	81	38
6	187	133	172	176	23	97	177	33	137	19
7	190	163	86	88	108	115	185	113	165	106
8	95	178	43	44	54	154	189	153	179	53
9	72	141	59	11	110	135	192	183	93	158
10	36	167	126	102	55	164	96	188	143	79
11	18	180	63	51	124	82	48	94	168	136
12	9	90	123	122	62	41	24	47	84	68
13	101	45	64	61	31	117	12	120	42	34
14	147	119	32	127	112	155	6	60	21	17
15	170	156	16	160	56	174	3	30	107	105
16	85	78	8	80	28	87	98	15	150	149
17	139	39	4	40	14	140	49	104	75	171
18	166	116	2	20	7	70	121	52	134	182
19	83	58								

Простое число 197.

Первообр. корни: 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 86, 89, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 108, 111, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 139, 140, 141, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 159, 162, 165, 166, 167, 170, 176, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 192, 194, 195.

ОСНОВАНИЕ 73.

N.

I.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0	61	65	122	137	126	86	188	130
2	63	5	187	153	147	6	48	95	191	182
3	8	151	66	68	52	78	18	195	12	40
4	124	46	16	54	127	71	129	106	47	22
5	139	160	109	70	156	27	56	148	113	172
6	128	180	88	20	170	94	131	51	101	96
7	88	179	117	1	13	143	108	81	57	21
8	185	64	107	14	77	36	115	105	83	59
9	132	43	190	42	167	123	174	102	188	23
10	4	76	25	69	140	92	141	94	121	90
11	7	17	134	175	112	9	162	87	157	181
12	189	10	45	111	99	19	81	186	35	119
13	155	38	192	72	118	136	82	30	194	3
14	149	171	44	158	178	177	62	41	74	15
15	8	31	169	29	152	114	144	26	120	145
16	50	154	125	58	168	11	75	165	138	110
17	97	116	176	150	166	164	53	161	84	98
18	193	146	104	49	55	89	103	100	32	85
19	184	28	39	24	163	159	98			

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	73	10	139	100	11	15	110	150	115
2	121	165	28	74	83	149	42	111	26	125
3	63	68	39	89	193	102	157	35	191	153
4	137	151	188	131	107	128	85	98	62	192
5	29	147	93	91	142	122	41	38	16	188
6	54	2	146	20	81	8	22	30	23	103
7	33	45	133	56	148	166	101	84	25	52
8	53	126	136	78	178	189	7	117	70	185
9	109	77	105	179	65	17	59	170	196	124
10	187	58	97	186	182	87	47	82	76	32
11	169	123	114	48	155	86	171	72	134	129
12	158	108	4	95	40	162	6	44	60	46
13	9	66	90	69	112	99	135	5	168	50
14	104	106	55	75	156	159	181	14	37	140
15	173	21	154	13	161	130	84	118	143	195
16	51	177	116	194	175	167	174	94	164	152
17	64	141	49	31	96	113	172	145	144	71
18	61	119	19	8	190	80	127	12	88	120
19	92	18	132	180	138	27				

Простое число 199.

Первообр. корни: 3, 6, 15, 22, 30, 34, 38, 39, 41, 44, 48, 54, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 84, 87, 95, 97, 99, 105, 108, 110, 113, 118, 119, 120, 127, 129, 133, 134, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 176, 179, 183, 185, 186, 189, 190, 192, 195, 197.

ОСНОВАНИЕ 127.

I.

N.

N.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	194	155	190	6	151	32	186	112	
2	189	147	128	28	161	182	57	108	11	
3	157	76	178	74	143	12	124	69	24	158
4	192	145	183	146	53	38	104	121	7	85
5	8	14	120	136	181	118	70	98	139	64
6	153	126	72	144	174	134	142	39	154	129
7	34	71	100	41	117	167	8	23	81	50
8	188	26	141	51	179	63	172	115	177	92
9	114	160	66	83	94	17	135	109	60	103
10	4	159	10	36	116	193	132	165	61	15
11	191	78	16	73	162	80	150	42	125	89
12	149	180	122	102	68	18	140	1	170	133
13	130	148	138	43	35	75	45	171	27	54
14	30	55	67	119	96	164	37	21	113	107
15	163	40	197	169	19	82	77	84	46	93
16	184	106	22	5	137	152	47	79	175	58
17	59	123	168	25	111	44	173	86	88	97
18	110	9	156	83	62	127	29	48	90	101
19	13	87	131	52	105	91	56	95	99	

I.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	127	10	76	100	163	5	38	50	181
2	102	19	25	190	51	109	112	95	125	154
3	56	147	162	77	28	173	81	138	14	186
4	140	69	7	93	70	134	103	146	35	67
5	151	73	117	133	175	186	158	166	187	68
6	4	83	193	34	139	141	196	17	169	170
7	98	108	184	85	49	54	92	142	124	27
8	46	71	62	113	23	135	31	156	111	167
9	115	78	155	183	157	39	177	191	178	119
10	188	195	89	159	94	197	144	179	47	198
11	72	189	123	99	86	194	161	149	18	97
12	180	174	9	148	90	87	104	74	45	143
13	52	37	122	171	26	118	61	185	13	59
14	130	192	106	129	65	96	53	164	132	48
15	126	82	66	24	63	41	33	12	131	120
16	116	6	165	60	58	3	182	30	29	101
17	91	15	114	150	145	107	57	75	172	153
18	128	137	86	176	64	168	43	88	32	84
19	121	44	16	42	160	22	8	21	80	11
	4	110	40	105	2	55	20	152		

ЛИНЕЙНЫЕ ДѢЛИТЕЛИ

КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ $x^2 + ay^2$ ДЛЯ ВСѢХЪ ВЕЛИЧИНЪ a ОТЪ
1 ДО 101.

$x^2 + y^2$	$4z + 1$.
$x^2 + 2y^2$	$8z + 1$, 3.
$x^2 + 3y^2$	$12z + 1$, 7.
$x^2 + 5y^2$	$20z + 1$, 3, 7, 9.
$x^2 + 6y^2$	$24z + 1$, 5, 7, 11.
$x^2 + 7y^2$	$28z + 1$, 9, 11, 15, 23, 25.
$x^2 + 10y^2$	$40z + 1$, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 37.
$x^2 + 11y^2$	$44z + 1$, 3, 5, 9, 15, 23, 25, 27, 31, 37.
$x^2 + 13y^2$	$52z + 1$, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 25, 29, 31, 47, 49.
$x^2 + 14y^2$	$56z + 1$, 3, 5, 9, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 39, 45.
$x^2 + 15y^2$	$60z + 1$, 17, 19, 23, 31, 47, 49, 53.
$x^2 + 17y^2$	$68z + 1$, 3, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 39, 49, 53, 63.
$x^2 + 19y^2$	$76z + 1$, 5, 7, 9, 11, 17, 23, 25, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 55, 61, 63, 73.
$x^2 + 21y^2$	$84z + 1$, 5, 11, 17, 19, 23, 25, 31, 37, 41, 55, 71.
$x^2 + 22y^2$	$88z + 1$, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 43, 47, 49, 51, 61, 71, 81, 83, 85.
$x^2 + 23y^2$	$92z + 1$, 3, 9, 13, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 41, 47, 49, 55, 59, 71, 73, 75, 77, 81, 85, 87.
$x^2 + 26y^2$	$104z + 1$, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27, 31, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 63, 71, 75, 81, 85, 93.
$x^2 + 29y^2$	$116z + 1$, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 33, 39, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 65, 75, 79, 81, 93, 95, 99, 109.

$x^2 + 30y^2$	120z + 1, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 49, 59, 67, 79, 101, 113.
$x^2 + 31y^2$	124z + 1, 5, 7, 9, 19, 25, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 59, 63, 67, 69, 71, 81, 87, 95, 97, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 121.
$x^2 + 33y^2$	132z + 1, 7, 17, 19, 23, 25, 29, 37, 41, 43, 47, 49, 59, 65, 71, 79, 97, 101, 119, 127.
$x^2 + 34y^2$	136z + 1, 5, 7, 9, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49, 59, 61, 63, 67, 71, 79, 81, 83, 89, 95, 109, 115, 121, 123, 125, 133.
$x^2 + 35y^2$	140z + 1, 3, 9, 11, 13, 17, 27, 29, 33, 39, 47, 51, 71, 73, 79, 81, 83, 87, 97, 99, 103, 109, 117, 121.
$x^2 + 37y^2$	148z + 1, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 101, 103, 119, 121, 131, 135, 137, 141, 143, 145.
$x^2 + 38y^2$	152z + 1, 3, 7, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 67, 69, 73, 75, 81, 87, 91, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 137, 141, 147.
$x^2 + 39y^2$	156z + 1, 5, 11, 25, 41, 43, 47, 49, 55, 59, 61, 71, 79, 83, 89, 103, 119, 121, 125, 127, 133, 137, 139, 149.
$x^2 + 41y^2$	164z + 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 45, 47, 49, 55, 57, 61, 63, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 95, 99, 105, 111, 113, 121, 125, 133, 135, 141, 147, 151.
$x^2 + 42y^2$	168z + 1, 13, 17, 23, 25, 29, 31, 41, 43, 53, 55, 59, 61, 67, 71, 83, 89, 95, 103, 121, 131, 149, 157, 163.
$x^2 + 43y^2$	172z + 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 35, 41, 47, 49, 53, 57, 59, 67, 79, 81, 83, 87, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 111, 117, 121, 127, 133, 135, 139, 143, 145, 153, 165, 167, 169.
$x^2 + 46y^2$	184z + 1, 5, 9, 11, 19, 21, 25, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 67, 71, 73, 81, 83, 87, 91, 95, 99, 105, 107, 109, 119, 121, 125, 127, 149, 151, 155, 157, 167, 169, 171, 177, 181.
$x^2 + 47y^2$	188z + 1, 3, 7, 9, 17, 21, 25, 27, 37, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 75, 79, 81, 83, 89, 95, 97, 101, 103, 111, 115, 119, 121, 131, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 165, 169, 173, 175, 177, 183.

$x^2 + 51y^2$	204z + 1, 5, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 41, 43, 49, 55, 65, 67, 71, 95, 103, 107, 113, 115, 121, 125, 127, 131, 143, 145, 151, 157, 167, 169, 173, 197.
$x^2 + 53y^2$	212z + 1, 3, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 49, 51, 55, 57, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 97, 103, 105, 111, 113, 117, 121, 127, 139, 147, 149, 151, 153, 165, 167, 169, 171, 179, 191, 197, 201, 205, 207.
$x^2 + 55y^2$	220z + 1, 7, 9, 13, 17, 31, 43, 49, 57, 59, 63, 69, 71, 73, 81, 83, 87, 89, 91, 107, 111, 117, 119, 123, 127, 141, 153, 159, 167, 169, 173, 179, 181, 183, 191, 193, 197, 199, 201, 217.
$x^2 + 57y^2$	228z + 1, 11, 23, 25, 29, 31, 35, 41, 47, 49, 53, 61, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 89, 91, 103, 113, 119, 121, 127, 131, 151, 157, 169, 173, 185, 191, 211, 215, 221, 223.
$x^2 + 58y^2$	232z + 1, 9, 15, 21, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 101, 107, 115, 119, 121, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 143, 157, 159, 161, 169, 179, 187, 189, 191, 205, 209, 213, 215, 219, 221, 225, 227, 229.
$x^2 + 59y^2$	236z + 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 35, 41, 45, 49, 51, 53, 57, 63, 71, 75, 79, 81, 85, 87, 95, 105, 107, 119, 121, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 153, 159, 163, 167, 169, 171, 175, 181, 189, 193, 197, 199, 203, 205, 213, 223, 225.
$x^2 + 61y^2$	244z + 1, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 31, 35, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 81, 87, 91, 97, 99, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 125, 137, 139, 141, 143, 149, 151, 155, 159, 161, 169, 175, 191, 197, 205, 207, 211, 215, 217, 223, 225, 227, 229, 241.
$x^2 + 62y^2$	248z + 1, 3, 7, 9, 11, 13, 21, 25, 27, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 61, 63, 71, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 103, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 129, 139, 141, 143, 147, 159, 169, 175, 179, 181, 183, 189, 191, 193, 197, 203, 213, 225, 229, 231, 233, 243.
$x^2 + 65y^2$	260z + 1, 3, 9, 11, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 49, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 81, 87, 93, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 119, 121, 127, 129, 137, 147, 151, 171, 177, 181, 183, 193, 197, 207, 209, 213, 219, 239, 243, 253.

$x^2 + 66y^2$	264z + 1, 5, 7, 13, 17, 23, 25, 35, 41, 47, 49, 53, 61, 65, 67, 71, 79, 83, 85, 91, 97, 107, 109, 115, 119, 125, 127, 131, 151, 161, 163, 169, 175, 191, 205, 221, 227, 233, 235, 245.
$x^2 + 67y^2$	268z + 1, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 47, 49, 55, 59, 65, 71, 73, 77, 81, 83, 89, 91, 93, 103, 107, 121, 123, 127, 129, 131, 135, 143, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 167, 169, 171, 173, 181, 183, 189, 193, 199, 205, 207, 211, 215, 217, 223, 225, 227, 237, 241, 255, 257, 261, 263, 265.
$x^2 + 69y^2$	276z + 1, 5, 7, 13, 17, 19, 25, 35, 43, 47, 49, 53, 59, 65, 67, 71, 73, 79, 85, 89, 91, 95, 103, 113, 119, 121, 125, 131, 133, 137, 149, 167, 169, 175, 179, 193, 199, 215, 221, 235, 239, 245, 247, 265.
$x^2 + 70y^2$	280z + 1, 9, 17, 19, 33, 37, 39, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 87, 93, 97, 101, 103, 107, 121, 123, 131, 139, 143, 151, 153, 163, 167, 169, 171, 181, 191, 197, 223, 229, 239, 249, 251, 253, 257, 267, 269, 277.
$x^2 + 71y^2$	284z + 1, 3, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 37, 43, 45, 49, 57, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 95, 101, 103, 107, 109, 111, 119, 121, 125, 129, 131, 135, 143, 145, 147, 151, 157, 161, 167, 169, 171, 179, 185, 187, 191, 199, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 233, 237, 243, 245, 249, 251, 253, 261, 263, 267, 271, 273, 277.
$x^2 + 73y^2$	292z + 1, 7, 9, 11, 15, 25, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 115, 121, 131, 135, 137, 139, 145, 149, 151, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 179, 181, 191, 199, 201, 213, 217, 221, 225, 237, 239, 247, 257, 259, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 279, 287, 289.
$x^2 + 74y^2$	296z + 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 45, 49, 55, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 93, 99, 103, 107, 109, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 155, 165, 167, 169, 183, 191, 195, 199, 201, 205, 207, 211, 219, 225, 233, 237, 239, 243, 245, 249, 253, 261, 275, 277, 279, 289.

$x^2 - 77y^2$	$308z + 1, 3, 9, 13, 17, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 59, 61, 73, 75, 79, 81, 93, 95, 101, 103, 107, 111, 113, 115, 117, 123, 127, 129, 137, 141, 145, 151, 153, 159, 169, 173, 177, 183, 199, 211, 219, 221, 223, 225, 237, 239, 241, 243, 251, 263, 279, 285, 289, 293, 303.$
$x^2 - 78y^2$	$312z - 1, 19, 25, 29, 35, 37, 41, 47, 49, 53, 55, 67, 71, 77, 79, 85, 89, 101, 103, 107, 109, 115, 119, 121, 127, 131, 137, 155, 161, 163, 167, 173, 179, 187, 199, 215, 217, 229, 239, 251, 253, 269, 281, 289, 295, 301, 305, 307.$
$x^2 - 79y^2$	$316z + 1, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 31, 45, 49, 51, 55, 65, 67, 73, 81, 83, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 141, 143, 151, 153, 159, 163, 167, 169, 171, 177, 179, 181, 183, 189, 203, 207, 209, 213, 223, 225, 231, 239, 241, 245, 247, 253, 255, 257, 259, 263, 269, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 287, 289, 299, 301, 309, 313$
$x^2 - 82y^2$	$328z + 1, 7, 9, 13, 15, 25, 29, 33, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 131, 135, 139, 149, 151, 155, 157, 163, 167, 169, 175, 181, 183, 185, 187, 191, 195, 199, 201, 203, 209, 225, 229, 231, 239, 241, 251, 253, 261, 263, 267, 283, 289, 291, 293, 297, 301, 303, 307, 309, 311, 317, 323, 325.$
$x^2 - 83y^2$	$332z + 1, 3, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 87, 93, 95, 99, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 127, 131, 147, 151, 153, 161, 167, 169, 173, 175, 177, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 207, 215, 217, 225, 227, 229, 231, 235, 241, 243, 247, 253, 259, 261, 265, 275, 277, 279, 285, 287, 289, 293, 297, 313, 317, 319, 327.$
$x^2 - 85y^2$	$340z + 1, 9, 11, 21, 31, 37, 39, 43, 47, 49, 57, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 103, 113, 121, 123, 127, 131, 133, 139, 149, 159, 161, 169, 173, 177, 183, 189, 193, 197, 199, 203, 211, 223, 229, 231, 233, 247, 263, 277, 279, 281, 287, 299, 307, 311, 313, 317, 321, 327, 333, 337.$

$x^2 + 86y^2$	344z + 1, 3, 5, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 57, 61, 69, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 103, 111, 115, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157, 163, 167, 169, 171, 179, 183, 185, 193, 205, 207, 211, 225, 227, 231, 235, 237, 239, 243, 245, 255, 261, 271, 273, 277, 279, 281, 285, 289, 291, 305, 309, 311, 323, 331, 333, 337.
$x^2 + 87y^2$	348z + 1, 7, 11, 13, 17, 25, 41, 47, 49, 67, 77, 89, 91, 95, 101, 103, 109, 113, 115, 119, 121, 131, 137, 139, 143, 151, 155, 169, 175, 181, 185, 187, 191, 199, 215, 221, 223, 241, 251, 263, 265, 269, 275, 277, 283, 287, 289, 293, 295, 305, 311, 313, 317, 325, 329, 343.
$x^2 + 89y^2$	356z + 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 69, 73, 75, 81, 83, 85, 93, 95, 97, 103, 105, 109, 115, 119, 121, 125, 127, 129, 133, 135, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 175, 177, 189, 191, 207, 211, 215, 217, 219, 225, 233, 239, 243, 245, 249, 255, 257, 265, 269, 277, 279, 285, 289, 291, 295, 301, 309, 315, 317, 319, 323, 327, 343, 345.
$x^2 + 91y^2$	364z + 1, 5, 9, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 59, 73, 79, 81, 83, 89, 95, 97, 107, 111, 113, 115, 121, 125, 127, 145, 155, 165, 167, 171, 179, 183, 187, 191, 201, 205, 207, 211, 213, 215, 223, 225, 227, 229, 233, 235, 241, 255, 261, 263, 265, 271, 277, 279, 289, 293, 295, 297, 303, 307, 309, 327, 337, 347, 349, 353, 361.
$x^2 + 93y^2$	372z + 1, 17, 25, 29, 35, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 65, 71, 77, 79, 89, 91, 95, 97, 107, 109, 115, 121, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 151, 157, 161, 169, 185, 191, 193, 197, 199, 205, 209, 223, 227, 247, 253, 259, 269, 271, 287, 289, 299, 305, 311, 331, 335, 349, 353, 359, 361, 365, 367.
$x^2 + 94y^2$	376z + 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 35, 43, 45, 49, 55, 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 133, 139, 143, 145, 153, 159, 163, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 191, 203, 209, 211, 215, 219, 221, 225, 227, 229, 239, 241, 245, 247, 249, 261, 263, 271, 275, 289, 293, 301, 303, 315, 317, 319, 323, 325, 335, 337, 339, 343, 345, 349, 353, 355, 361, 373.

$x^2 + 95y^2$	380z + 1, 3, 9, 11, 13, 27, 33, 37, 39, 49, 53, 61, 67, 81, 97, 99, 101, 103, 107, 111, 113, 117, 119, 121, 127, 131, 139, 143, 147, 149, 159, 161, 167, 169, 173, 183, 191, 193, 199, 201, 203, 217, 223, 227, 229, 239, 243, 251, 257, 271, 287, 289, 291, 293, 297, 301, 303, 307, 309, 311, 317, 321, 329, 333, 337, 339, 349, 351, 357, 359, 363, 373.
$x^2 + 97y^2$	388z + 1, 7, 9, 15, 19, 23, 25, 33, 39, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 155, 161, 169, 171, 175, 179, 185, 187, 193, 197, 199, 205, 207, 211, 215, 221, 223, 225, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 251, 263, 269, 271, 273, 285, 289, 293, 297, 309, 311, 313, 319, 331, 341, 343, 345, 347, 351, 353, 357, 359, 361, 367, 371, 375, 377, 383, 385.
$x^2 + 101y^2$	404z + 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 91, 97, 99, 103, 105, 111, 117, 119, 121, 125, 127, 135, 137, 139, 143, 147, 151, 153, 157, 163, 165, 167, 169, 175, 177, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 221, 225, 231, 233, 243, 245, 249, 255, 259, 263, 271, 273, 275, 281, 289, 291, 295, 297, 309, 311, 315, 317, 325, 331, 333, 335, 343, 347, 351, 357, 361, 363, 373, 375, 381, 385.

ЛИНЕЙНЫЕ ДѢЛИТЕЛИ

КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ $x^2 - ay^2$ ДЛЯ ВСѢХЪ ВЕЛИЧИНЪ a ОТЪ
1 ДО 101.

$x^2 - 2y^2$	$8z + 1, 7.$
$x^2 - 3y^2$	$12z + 1, 11.$
$x^2 - 5y^2$	$20z + 1, 9, 11, 19.$
$x^2 - 6y^2$	$24z + 1, 5, 19, 23.$
$x^2 - 7y^2$	$28z + 1, 3, 9, 19, 25, 27.$
$x^2 - 10y^2$	$40z + 1, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39.$
$x^2 - 11y^2$	$44z + 1, 5, 7, 9, 19, 25, 35, 37, 39, 43.$
$x^2 - 13y^2$	$52z + 1, 3, 9, 17, 23, 25, 27, 29, 35, 43, 49, 51.$
$x^2 - 14y^2$	$56z + 1, 5, 9, 11, 13, 25, 31, 43, 45, 47, 51, 55.$
$x^2 - 15y^2$	$60z + 1, 7, 11, 17, 43, 49, 53, 59.$
$x^2 - 17y^2$	$68z + 1, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 33, 35, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 67.$
$x^2 - 19y^2$	$76z + 1, 3, 5, 9, 15, 17, 25, 27, 31, 45, 49, 51, 59, 61, 67, 71, 73, 75.$
$x^2 - 21y^2$	$84z + 1, 5, 17, 25, 37, 41, 43, 47, 59, 67, 79, 83.$
$x^2 - 22y^2$	$88z + 1, 3, 7, 9, 13, 21, 25, 27, 29, 39, 49, 59, 61, 63, 67, 75, 79, 81, 85, 87.$
$x^2 - 23y^2$	$92z + 1, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 29, 41, 43, 49, 51, 63, 67, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 91.$
$x^2 - 26y^2$	$104z + 1, 5, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 37, 45, 49, 55, 59, 67, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 99, 103.$
$x^2 - 29y^2$	$116z + 1, 5, 7, 9, 13, 23, 25, 33, 35, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 67, 71, 81, 83, 91, 93, 103, 107, 109, 111, 115.$
$x^2 - 30y^2$	$120z + 1, 7, 13, 17, 19, 29, 37, 49, 71, 83, 91, 101, 103, 107, 113, 119.$

$x^2 - 31y^2$	$124z + 1, 3, 5, 9, 11, 15, 23, 25, 27, 33, 41, 43, 45, 49, 55, 69, 75, 79, 81, 83, 91, 97, 99, 101, 109, 113, 115, 119, 121, 123.$
$x^2 - 33y^2$	$132z + 1, 17, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 49, 65, 67, 83, 91, 95, 97, 101, 103, 107, 115, 131.$
$x^2 - 34y^2$	$136z + 1, 3, 5, 9, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 37, 45, 47, 49, 55, 61, 75, 81, 87, 89, 91, 99, 103, 107, 109, 111, 121, 125, 127, 131, 133, 135.$
$x^2 - 35y^2$	$140z + 1, 9, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 43, 59, 67, 73, 81, 97, 107, 109, 111, 117, 121, 123, 127, 131, 139.$
$x^2 - 37y^2$	$148z + 1, 3, 7, 9, 11, 21, 25, 27, 33, 41, 47, 49, 53, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 95, 99, 101, 107, 115, 121, 123, 127, 137, 139, 141, 145, 147.$
$x^2 - 38y^2$	$152z + 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 43, 49, 53, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 99, 103, 109, 115, 117, 121, 123, 127, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 151.$
$x^2 - 39y^2$	$156z + 1, 5, 7, 19, 23, 25, 31, 35, 41, 49, 61, 67, 89, 95, 107, 115, 121, 125, 131, 133, 137, 149, 151, 155.$
$x^2 - 41y^2$	$164z + 1, 5, 9, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 49, 51, 57, 59, 61, 73, 77, 81, 83, 87, 91, 103, 105, 107, 113, 115, 119, 121, 125, 127, 131, 133, 139, 141, 143, 155, 159, 163.$
$x^2 - 42y^2$	$168z + 1, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 41, 47, 53, 61, 79, 89, 107, 115, 121, 127, 139, 143, 149, 151, 155, 157, 167.$
$x^2 - 43y^2$	$172z + 1, 3, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 39, 41, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 71, 75, 81, 91, 97, 101, 109, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 145, 147, 151, 153, 155, 159, 163, 165, 169, 171.$
$x^2 - 46y^2$	$184z + 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 25, 27, 35, 37, 41, 45, 49, 53, 59, 61, 63, 73, 75, 79, 81, 103, 105, 109, 111, 121, 123, 125, 131, 135, 139, 143, 147, 149, 157, 159, 163, 169, 175, 177, 179, 181, 183.$
$x^2 - 47y^2$	$188z + 1, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 37, 39, 43, 49, 53, 61, 65, 67, 81, 87, 89, 91, 97, 99, 101, 107, 121, 123, 127, 135, 139, 145, 149, 151, 153, 157, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 187.$
$x^2 - 51y^2$	$204z + 1, 5, 7, 13, 25, 29, 31, 35, 41, 47, 49, 59, 65, 79, 83, 91, 113, 121, 125, 139, 145, 155, 157, 163, 169, 173, 175, 179, 191, 197, 199, 203.$

$x^2 - 53y^2$	212z + 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 29, 37, 43, 47, 49, 57, 59, 63, 69, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 105, 107, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 135, 143, 149, 153, 155, 163, 165, 169, 175, 183, 187, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211.
$x^2 - 55y^2$	220z + 1, 3, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 39, 47, 49, 51, 57, 67, 69, 73, 79, 81, 89, 103, 117, 131, 139, 141, 147, 151, 153, 163, 169, 171, 173, 181, 193, 197, 201, 203, 207, 211, 217, 219.
$x^2 - 57y^2$	228z + 1, 7, 25, 29, 41, 43, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 71, 73, 85, 89, 107, 113, 115, 121, 139, 143, 155, 157, 163, 167, 169, 173, 175, 179, 185, 187, 199, 203, 221, 227.
$x^2 - 58y^2$	232z + 1, 3, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 37, 43, 49, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 81, 85, 99, 101, 103, 111, 121, 129, 131, 133, 147, 151, 155, 157, 161, 163, 167, 169, 171, 175, 183, 189, 195, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 221, 223, 225, 229, 231.
$x^2 - 59y^2$	236z + 1, 5, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 67, 81, 83, 85, 91, 99, 103, 105, 111, 115, 121, 125, 131, 133, 137, 145, 151, 153, 155, 169, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 205, 207, 211, 213, 215, 219, 225, 227, 231, 235.
$x^2 - 61y^2$	244z + 1, 3, 5, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 39, 41, 45, 47, 49, 57, 65, 73, 75, 77, 81, 83, 95, 97, 103, 107, 109, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 147, 149, 161, 163, 167, 169, 171, 179, 187, 195, 197, 199, 203, 205, 217, 219, 225, 229, 231, 235, 239, 241, 243.
$x^2 - 62y^2$	248z + 1, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 67, 77, 79, 81, 85, 97, 107, 113, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 135, 141, 151, 163, 167, 169, 171, 181, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 207, 211, 213, 215, 219, 223, 225, 227, 229, 233, 235, 239, 247.
$x^2 - 65y^2$	260z + 1, 7, 9, 29, 33, 37, 47, 49, 51, 57, 61, 63, 67, 69, 73, 79, 81, 83, 93, 97, 101, 121, 123, 129, 131, 137, 139, 159, 163, 167, 177, 179, 181, 187, 191, 193, 197, 199, 203, 209, 211, 213, 223, 227, 231, 251, 253, 259.
$x^2 - 66y^2$	264z + 1, 5, 13, 17, 19, 25, 31, 41, 43, 49, 53, 59, 61, 65, 85, 95, 97, 103, 109, 125, 139, 155, 161, 167, 169, 179, 199, 203, 205, 211, 215, 221, 223, 233, 239, 245, 247, 251, 259, 263.

$x^2 - 67y^2$	$268z + 1, 3, 7, 9, 11, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 43, 49, 51, 63, 65, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 89, 93, 95, 99, 111, 115, 119, 121, 129, 139, 147, 149, 153, 157, 169, 173, 175, 179, 181, 187, 189, 191, 193, 195, 203, 205, 217, 219, 225, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 251, 257, 259, 261, 265, 267.$
$x^2 - 69y^2$	$276z + 1, 5, 11, 13, 17, 25, 31, 49, 53, 55, 65, 73, 83, 85, 89, 107, 113, 121, 125, 127, 133, 137, 139, 143, 149, 151, 155, 163, 169, 187, 191, 193, 203, 211, 221, 223, 227, 245, 251, 259, 263, 265, 271, 275.$
$x^2 - 70y^2$	$280z + 1, 3, 9, 11, 17, 23, 27, 31, 33, 37, 51, 53, 61, 69, 73, 81, 83, 93, 97, 99, 101, 111, 121, 127, 133, 159, 169, 179, 181, 183, 187, 197, 199, 207, 211, 219, 227, 229, 243, 247, 249, 253, 257, 263, 269, 271, 277, 279.$
$x^2 - 71y^2$	$284z + 1, 5, 7, 9, 11, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 67, 73, 77, 81, 89, 99, 101, 109, 115, 121, 123, 125, 127, 129, 139, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 169, 175, 183, 185, 195, 203, 207, 211, 217, 221, 225, 227, 229, 233, 235, 237, 239, 245, 247, 249, 253, 255, 259, 261, 273, 275, 277, 279, 283.$
$x^2 - 73y^2$	$292z + 1, 3, 9, 19, 23, 25, 27, 35, 37, 41, 49, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 97, 105, 109, 111, 119, 121, 123, 127, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 165, 169, 171, 173, 181, 183, 187, 195, 201, 203, 207, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 227, 231, 235, 237, 243, 251, 255, 257, 265, 267, 269, 273, 283, 289, 291,$
$x^2 - 74y^2$	$296z + 1, 5, 7, 9, 13, 19, 25, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 81, 91, 93, 95, 109, 117, 121, 125, 127, 131, 133, 137, 145, 151, 159, 163, 165, 169, 171, 175, 179, 187, 201, 203, 205, 215, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 261, 263, 267, 271, 277, 283, 287, 289, 291, 295.$
$x^2 - 77y^2$	$308z + 1, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 37, 41, 53, 61, 67, 71, 73, 81, 83, 87, 93, 101, 113, 117, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 145, 153, 155, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 191, 195, 207, 215, 221, 225, 227, 235, 237, 241, 247, 255, 267, 271, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 299, 307.$

$x^2 - 78y^2$	$312z + 1, 7, 11, 23, 25, 29, 31, 37, 41, 43, 49, 53, 59, 77, 83, 85, 89, 95, 101, 109, 121, 137, 139, 151, 161, 173, 175, 191, 203, 211, 217, 223, 227, 229, 235, 253, 259, 263, 269, 271, 275, 281, 283, 287, 289, 301, 305, 311.$
$x^2 - 79y^2$	$316z + 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 21, 25, 27, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 59, 63, 65, 71, 73, 75, 81, 89, 91, 97, 101, 103, 105, 107, 117, 121, 125, 127, 129, 135, 139, 141, 147, 169, 175, 177, 181, 187, 189, 191, 195, 199, 209, 211, 213, 215, 219, 225, 227, 235, 241, 243, 245, 251, 253, 257, 267, 269, 271, 273, 277, 281, 289, 291, 295, 301, 303, 307, 309, 311, 313, 315.$
$x^2 - 82y^2$	$328z + 1, 3, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 49, 53, 57, 67, 69, 73, 75, 81, 85, 87, 93, 99, 101, 103, 105, 109, 113, 117, 119, 121, 127, 143, 147, 149, 157, 159, 169, 171, 179, 181, 185, 201, 207, 209, 211, 215, 219, 223, 225, 227, 229, 235, 241, 243, 247, 253, 255, 259, 261, 271, 275, 279, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 309, 315, 317, 319, 325, 327.$
$x^2 - 83y^2$	$332z + 1, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 55, 61, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 91, 93, 103, 107, 109, 113, 115, 121, 135, 139, 143, 153, 155, 159, 161, 163, 169, 171, 173, 177, 179, 189, 193, 197, 211, 217, 219, 223, 225, 229, 239, 241, 251, 253, 255, 261, 263, 265, 267, 271, 277, 283, 285, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 303, 307, 311, 313, 315, 317, 323, 331.$
$x^2 - 85y^2$	$340z + 1, 3, 7, 9, 19, 21, 23, 27, 37, 49, 57, 59, 63, 69, 73, 81, 89, 97, 101, 107, 111, 113, 121, 133, 143, 147, 149, 151, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 189, 191, 193, 197, 207, 219, 227, 229, 233, 239, 243, 251, 259, 267, 271, 277, 281, 283, 291, 303, 313, 317, 319, 321, 331, 333, 337, 339.$
$x^2 - 86y^2$	$344z + 1, 5, 7, 9, 11, 17, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 77, 81, 83, 85, 93, 97, 99, 107, 119, 121, 125, 139, 141, 145, 149, 151, 153, 157, 159, 169, 175, 185, 187, 191, 193, 195, 199, 203, 205, 219, 223, 225, 237, 245, 247, 251, 259, 261, 263, 267, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 295, 299, 303, 305, 307, 309, 315, 319, 327, 333, 335, 337, 339, 343.$

$x^2 - 87y^2$	348z + 1, 13, 17, 19, 23, 25, 31, 35, 41, 43, 49, 55, 59, 71, 77, 79, 83, 89, 101, 107, 109, 113, 121, 127, 137, 163, 167, 169, 179, 181, 185, 211, 221, 227, 235, 239, 241, 247, 259, 265, 269, 271, 277, 289, 293, 299, 305, 307, 313, 317, 323, 325, 329, 331, 335, 347.
$x^2 - 89y^2$	356z + 1, 5, 9, 11, 17, 21, 25, 39, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 67, 69, 71, 73, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 97, 99, 105, 107, 109, 111, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 139, 153, 157, 161, 167, 169, 173, 177, 179, 183, 187, 189, 195, 199, 203, 217, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 245, 247, 249, 251, 257, 259, 263, 265, 269, 271, 275, 277, 283, 285, 287, 289, 299, 301, 303, 307, 309, 311, 317, 331, 335, 339, 345, 347, 351, 355.
$x^2 - 91y^2$	364z + 1, 3, 5, 9, 11, 15, 25, 27, 29, 33, 41, 45, 53, 55, 67, 71, 73, 75, 81, 87, 89, 97, 99, 103, 113, 121, 123, 125, 131, 135, 139, 145, 151, 159, 163, 165, 199, 201, 205, 213, 219, 225, 229, 233, 239, 241, 243, 251, 261, 265, 267, 275, 277, 283, 289, 291, 293, 297, 309, 311, 319, 323, 331, 335, 337, 339, 349, 353, 355, 359, 361, 363.
$x^2 - 93y^2$	372z + 1, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 29, 49, 53, 65, 67, 77, 83, 89, 97, 103, 109, 119, 121, 133, 137, 157, 161, 163, 167, 169, 175, 179, 185, 187, 193, 197, 203, 205, 209, 211, 215, 235, 239, 251, 253, 263, 269, 275, 283, 289, 295, 305, 307, 319, 323, 343, 347, 349, 353, 355, 361, 365, 371.
$x^2 - 94y^2$	376z + 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 39, 45, 49, 51, 59, 65, 69, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 97, 109, 115, 117, 121, 125, 127, 131, 133, 135, 145, 147, 151, 153, 155, 167, 169, 177, 181, 195, 199, 207, 209, 221, 223, 225, 229, 231, 241, 243, 245, 249, 251, 255, 259, 261, 267, 279, 283, 287, 289, 291, 293, 295, 299, 301, 307, 311, 317, 325, 327, 331, 337, 345, 347, 349, 351, 353, 359, 361, 363, 367, 371, 373, 375.
$x^2 - 95y^2$	380z + 1, 7, 9, 13, 23, 31, 33, 37, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 71, 79, 81, 83, 87, 91, 97, 101, 113, 117, 121, 123, 149, 151, 161, 163, 169, 173, 179, 187, 193, 201, 207, 211, 217, 219, 229, 231, 257, 259, 263, 267, 279, 283, 289, 293, 297, 299, 301, 309, 317, 319, 321, 327, 329, 331, 333, 337, 343, 347, 349, 357, 367, 371, 373, 379.

$x^2 - 97y^2$	$388z + 1, 3, 9, 11, 25, 27, 31, 33, 35, 43, 47, 49, 53, 61, 65, 73,$ $75, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 109,$ $113, 115, 119, 121, 129, 133, 141, 145, 147, 151, 159,$ $161, 163, 167, 169, 183, 185, 191, 193, 195, 197, 203,$ $205, 219, 221, 225, 227, 229, 237, 241, 243, 247, 255,$ $259, 267, 269, 273, 275, 279, 283, 285, 287, 289, 293,$ $295, 297, 299, 303, 307, 309, 313, 315, 323, 327, 335,$ $339, 341, 345, 353, 355, 357, 361, 363, 377, 379, 385, 387.$
$x^2 - 101y^2$	$404z + 1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 49,$ $65, 71, 77, 79, 81, 85, 87, 95, 97, 105, 107, 115, 117,$ $121, 123, 125, 131, 137, 153, 155, 157, 159, 165, 169,$ $171, 177, 179, 181, 183, 185, 189, 193, 197, 201, 203,$ $207, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235, 239,$ $245, 247, 249, 251, 267, 273, 279, 281, 283, 287, 289,$ $297, 299, 307, 309, 317, 319, 323, 325, 327, 333, 339,$ $355, 357, 359, 361, 367, 371, 373, 379, 381, 383, 385,$ $387, 391, 395, 399, 403$



